

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ. СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ

Автор: ученик 8-а класса Гимназии №1
Сычев Алексей.

Руководитель: Илющихина М.И.

Арифметический квадратный корень

Определение: арифметическим квадратным корнем из числа a называется неотрицательное число, квадрат которого равен a .

Арифметический квадратный корень из числа a обозначается так: \sqrt{a} . Знак $\sqrt{\quad}$ называется *знаком арифметического квадратного корня*; a называется *подкоренным выражением*. Выражение \sqrt{a} читается так: «Арифметический квадратный корень из числа a ».

В случаях, когда ясно, что речь идет об арифметическом корне, говорят: «Корень квадратный из a ». *Действие нахождения квадратного корня из числа называют извлечением квадратного корня.*

Возводить в квадрат можно любые числа, но извлекать квадратный корень можно не из любого числа. Например, нельзя извлечь квадратный корень из числа -4 , так как нет такого числа, квадрат которого равен -4 .

Итак, выражение \sqrt{a} имеет смысл только при $a \geq 0$.
Определение квадратного корня можно кратко записать так:

$$\sqrt{a} \geq 0, \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

Равенство $(\sqrt{a})^2 = a$ справедливо при $a \geq 0$.

Квадратный корень из степени

Вычислим значение выражения \sqrt{a} при $a=3$ и $a=-3$.

По определению квадратного корня $\sqrt{3} = 3$. При

$a=-3$ находим $\sqrt{(-3)} = \sqrt{3} = 3$. Так как число 3 является противоположным числу -3 , то можно записать:

$$\sqrt{(-3)} = -(-3) \text{ или } \sqrt{(-3)} = |-3|.$$

Теорема 1: для любого числа a справедливо равенство

$$\sqrt{a} = |a|.$$

Рассмотрим два случая: $a \geq 0$ и $a < 0$.

1) Если $a \geq 0$, то по определению арифметического корня

$$\sqrt{a} = a.$$

2) Если $a < 0$, то $(-a) > 0$ и поэтому

$$\sqrt{a} = \sqrt{(-a)} = -a.$$

Таким образом,

Вместо того чтобы говорить, что равенство и $\sqrt{a^2} = |a|$ выполняется при любых значениях входящих в него букв, говорят, что это равенство выполняется *тождественно*.

Равенства, справедливые при любых значениях входящих в них букв, называют *тождествами*.

Теорема 2. Если $a > b > 0$, то $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

В самом деле, если допустить, что $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$, то, возведя обе части неравенства в квадрат, получим

$a \leq b$, что противоречит условию $a > b$.

Квадратный корень из произведения

Теорема. Если $a \geq 0$, $b \geq 0$, то

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}$$

т.е. корень из произведения неотрицательных множителей равен произведению корней из этих множителей.

Для того чтобы доказать, что $\sqrt{a} \sqrt{b}$ есть арифметический квадратный корень из ab , надо доказать, что:

$$1) \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \geq 0 \quad 2) (\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = ab.$$

по определению квадратного корня $\sqrt{a} \geq 0$, $\sqrt{b} \geq 0$, поэтому $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \geq 0$. По свойству степени произведения и определению квадратного корня

$$(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = ab.$$

Квадратный корень из дроби

Теорема. Если $a \geq 0$, $b > 0$, то

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

т.е. корень из дроби равен корню из числителя,
деленному на корень из знаменателя.

В некоторых задачах полезно избавиться от
иррациональных выражений в знаменателе дроби.

- Требуется доказать, что:

$$1) \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \geq 0; \quad \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{a}{b}$$

Так как $\sqrt{a} \geq 0$ и $\sqrt{b} > 0$, то $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \geq 0$.

По свойству возведения дроби в степень и определению квадратного корня

$$\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a}{b}$$

По доказанной теореме *при делении корней* можно разделить подкоренные выражения и из результата извлечь корень:

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$