Тригономет рия

Тригонометрические уравнения и неравенства

$$asinx + bcosx = 0$$

$$asin^2x + c \cdot sinxcosx + bcos^2x = 0$$

Попкова Т.Г. МОУ СОШ № 2 Горячий Ключ

Повторим значения синуса косинуса



Арксинус



Арксинусом числа ***a*** называется такое число (угол) **t** из **[-π/2;π/2]**, что ***sin t = a*.**
Причём, | ***a*** |≤ **1**.

arcsin(- ***a***)= - arcsin ***a***

Примеры:

$$1)\ arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$$

$$2)\ arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

$$3)\ arcsin 0 = 0$$

Арккосинус



Арккосинусом числа a называется такое число (угол) t из $[0;\pi]$, что

$\cos t = a$.

Причём, $|a| \leq 1$.

$$\arccos(-a) = \pi - \arccos a$$

Примеры:

1) $\arccos(-1) = \pi$

2) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$

При каких значениях x имеет смысл выражение:

1.arcsin(2x+1)

1) $-1 \le \mathbf{2x-1} \le 1$

$-2 \le \mathbf{2x} \le 0$

$-1 \le \mathbf{x} \le 0$

Ответ: [-1;0]

2.arccos(5-2x)

2) $-1 \le \mathbf{5-2x} \le 1$

$-6 \le \mathbf{-2x} \le -4$

$2 \le \mathbf{x} \le 3$

Ответ: [2;3]

3.arccos(x²-1)

$-1 \le \mathbf{x^2-1} \le 1$

$0 \le \mathbf{x^2} \le 2$

Ответ:

$[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$

4.arcsin(4x²-3x)

$-1 \le 4x^2-3x \le 1$

$\begin{cases} 4x^2-3x \ge -1 \\ 4x^2-3x \le 1 \end{cases}$

$4x^2-3x-1 \le 0$

Ответ:

$\left[-\frac{1}{4}; 1\right]$

Повторим значения тангенса и котангенса

Линия тангенсов

tg t ЄR , но t ‡ $\pi/2 + \pi k$, kЄZ



ctg t ЄR, но t ‡ $0 + \pi k$, kЄZ

Линия котангенсов



Арктангенс



Арктангенсом числа *a* называется такое число (угол) *t* из (-π/2;π/2), что ***tg t = a*** **.**
Причём, *a* **Є R.**

arctg(-*a*) = - arctg *a*

Примеры:

1) arctg√3/3 = π/6

2) arctg(-1) = -π/4

Арккотангенс



Арккотангенсом числа *a* называется такое число (угол) **t** из (0;π), что c***tg t*** **=** ***a*****.**
Причём, *a* ЄR .

arcctg(- *a*) = π – arcctg *a*

Примеры:

1) arcctg(-1) = 3π/4

2) arcctg√3 = π/6

Формулы корней простых тригонометрических уравнений

1.cost = *a* , где $|a| \leq 1$

$$\left[\begin{array}{l} t = arccos\boldsymbol{a} + 2\pi k, k \in Z \\ t = -arccos\boldsymbol{a} + 2\pi k, k \in Z \end{array}\right.$$

или

$$t = \pm arccos\boldsymbol{a} + 2\pi k, k \in Z$$

Частные случаи

1)<u>cost=0</u>
t = π/2+πk, k∈Z

2)<u>cost=1</u>
t = 0+2πk, k∈Z

3)<u>cost = -1</u>
t = π+2πk, k∈Z

2.sint = *a*, *где* | *a* |≤ 1

$$\left[\begin{array}{l} t = arcsin\boldsymbol{a} + 2\pi k, k \in Z \\ t = \pi - arcsin\boldsymbol{a} + 2\pi k, k \in Z \end{array}\right.$$

или

$$t = (-1)^k arcsin\boldsymbol{a} + \pi k, k \in Z$$

Частные случаи

1)<u>sint=0</u>
t = 0+πk, k∈Z

2)<u>sint=1</u>
t = π/2+2πk, k∈Z

3)<u>sint = - 1</u>
t = - π/2+2πk, k∈Z

3. tgt = *a*, *a*∈R

t = arctg ***a*** + πk, k∈Z

---

4. ctgt = *a*, *a*∈R

t = arcctg ***a*** + πk, k∈Z

Примеры:

1) $\cos t = -\frac{1}{2}$;

$t = \pm\arccos(-1/2) + 2\pi k,\ k \in Z$

$t = \pm 2\pi/3 + 2\pi k,\ k \in Z$

2) $\sin t = 0$;

Частный случай:

$t = 0 + \pi k,\ k \in Z$

3) $\operatorname{tg} t = 1$;

$t = \operatorname{arctg} 1 + \pi k,\ k \in Z$

$t = \pi/4 + \pi k,\ k \in Z.$

4) $\operatorname{ctg} t = -\sqrt{3}$

$t = \operatorname{arcctg}(-\sqrt{3}) + \pi k,\ k \in Z$

$t = 5\pi/6 + \pi k,\ k \in Z.$

Решение простейших уравнений

1) $tg2x = -1$

$2x = arctg(-1) + \pi k, k \in Z$

$2x = -\pi/4 + \pi k, k \in Z$

$x = -\pi/8 + \pi k/2, k \in Z$

Ответ: $-\pi/8 + \pi k/2, k \in Z$.

2) **$\cos(x+\pi/3) = ½$**

$x+\pi/3 = \pm\arccos 1/2 + 2\pi k, k \in Z$

$x+\pi/3 = \pm\pi/3 + 2\pi k, k \in Z$

$x = -\pi/3 \pm \pi/3 + 2\pi k, k \in Z$

Ответ: $-\pi/3 \pm \pi/3 + 2\pi k, k \in Z$

3) **$\sin(\pi - x/3) = 0$**

упростим по формулам приведения

$\sin(x/3) = 0$

частный случай

$x/3 = \pi k, k \in Z$

$x = 3\pi k, k \in Z$.

Ответ: $3\pi k, k \in Z$.

Другие тригонометрические уравнения

1.Сводимые к квадратным

$$a\cdot\sin^2 x + b\cdot\sin x + c=0$$

Пусть $\sin x = p$, где $|p| \leq 1$, тогда

$a\cdot p^2 + b\cdot p + c = 0$

Найти корни, вернуться к замене и решить простые уравнения.

2.Однородные

1)Первой степени:

$$a\cdot\sin x + b\cdot\cos x = 0$$

Т.к. $\sin x$ и $\cos x$ одновременно не равны нулю, то разделим обе части уравнения на $\cos x$. Получим: простое уравнение

$$a\cdot tg x + b = 0 \text{ или } tg x = m$$

2)Второй степени:

$$a\cdot\sin^2 x + b\cdot\sin x\cdot\cos x + c\cdot\cos^2 x = 0$$

Разделим обе части на $\cos^2 x$.

Получим квадратное уравнение:

$$a\cdot tg^2 x + b\cdot tg x + c = 0.$$

Простые тригонометрические неравенства

1) cost > *a*



Ответ: (-arccos ***a***+2πk; arccos ***a***+2πk), k∈Z

2) sint < ***a***



Ответ: (-(π+arcsin ***a***)+2πk; arcsin ***a***+2πk), k∈Z

3) tgt > -***a***



Ответ: (-arctg ***a***+πk; π/2+πk), k∈Z

4) ctgt > ***a***



Ответ: (0+πk; arcctg ***a***+πk), k∈Z.