

« Геометрия обладает двумя великими сокровищами. Первое - это теорема Пифагора, которую можно сравнить

с мерой золота...» И. Кеплер

• Цель:

внимательно изучив формулировку теоремы Пифагора, проанализировав доказательство и используя обобщение, предложить более широкий круг объектов, при помощи которых происходит доказательство теоремы Пифагора, создав тем самым новую интерпретацию её формулировки.


• Задачи:

- 1) обобщение материала по исследуемой теме.
- 2) применение теоремы Паппа как дополнительного инструмента проекта.
- 3) систематизирование информации, представленной в проекте.
- 4) создание новой интерпретации формулировки теоремы Пифагора.

ГИПОТЕЗА


Если я (в доказательстве теоремы Пифагора) на сторонах прямоугольного треугольника построю не квадраты (как предложил Пифагор), а подобные многоугольники, то будет ли справедливо, что площадь многоугольника, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей многоугольников, построенных на катетах? Если я это докажу, то у меня появится новая интерпретация формулировки теоремы Пифагора, что обогатит задачный материал, а

Теорема Паппа



Если на сторонах произвольного треугольника АВС построить параллелограммы соответствующим образом, то площадь параллелограмма, построенного на большей стороне, равна сумме плошадей двух остальных

Проверка гипотезы



$$\Delta CDA \qquad \Delta BAC \qquad k_1 = \frac{b}{c}$$

$$\Delta BCD \qquad \Delta BAC \qquad k_2 = \frac{a}{c}$$

$$\Delta BCD \quad \Delta CAD \quad k_3 = \frac{a}{b}$$


На сторонах прямоугольного треугольника построим равносторонние треугольники. Достроив их до параллелограммов и применив теорему Паппа, имеем:

$$\frac{1}{2}S_{ABKP} = \frac{1}{2}S_{AQMC} + \frac{1}{2}S_{CENB}$$

$$S_{\Delta BKA} = S_{\Delta AMC} + S_{\Delta BCN}$$

$$S_1 = \frac{c^2 \sqrt{3}}{4} \qquad S_2 = \frac{b^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$S_3 = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$



$$\frac{c^2\sqrt{3}}{4} = \frac{b^2\sqrt{3}}{4} + \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

$$\Rightarrow c^2 = b^2 + a^2$$

На сторонах прямоугольного треугольника построим равнобедренные подобные треугольники.

Достроив их до параллелограммов и применив теорему Паппа, имеем:

 ΔBCD ΔCAD ΔBAC (как построенные на сходственных ΔBKA ΔAMC ΔCNB сторонах)

1)
$$\Delta CDA = \Delta BCA$$
 $k = \frac{b}{c}$


$$\Delta AMC = \Delta AKB \quad k = \frac{b}{c}$$

2)
$$\Delta BCD = \Delta BAC \quad k = \frac{a}{c}$$

$$\Delta CNB = \Delta BKA \quad k = \frac{a}{c}$$

3)
$$\triangle BCD$$
 $\triangle CAD$ $k = \frac{a}{b}$


$$\triangle CNB$$
 $\triangle AMC$ $k = \frac{a}{b}$



На сторонах прямоугольного треугольника построим разносторонние подобные треугольники с коэффициентами подобия соответственно

 $\frac{b}{c}, \frac{a}{c}, \frac{a}{b}$ (это коэффициенты подобных треугольников, на которые делит высота, опущенная из вершины прямого угла треугольника).

Достроив их до параллелограммов и применив теорему Паппа, получим, что площадь треугольника, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей треугольников, построенных на катетах.



$$S_{ABKP} = S_{AQMC} + S_{BCEN}$$

$$S_{ABKP} = S_{AQMC} + S_{BCEN}$$

$$\frac{1}{2} \qquad \frac{1}{2}$$

$$S_{1} = S_{2} + S_{3}$$

Новая интерпретация формулировки теоремы Пифагора

Если на сторонах прямоугольного треугольника, как на сходственных, построить подобные многоугольники, то площадь многоугольника, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей многоугольников, построенных на катетах.