

# *Формула Бернулли*

Автор-составитель:  
Каторова О.Г.,  
учитель математики  
МБОУ «Гимназия № 2»

г. Саров

# Формулировка теоремы

**Формула Бернулли** — формула в теории вероятностей, позволяющая находить вероятность появления события **A** при независимых испытаниях. Формула Бернулли позволяет избавиться от большого числа вычислений — сложения и умножения вероятностей — при достаточно большом количестве испытаний.

**T**

Если Вероятность **p** наступления события **A** в каждом испытании постоянна, то вероятность  $P_n(k)$  того, что событие **A** наступит **k** раз в **n** независимых испытаниях, равна:

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

# Историческая

## якоб бернулли

(1654–1705)

Дата рождения: 27 декабря 1654г.

Место рождения: Базель

Дата смерти: 16 августа 1705г.

Место смерти: Базель

Гражданство: Швейцария

Научная сфера: Математик

Место работы: Базельский университет

Науч. рук.: Лейбниц



**Якоб Бернулли** (нем. Jakob Bernoulli, 27 декабря 1654, Базель, — 16 августа 1705, там же) — швейцарский математик, брат Иоганна Бернулли; профессор математики Базельского университета (с 1687).

Якобу Бернулли принадлежат значительные достижения в теории рядов, дифференциальном исчислении вариационного исчисления, теории вероятностей и теории чисел, где его именем названы числа с некоторыми определенными свойствами.

Якобу Бернулли принадлежат также работы по физике, арифметике, алгебре и геометрии.

## Пример использования формулы

**Берну́лль** акции корпорации ABC поднимаются в цене или падают в цене на один пункт с вероятностями соответственно 0,75 и 0,25. Найти вероятность того, что акции после шести дней вернутся к своей первоначальной цене. Принять условие, что изменения цены акции вверх и вниз – независимые события.

### РЕШЕНИЕ:

Для того, чтобы акции вернулись за 6 дней к своей первоначальной цене, нужно, чтобы за это время они 3 раза поднялись в цене и три раза опустились в цене.

Искомая вероятность рассчитывается по формуле Бернулли

$$P_{\cdot}(3) = C^3 \cdot (3/4)^3 (1/4)^3 = 0,13$$

# Проверь

## себя

В урне 20 белых и 10 черных шаров. Вынули подряд 4 шара, причем каждый вынутый шар возвращают в урну перед извлечением следующего и шары в урне перемешивают. Какова вероятность того, что из четырех вынутых шаров окажется два белых?

ОТВЕТ: 8/27

РЕШЕНИЕ:

Аудитор обнаруживает финансовые нарушения у проверяемой фирмы с вероятностью 0,9. Найти вероятность того, что среди 4 фирм-нарушителей будет выявлено больше половины.

ОТВЕТ: 0,9477

РЕШЕНИЕ:

Игральный кубик бросается 3 раза. Какова вероятность того, что в этой серии испытаний 6 очков появятся ровно 2 раза?

ОТВЕТ: 0,01389

РЕШЕНИЕ:

# Проверь себя

Монета бросается 6 раз. Найти вероятность того, что герб выпадет не более, чем 2 раза.

ОТВЕТ: 0,344

РЕШЕНИЕ:

Пусть всхожесть семян пшеницы составляет 90%. Чему равна вероятность того, что из 7 посеянных семян взойдут 5?

ОТВЕТ: 0,124

РЕШЕНИЕ:

# РЕШЕНИЕ

Вероятность извлечения белого шара

$$p=20/30=2/3$$

можно считать одной и той же во всех  
испытаниях;

$$1-p=1/3$$

Используя формулу Бернулли, получаем

$$P_4(2) = C_4^2 \cdot p^2 \cdot (1-p)^2 = (12/2) \cdot (2/3)^2 \cdot (1/3)^2 = 8/27$$

# РЕШЕНИЕ

Событие состоит в том, что из 4 фирм-нарушителей будет выявлено три или четыре, т.е.

$$P(A) = P_4(3) + P_4(4)$$

$$P(A) = C_4^3 0,9^3 \cdot 0,1 + C_4^4 0,9^4 = 0,9^3 (0,4 + 0,9) = 0,9477$$



# РЕШЕНИЕ

Пусть  $A$  - появление 6 очков в одном испытании. Событие  $A$  в каждом из четырех независимых испытаний может произойти, а может и не произойти.

Известно, что  $p = P(A) = 1/6$

Тогда, согласно формуле Бернулли получим

$$P_3(2) = C_3^2 (1/6)^2 (1 - 1/6)^{3-2} = 3 \cdot 1/36 \cdot 5/6 = 3/216 \approx 0,01389$$

# РЕШЕНИЕ

Искомая вероятность равна сумме вероятностей трех событий, состоящих в том, что герб не выпадет ни разу, либо один раз, либо два раза:

$$P(A) = P_6(0) + P_6(1) + P_6(2)$$

$$P(A) = C_6^0 (1/2)^0 (1/2)^6 + C_6^1 (1/2)^1 (1/2)^5 + C_6^2 (1/2)^2 (1/2)^4 = 0,344$$

# РЕШЕНИЕ

Известно, что  $P=0,9$ , по формуле Бернулли рассчитаем искомую вероятность:

$$P_7(5) = C_7^5 \cdot 0,9^5 \cdot (1-0,9)^2 = 21 \cdot 0,59049 \cdot 0,01 = 0,124$$

***СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!***