Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет
Факультет последипломного образования
Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии

Наркомании и токсикомании

асс. Е. В. Кузнецов

Наркотическое вещество (наркотик) **—**

вещество, которое, вследствие ***социальной опасности*** злоупотребления им, ***официально признано*** таковым ввиду его способности при однократном употреблении вызывать комфортное психическое состояние, а при систематическом — психическую и/или физическую зависимость.

***Психоактивное вещество* —**

вещество, имеющее сходное с наркотическим воздействие на организм, но официально не отнесённое к наркотикам.

***Аддиктивное поведение* —**

злоупотребление психоактивными веществами (включая алкоголь и алкалоиды табака) до формирования синдрома физической зависимости.

***Токсикомания (наркомания)* —**

болезненное состояние, проявляющееся влечением к систематическому употреблению психоактивных (наркотических) веществ, и характеризующееся явлениями психической и физической зависимости.

Мотивация употребления психоактивных веществ

(Ц. П. Короленко и Т. А. Донских, 1990)

- ***Атарактическая*** — использование психоактивного вещества с целью смягчения или устранения явлений эмоционального дискомфорта (сниженного настроения)
- ***Гедонистическая*** — использование психоактивного вещества с эйфоризирующей целью (получение наслаждения)
- ***Активационная*** — использование психоактивного вещества с активизирующей целью (выведение из состояния пассивности, безразличия, апатии)
- ***Субмиссивная*** — использования психоактивных веществ из-за нежелания оказаться «вне

Клинические проявления токсикомании:

- Синдром изменённой реактивности
- Синдром психической зависимости
- Синдром физической зависимости

Синдром изменённой реактивности

- Изменение формы потребления
- Изменение толерантности
- Исчезновение защитных реакций
- Изменение формы опьянения

Синдром психической зависимости

- Психическое (обсессивное) влечение
- Достижение психического комфорта в интоксикации

Синдром физической зависимости

- Физическое (компульсивное) влечение
- Достижение физического комфорта в интоксикации
- Абстинентный синдром

Синдром последствий хронической наркотизации

- Расстройства психической сферы
- Психотические состояния
- Расстройства соматоневрологической сферы

Развитие болезни

- Злоупотребление
- Продром токсикомании
- I стадия
- II стадия
- III стадия

Вероятность устойчивой ремиссии

ПОВЫШЕНИЕ

- Психическое здоровье в преморбиде
- Психофизическая зрелость к началу употребления
- Стабильное социальное положение
- Образование

СНИЖЕНИЕ

- Позднее обращение за лечением
- Юный возраст начала наркотизации
- Непрерывность наркотизации
- Медицинское образование
- Патологическая личность
- Полинаркотизм
- Асоциальность
- Злоупотребление снотворными
- Кустарное изготовление психоактивных веществ

Наркотическое опьянение

- Расстройства эмоций (собственно эйфория)
- Расстройства восприятия
- Расстройства мышления
- Расстройства сознания

Острое многоуровневое поражение мозга

Наркотическое опьянение

- 1 фаза — мгновенный эффект
  («kick», «приход», «подъём»)
- 2 фаза — нарастание опьянения
  («trip», «кайф»,«волокуша», «таска»)
- 3 фаза — развитое опьянение
- 4 фаза — выход из опьянения

Опийное опьянение

- Миоз
- Бледность и сухость кожи и слизистых оболочек
- Гипотензия, брадикардия
- Повышение сухожильных рефлексов
- Благодушный, лёгкий аффект
- Ускорение смены ассоциаций и речи

Кодеиновое опьянение

- Психомоторная ажитация
- В момент осмотра возможна диссимуляция вегетативных показателей опийного опьянения

Опийный абстинентный синдром

- Мидриаз, зевота, слезотечение, насморк
- Озноб/жар, «гусиная кожа», фебрилитет, мышечный дискомфорт, боль в межчелюстных суставах при еде
- Мышечные боли, дисфорическая депрессия
- Диспепсические явления
- Умеренная гипертензия, тахикардия, гипергликемия, повышенная свёртываемость крови

Барбитуратное опьянение

- Мидриаз
- Гиперемия кожи и слизистых оболочек
- Гипергидроз
- Дизартрия, нарушение координации движений
- На спинке языка — продольный неснимаемый коричневый налёт
- ЧСС и АД снижены
- Потоотделение с горячим потом при снижении температуры тела

Барбитуратный абстинентный синдром

- Мидриаз, озноб, зевота, гипергидроз, бледность, неудовлетворённость, беспокойство, «гусиная кожа», мышечная слабость
- Дисфория, судороги икроножных мышц, гиперрефлексия, мышечная гипертония, тики, мелкий тремор, подъём АД, тахикардия
- Диспепсия, боль в крупных суставах
- Депрессия или большие судорожные припадки

Опьянение стимуляторами

- Синестезия, «симпатотоническое» восприятие
- Благодушие
- Тахикардия, дизритмии и боль в сердце
- Бледность и сухость кожи и слизистых
- Расширение глазных щелей, мидриаз, латеральный нистагм
- Гиперрефлексия
- Мышечная и сосудистая гипертензия

Абстинентный синдром при злоупотреблении стимуляторами

- Головная боль, иногда гемикрания
- Сердцебиение, боли в сердце
- Одышка в покое
- Ощущение разбитости в мышцах
- Фибриллярные подёргивания и судорожные сведения мышц
- Тремор, атаксия
- Зевота, озноб, гипергидроз
- Гиперестезии

Опьянение психоделическими веществами

- Признаки онейроидного помрачения сознания
- Углубление аффекта, смешливость
- Гиперемия склер, кожи
- Блеск глаз, мидриаз
- Сухость во рту, жажда, чувство голода
- Рост ЧСС и ЧДД
- Гипергликемия, гиперинсулинемия
- После выхода — бледность, слабость,

Абстинентный синдром при гашишизме

- Мидриаз, зевота, озноб, вялость, мышечная слабость, дисфория, исчезновение сна и аппетита
- Мелкий тремор, гиперрефлексия, повышение АД, ЧСС, ЧДД
- Сенестопатоподобные жалобы


OH
N
O
N

Место для диагностических ошибок

- Отрывочные, несистематизированные бредовые идеи
- Дизориентировка, двигательное возбуждение, речевые стереотипии, недоступность контакту
- Ступор, застывание
- Бред с мистическими мотивами, символичностью восприятия
- Насыщенные, нелепые соматические ощущения

Medica mentes,
non medicamentes.