

# МОЯ ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА



Работу выполнил :

Ученик 9 класса

Платошинской СОШ

Казанцев Дмитрий

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, уполномоченным на то органом страны в установленном порядке, полученные из крови, плазмы крови, а также органов — фармакологические средства (вещества или смеси веществ), прошедшие клинические испытания и разрешенные к применению для профилактики, диагностики и лечения заболеваний уполномоченным на то органом страны в установленном порядке, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека — фармакологические средства (вещества или смеси веществ), прошедшие клинические испытания и разрешенные к применению для профилактики, диагностики и лечения заболеваний уполномоченным на то органом страны в установленном порядке, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей или животных — фармакологические средства (вещества или смеси веществ), прошедшие клинические испытания и разрешенные к применению для профилактики, диагностики и лечения заболеваний уполномоченным на то органом страны в установленном порядке, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей или животных, растений — фармакологические средства (вещества или смеси веществ), прошедшие



# БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Химическое название:

Бис-/п-диэтиламино/-  
трифенилангидрокарбинола оксалат.

Состав:

Активное вещество:

Бриллиантовый зеленый 1г

Вспомогательные вещества:

Этанол (этиловый спирт) 95%

(в пересчете на этанол безводный) – 52,07г

Вода очищенная – до получения раствора  
массой 100г.

Описание: прозрачная интенсивно  
зеленого цвета жидкость с запахом спирта.

Показания к применению:

Свежие послеоперационные и  
посттравматические рубцы, мейбомит,  
блефарит, пиодермия, ссадины, прорезы,  
нарушения целостности кожных покровов.



# ГЛИЦИН

Состав;

Активное вещество:

Глицин – 100мг,

Вспомогательные вещества:

Метилцеллюлоза водорастворимая –  
1мг,

Магния стеарат – 1мг.

Показания к применению:

- Уменьшает психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность, повышает социальную адаптацию;
- Облегчает засыпание и нормализует сон;
- Повышает умственную работоспособность;
- Уменьшает вегето-сосудистые расстройства;
- Уменьшает выраженность мозговых расстройств при ишемическом инсульте и черепно-мозговой травме.



# ОТИПАКС

Состав:

Активные вещества:

Феназон 40мг;

Лидокаина гидрохлорид 10мг;

Вспомогательные вещества:

Натрия тиосульфат, этанол,  
глицерол, вода.

Описание: прозрачный, бесцветный  
или желтоватый раствор с  
запахом спирта.

Показания к применению:

Местное симптоматическое  
лечение и обезболивание у  
детей с рождения и взрослых  
при:

- Среднем отите в остром периоде в момент воспаления;
- Отите, как осложнении после гриппа;
- Баротравматическом отите.



# ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ НАССОЙКА

Состав:

Травы пиона уклоняющегося – 50г,  
Корневищ и корней пиона  
уклоняющегося – 50г,

Этанола 40% - достаточное количество  
до получения 1л настойки.

Описание:

Прозрачная жидкость светло-  
коричневого цвета с запахом  
метилсалицилата. В процессе  
хранения возможно выпадение  
осадка.

Показания к применению:

Настойку пиона применяют в качестве  
седативного средства при  
нарушении сна повышенной  
нервной возбудимости,  
вегетососудистых нарушениях.



# КОРВАЛОЛ

Состав:

Активные вещества:

Этилового эфира  $\alpha$ -бромизовалериановой кислоты – 2,0г;

Фенобарбитала – 1,826г;

Масло мяты перечной – 0,142г.

Вспомогательные вещества:

Натрия гидроокись (натрия гидроксид);

Спирт этиловый 95% (этанол);

Вода очищенная.

Описание:

Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим ароматным запахом.

Показания к применению:

Корвалол назначают в качестве седативного средства при нарушении сна повышенной нервной возбудимости, вегетососудистых нарушениях.




# ПАРАЦЕТАМОЛ

(лат. *Paracetamolum*, англ. Paracetamol, также ацетаминофен) — лекарственное средство) — лекарственное средство, оказывающее жаропонижающее) — лекарственное средство, оказывающее жаропонижающее и обезболивающее) — лекарственное средство, оказывающее жаропонижающее и обезболивающее действие. Является широко распространённым ненаркотическим анальгетиком, обладает довольно слабыми противовоспалительными) — лекарственное средство, оказывающее жаропонижающее и обезболивающее действие. Является широко распространённым ненаркотическим анальгетиком, обладает довольно слабыми противовоспалительными свойствами (и поэтому не имеет связанных с ними побочных эффектов, характерных для НПВП)




## ОПИСАНИЕ:

Белый или белый с кремовым или розовым оттенком кристаллический порошок. Легко растворим в спирте, нерастворим в воде.[\[1\]](#) Данные растворимости из книги Toxicological Analysis /ed. by R.K.Muller. Leipzig, 1995/-846 p., с.372 растворимость парацетамола г/100 г растворителя: вода - 1,4; кипящая вода - 5; этанол - 14,4; хлороформ - 2; ацетон - растворим; диэтиловый эфир - слегка растворим; бензол - нерастворим



Показания:

Лихорадочный синдром Лихорадочный синдром на фоне инфекционных заболеваний, болевой синдром (слабой и умеренной выраженности):  
артралгия Лихорадочный синдром на фоне инфекционных заболеваний, болевой синдром (слабой и умеренной выраженности):  
артралгия,  
миалгия Лихорадочный синдром на фоне инфекционных заболеваний, болевой




# АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

**Ацетилсалици́ловая кислота́**  
(лат. *Acidum acetylsalicylicum*,  
англ. *Acetylsalicylic acid*, салициловый  
эфир, салициловый эфир уксусной  
кислоты, салициловый эфир уксусной  
кислоты) — лекарственное средство,  
салициловый эфир уксусной кислоты) —  
лекарственное средство, оказывающее  
анальгезирующее, салициловый эфир  
уксусной кислоты) — лекарственное  
средство, оказывающее  
анальгезирующее (обезболивающее),  
жаропонижающее, салициловый эфир  
уксусной кислоты) — лекарственное  
средство, оказывающее  
анальгезирующее (обезболивающее),  
жаропонижающее,  
противовоспалительное, салициловый  
эфир уксусной кислоты) —  
лекарственное средство, оказывающее



# МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ

**Метамизол натрия**  
(новолат. *Metamizol natrii*, в России более известен как «**Анальгин**» (лат. *Analginum*) или «**Баралгин**») или «**Баралгин**», натриевая соль [(2,3-дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1H-пиразол-4-ил) метиламино] метансульфоновой кислоты, в т. ч. в виде моногидрата) — лекарственный препарат из группы антипирина, обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.



# БРОМГЕКСИН

**Бромгексин (bromhexinum)** — лечебный препарат, оказывающий муколитическое (секретолитическое), отхаркивающее и слабое противокашлевое действие.

Муколитический эффект — лечебный препарат, оказывающий муколитическое (секретолитическое), отхаркивающее и слабое противокашлевое действие.


Муколитический эффект связан с деполимеризацией и разжижением мукопротеиновых и мукополисахаридных волокон. По современным

представлениям одной из важных особенностей действия бромгексина является его способность стимулировать образование сурфактанта — лечебный препарат, оказывающий муколитическое (секретолитическое), отхаркивающее и слабое противокашлевое действие.



# ЦЕФТРИАКСОН


Цефтриаксон (6R-бальфа, 7бета(Z)-7-2-амино-4-тиазолил (метоксиимино)ацетил амино-8-оксо-3-(1,2,5,6-тетрагидро-2-метил-5,6-диоксо-1,2,4-триазин-3-ил) тиометил-5-тиа-1-азабицикло 4.2.0 окт-2-ен-2-карбоновая кислота (в виде динатриевой соли)) — антибиотик (6R-бальфа, 7бета(Z)-7-2-амино-4-тиазолил (метоксиимино)ацетил амино-8-оксо-3-(1,2,5,6-



Объект исследования	Концентрации, мкг/мл	Концентрации относительно сыворотки крови, %	Концентрации, усл. ед.
Сыворотка	30-257 (в/в)	100	3
Лимфа	–	–	3
Ткани	–	–	3
Внутриклеточно	–	–	1
Желчь	581-898	>=1000	4
Кости	32	–	2
Плевральный <u>экссудат</u>	–	–	3
Перитониальный <u>экссудат</u>	–	–	3
Синовиальный <u>экссудат</u>	–	–	3
Ликвор (норма)	5.6	–	0
Ликвор (при воспалении)	6.5	4.9	1
Моча	600-2700	>=600	4
Мокрота	–	–	2
Плацента	–	20	1
Молоко матери	–	25	1

# АРБИДОЛ


«Арбидол» (Arbidolum, химическое название: метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир, МНН: *umifenovirum*[4][4]) — российский противовирусный препарат[4]) — российский противовирусный препарат, оказывает иммуномодулирующее[4]) — российский противовирусный препарат, оказывает иммуномодулирующее и противогриппозное действие, специфически подавляя вирусы гриппа[4]) — российский противовирусный препарат, оказывает иммуномодулирующее и





# МЕТРОНИДАЗОЛ

**Метронидазол**  
(лат. *Metronidazolium*,  
действующее вещество:  
1-(β-оксиэтил)-2-метил-5-  
нитроимидазол) —  
**противопротозойный и**  
**противомикробный**  
**антибиотик**, производное 5-  
нитроимидазола. Белый или  
слегка зеленоватый  
кристаллический порошок.  
Малорастворим в воде,  
трудно- в спирте.



# Линимент бальзамический

**Линимент бальзамический (по Вишневскому)** (мазь Вишневского) — **мазь (по Вишневскому)** — мазь антисептического, раздражающего действия. Обладает сильным, характерным и легко узнаваемым запахом. Автором этого лекарства стал врач-хирург А. В. Вишневский (мазь Вишневского) — мазь антисептического, раздражающего действия. Обладает сильным, характерным и легко узнаваемым запахом. Автором этого лекарства стал врач-хирург А. В. Вишневский. При смешивании дёгтя березового (мазь Вишневского) — мазь антисептического, раздражающего действия. Обладает сильным, характерным и легко узнаваемым запахом. Автором этого лекарства стал врач-хирург А. В. Вишневский. При смешивании дёгтя березового, ксероформа и касторового масла, он получил состав в форме мази, которая обладает важными функциями:  
порошок ксероформа производит антисептическое воздействие;  
деготь березовый увеличивает приток крови к тканям (усиливает воспаление!);  
касторовое масло смягчает и помогает остальным веществам проникнуть вглубь кожи.

Лекарственная форма представляет собой линимент (он более жидкий, чем мазь и легче распределяется по коже или ране). Из-за наличия антимикробных («бальзамирующих») компонентов — ксероформа и березового дегтя — автор назвал его «бальзамический линимент». В дальнейшем за оригинальной рецептурой было закреплено название

перексид водорода (перекись водорода),  
H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> — простейший представитель пероксидов —  
простейший представитель пероксидов.


Бесцветная жидкость с «металлическим»  
вкусом — простейший представитель пероксидов.

Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом,  
неограниченно растворимая в воде —  
простейший представитель пероксидов.

Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом,  
неограниченно растворимая в воде, спирте —  
простейший представитель пероксидов.

Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом,  
неограниченно растворимая в воде, спирте и  
эфире — простейший представитель пероксидов.

Бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом,  
неограниченно растворимая в воде, спирте и  
эфире. Концентрированные водные растворы  
взрывоопасны. Пероксид водорода является  
хорошим растворителем. Из воды выделяется в



H O O H

Молекула пероксида водорода имеет следующее строение:

