

Суицид



Джумаевой Алины
ученицы 8 "Г" класса
школы №2033

Причины суицида.

- Личностные деформации субъектов и обстановки, которая травмирует психически, но и в социально-экономической и моральной организации общества.
- Семейные конфликты являются причиной 60-80% суицидов.
- Измены любимого(ой)
- Неудачи с работой. Проблема её найти; проблемы с начальством.
- Случайные суициды. От переизбытка алкоголя, неосторожности, рискованности (Намеренная рискованность.)
- По причине психических расстройств, инвалидности, наркомании.
- Осуждения со стороны близких.
- Неразделенная любовь; Потеря близких, друзей



Способы покончить жизнь самоубийством:

- Повешение Отравление
- Передозировка лекарственных средств
- Падение с высоты
- Вскрытие вен
- Прыжок под поезд
- Выстрелить в себя
- и т. д.



Подростковый суицид.



- I will take revenge on all

- I will take revenge on all



*- Everything has beauty,
But not everyone sees it...*

Причина суицида у подростков.

- Ситуация в семье чаще всего считается инициатором суицида
- Многие подростки совершают суицид ради того что бы показать своим бывшим, друзьям-предателям что из-за них они совершили самоубийство
- Долгое одиночество усугубляет самооценку одиночки. Появляются мысли о суициде, и в таком продолжении мысли образуются в явь. Человек сам себя уничтожает.
- Эгоистичные и самовлюбленные подростки часто обижают и оскорбляют слабых. Естественно психика ребенка часто не выдерживает.
- «Вирус самоубийства»- это влияние культуры. Это культ смерти и подражания. Когда подростки начинают пародировать, быть как свои любимые герои книг, кинофильмов и анимаций.



Семейные отношения.



Несчастливая любовь.



Школа и учеба.

Сюда картинки

Мода на суицид.

Сюда картинку



Как предотвратить самоубийство?

Не все самоубийства можно предотвратить, но большинство – можно. Имеется ряд мер, которые могут быть приняты на уровне общин и стран для снижения риска, в том числе:


- уменьшение доступа к средствам самоубийства (таким, как пестициды, лекарственные препараты, оружие);
- лечение людей с психическими расстройствами (особенно тех, кто страдает депрессиями, алкоголизмом и шизофренией);
- последующее наблюдение за людьми, совершившими попытку самоубийства;
- ответственный подход СМИ к представлению информации;
- подготовка работников по оказанию первичной медико-санитарной помощи.



В более личном плане важно знать, что лишь незначительное количество самоубийств происходит без предупреждения. Большинство самоубийц открыто предупреждает о своих намерениях. Поэтому ко всем угрозам такого характера необходимо относиться серьезно. Кроме того, большинство людей, пытающихся покончить с собой, внутренне противоречивы и не имеют окончательного намерения умереть.

Многие самоубийства происходят в период улучшения состояния, когда у человека появляется энергия и сила воли для того, чтобы перейти от отчаяния в мыслях к разрушительным действиям. Однако тот факт, что человек когда-либо пытался покончить с собой, вовсе не означает, что он всегда будет входить в группу риска: мысли о самоубийстве могут вернуться, но они не постоянны, а у некоторых людей такие мысли могут больше никогда не появляться

Ежегодно 900 тысяч человек кончают жизнь самоубийством. Это означает, что каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство. Самоубийства входят в число трех основных причин смерти людей в возрасте 15 – 44 лет во всем мире.




They know nothing...

Решение проблемы снижения самоубийств среди людей с психическими расстройствами и среди населения в целом требует решительности и политической воли со стороны систем здравоохранения, профессиональных психологов и психиатров, государственных чиновников. Службы здравоохранения должны стремиться к своевременному диагностированию психических расстройств. При этом следует уделять повышенное внимание проблеме борьбы с негативным отношением и дискриминацией, которые очень часто сопровождают психические расстройства и самоубийства, для того, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, смогли ее получить на раннем этапе. Также необходимо, чтобы услуги психологов были доступны для всего населения, независимо от социального статуса.



Альтернатива.

Во-первых, нужно убрать плохие мысли из головы. Во-вторых, попробовать решить проблему. Если же проблема не решается, стоит обратиться за помощью к родным и близким. Если же не вышло стоит начать (по крайней мере попробовать) новую жизнь. Заняться своим развитием, найти свой талант, занятия которые тебе по душе. Иногда стоит посетить психолога.



Вывод:

Со смертью каждого человека гибнет Вселенная – неповторимый мир идей, чувствования, переживаний, мир индивидуального, неповторимого опыта. Очевидно, что общество не может и не должно по отношению к этому оставаться спокойным и безучастным.

Наша общая задача заключается в том, чтобы, по возможности, ограничить распространение самоубийств, научиться эффективно предупреждать их. Однако задача эта чрезвычайно сложная, так как для решения ее необходимо добиться кардинальных позитивных сдвигов в общественных отношениях как на макро- так и на микросоциальном уровнях.

Наверное, можно утверждать, что в определенном смысле распространение самоубийств, их частота отражают моральное здоровье общества, уровень социальной напряженности, наконец, просто благополучие людей.

