ПУШНОЕ ЖИВОТНОЕ

СОБОЛЬ

СОСНОВСКАЯ Н. А.

МЕХ ПЫШНЫЙ, ШЕЛКОВИСТЫЙ, С БЛЕСТЯЩЕЙ ОСТЬЮ. ОБЩАЯ ОКРАСКА МЕХА ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ СВЕТЛОЙ ЖЕЛТОВАТО-БУРОЙ ДО ТЕМНОЙ ЧЕРНОВАТО-КОРИЧНЕВОЙ.

ДЛИНА ТЕЛА У СОБОЛЕЙ ПОДВЕРЖЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ КОЛЕБАНИЯМ: У САМЦОВ ОНА КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 40 ДО 56 СМ, У САМОК — ОТ 35 ДО 47 СМ. ХВОСТ С КОНЦЕВЫМИ ВОЛОСАМИ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАВЕН 1/3 ДЛИНЫ ГОЛОВЫ И ТУЛОВИЩА И ЕДВА ВЫДАЕТСЯ ЗА КОНЦЫ ВЫТЯНУТЫХ ЗАДНИХ НОГ; ЧИСЛО ХВОСТОВЫХ ПОЗВОНКОВ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 16. ПОДОШВЫ ЛАП ПОКРЫТЫ ГУСТЫМИ, ЖЕСТКИМИ ВОЛОСАМИ.

Соболь — зверок оседлый; лишь значительный неурожай кормов, пожары, рубка леса и другие подобные факторы вызывают его переселения.

НА УЧАСТКЕ ОБИТАНИЯ СОБОЛЬ ПРОДЕЛЫВАЕТ ЗВЕЗДООБРАЗНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ СУТОЧНЫЕ ХОДЫ. ЗИМОЙ СОБОЛЬ УДАЛЯЕТСЯ ОТ ГНЕЗДА НА 2-3 КМ, ПРИЧЕМ КАЖДЫЙ ЗИМНИЙ ВЫХОД, ЗВЕРКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОЛЬЦО С ВОЗВРАЩЕНИЕМ К ГНЕЗДУ. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА ОБИТАНИЯ КАЖДОГО СОБОЛЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСЯТ ОТ КОРМОВЫХ УГ

Соболь питается как животной, так и растительной пищей.

В различные сезоны года видовой состав кормов изменяется. Круглогодичными кормами соболя являются различные виды мышевидных грызунов, обитающих в тайге. Дополнительными кормами в течение года служат белки, зайцы, куриные птицы и кедровые орехи (зимой). Летом состав кормов соболя разнообразнее, так как он поедает, кроме грызунов, яйца птиц и пресмыкающихся, различные ягоды. Особенно хорошо он ест бруснику и рябину.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ СОБОЛЯ НЕИЗВЕСТНА. В ОДНОМ ЗВЕРОСОВХОЗЕ САМКА В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ РОДИЛА ЕЩЕ ДВУХ СОБОЛЯТ. ПРОЦЕСС ЛИНЬКИ У СОБОЛЯ ИЗУЧЕН НЕДОСТАТОЧНО. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО СОБОЛИ ЛИНЯЮТ ДВА РАЗА В ГОД—ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ

Выделанные шкурки соболей употребляются для изготовления высокоценных меховых изделий — воротников, горжеток и головных уборов. Шкурки темной расцветки употребляются в натуральном виде. Шкурки светлой окраски обычно подкрашиваются под темные.

www.zooexpo.plJPG,
ferrettips.tumblr.comJPG,
mojafretka.blox.plJPG,
totallylegit.wordpress.comJPG,
vk.comJPG,
Fishing.kz