

# Скорость света

Педагог: Васильева Марина Викторовна

Презентация для 8 класса

МОУ СОШ №13

2009 год

О природе света размышляли с древних времен:


- Пифагор (около 580-500 лет до нашей эры): «Свет – это истечение «атомов» от предметов в глаза наблюдателя».
- В XVI-XVII веках Рене Декарт (французский физик, 1596-1650), Роберт Гук (английский физик, 1635-1703), Христиан Гюйгенс (голландский физик, 1629-1695) исходили из того, что распространение света – это распространение волн в среде.
- Исаак Ньютон (английский физик, 1643-1727) выдвигал корпускулярную природу света, т. е. считал, что свет – это излучение телами определенных частиц и их распространение в пространстве.

Одна из первых попыток измерить скорость света принадлежала Галилео Галилею.

- На вершине двух холмов на расстоянии 1,5 км друг от друга находились два наблюдателя с фонарями.
- Первый наблюдатель подавал сигнала фонарем другому, который, увидев свет, посылал сигнал своим фонарем обратно.
- Промежуток времени между посылкой и приемом сигнала первый наблюдатель измерял по числу ударов пульса.
- Время получалось конечным и очень малым.
- Галилей понял, что задержка ответного сигнала связана со скоростью реакции нервной и мышечной систем человека, а не с конечной скоростью света.



Не удалось измерить скорость света.



Галилео Галилей  
15 февраля 1564 – 8 января 1642



# Астрономический метод измерения скорости света


Впервые скорость света удалось измерить датскому учёному О. Рёмеру в 1676 году.

Для измерений он использовал расстояния между планетами Солнечной системы. Рёмер наблюдал затмения спутника Юпитера Ио.



Оле Кристенсен Рёмер  
25 сентября 1644 – 19 сентября 1710

- Радиус орбиты спутника Ио вокруг Юпитера равен 421600 км, диаметр спутника – 3470 км.
- Рёмер видел, как спутник проходил перед планетой, а затем погружался в её тень и пропадал из поля зрения. Затем он опять появлялся, как мгновенно вспыхнувшая лампа.
- Промежуток времени между двумя вспышками оказался равным 42 часа 28 минут.






- Вначале измерения проводились в то время, когда **Земля** при своём движении вокруг Солнца **ближе всего** подошла к **Юпитеру**.
- Такие же измерения через 6 месяцев, когда **Земля** удалилась от **Юпитера** на диаметр своей орбиты.
- Спутник **опоздал** появиться из тени на **22 минуты**, по сравнению с расчётом.
- Пусть  $T_1$  - момент времени, когда Ио выходит из тени Юпитера по часам на Земле, а  $t_1$  реальный момент времени, когда это происходит; тогда

$$T_1 = t_1 + S_1 / c$$

Где  $S_1$  - расстояние, которое свет проходит до Земли.



$$T_1 = t_1 + S_1 / c$$

В следующий выход Ио:

$$T_2 = t_2 + S_2 / c$$

Где  $S_2$  - новое расстояние, которое свет проходит до Земли.

$$T_0 = t_2 - t_1$$

Истинный период обращения Ио вокруг Юпитера.

$$c = \frac{S_2 - S_1}{T_{набл} - T_0}$$

Скорость света после двух последовательных измерений времени выхода Ио из тени.

Величины  $S_1$  и  $S_2$  находятся из астрономических вычислений.

Суммарное время затмения за полгода, где  $n$  - число затмений за это время.

$$t_1 = nT_0 + \frac{\Delta S}{c} = nT_0 + \frac{R_J + R_3}{c} - \frac{R_J - R_3}{c}$$




$$c = 214300 \text{ км/с}$$



# Лабораторные методы измерения скорости света

**Впервые** скорость света лабораторным методом удалось измерить французскому физику **И. Физо** в 1849 году.




Арман Иполлит Луи Физо  
23 сентября 1819 – 18 сентября 1896



- Свет от источника попадал на зеркало, затем направлялся на периферию быстро вращающегося колеса.
- Затем достигал зеркала, проходил между зубцами и попадал в глаз наблюдателя.
- Угловая скорость вращения подбиралась так, чтобы свет после отражения от зеркала за диском попадал в глаза наблюдателю при прохождении через соседнее отверстие.

- Колесо вращалось медленно → свет был виден.
- При увеличении скорости свет постепенно исчезал.
- При дальнейшем увеличении скорости вращения → свет опять становился видимым.

$$c = 313000 \text{ км/с}$$



- Американский физик А. Майкельсон разработал совершенный метод измерения скорости света с применением вместо зубчатого колеса вращающихся зеркал.
- Была измерена скорость света в различных прозрачных веществах. Скорость света в воде была измерена в 1856 году: в  $4/3$  раза меньше, чем в вакууме.

## **Скорость света:**

1. Максимально возможная скорость для материальных тел.
2. Последние достижения (1978 г.) дали для скорости света следующее значение  $c = 299792,458 \text{ км/с} = (299792458 \pm 1,2) \text{ м/с}$ .
3. Во всех других веществах скорость света меньше, чем в вакууме.