

## Каракурт


Презентацию подготовил ученик 7 класса б Репников Никита



- <u>1. Описание</u>
- <u>2. Ареал</u>
- 3. Размножение
- 4. Опасность для человека и животных

• Каракурт имеет среднюю величину: самка 10—20 мм, самец 4—7 мм. Тело чёрное, у самца и самки на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймле**нием** Ой!! вокруг каждого пятна. Полностью половозрелые особи иногда приобретают чёрный цвет без пятен, с характерным блеском (за счёт скрещиваний внутри рода Latrodectus, в том





В последнее десятилетие случаи укусов меня в остали также каракурта стали также регистрироваться в Азербайджане. В последнее время увеличилась численность в Ростовской области, появились находки данного вида в Алтайском крае и Новосибирской области. В 2010 году они так же были обнаружены в Волгоградской и Саратовской областях. Зоны вредоносности: Зона распростран

- В жаркие годы каракурт может мигрировать и в более северные районы, например Подмосковье. И даже на гораздо более высоких широтах иногда он может встречаться, но жить он там может только до зимы. Идеальные условия местообитания там, где жаркое лето и тёплая осень.
- Основные места обитания— полынная целина, пустоши, берега арыков, склоны оврагов и т. п.
- Врагами каракурта являютоя осычня наездники, ежи, их кладки вытаптываются отарами овещниковитей по-видимому, не страдающих от тих вытагный вытагты вытагты

- Каракурт очень плодовит, и периодически (раз в 10—12 или 25 лет) наблюдаются вспышки его массового размножения.
- Для жилья и размножения самка строит логовище в углублениях почвы, часто в норах грызунов и френажах вентиляционных систем, растягивая у входа ловчие тенета из неправильно переплетённых нитей. Зимуют яйца в коконах, которые по два — четыре подвешиваются в логовище. Молодь выходит в апреле и разносится на паутине ветром. К июню пауки становятся половозрелыми. С наступлением жары самки и самцы мигрируют, разыскивая защищённые места, где устраиваются временные сети для спаривания. После этого самки снова бродят в поисках мест для устройства постоянного поговища, где



**Для лечения применяют** противокаракуртовую сыворотку, хорошие результаты даёт также внутривенное введение новокаина, хлорида кальция и гидросульфата магния. П. И. Мариковский предложил прижигание укушенного места воспламеняющейся головкой спинки, но обязательно не позднее двух минут после укуса. От нагревания не успевший всосаться яд разрушается так как паук прокусывает кожу своими хелицерами на глубину всего 0,5 мм. В любом случае необходимо обеспечить оказание медицинской

© vaxpopuli.kz

• Для ограждения спящего от заползания каракурта применяют полог, хорошо натянутый и подвернутый краями под постель. От укусов каракурта сильно страдает скот, особенно чувствительны верблюды и лошади, которые обычно погибают. В годы массового размножения этого паука не раз происходил значительный падёж скота, и животноводство терпело большие убытки. Теперь в масточ поомистив



## Спасибо за ваше огромное внимание.