

Перенашивание беременности

Синдром нарушения созревания
плода при беременности
продолжающейся более 42 недель

Перенашивание беременности

- Частота 8 %
 - Истинное перенашивание – перезрелый ребенок.
 - Пролонгированная беременность – функционально зрелый новорожденный
 - Роды ЗАПОЗДАЛЫЕ
- **Причины:**
 - ▣ *Нарушение гормонального баланса накануне родов (↓эстрогенов и ↑прогестерона и ХГЧ)*
 - ▣ *Ожирение*
 - ▣ *Пороки развития плода (в 10-15 раз чаще)*
 - ▣ *Повышение уровня токоферола*
 - ▣ *Наследственный фактор*

Перенашивание беременности

- Наиболее продолжительная зарегистрированная беременность составляла 1 год 24 дня – родился живой ребенок с анэнцефалией



Перенашивание беременности

- После 40 недель плод не растет. Потребность в O₂ повышается а метаболическая и дыхательная функция плаценты снижается. Вторичные изменения: кальцинаты, инфаркты
- **Признаки перезрелости: (синдром Беллентайна-Рунге)**
 - *Слабое развитие гиподермы*
 - *Сухая морщинистая кожа*
 - *Длинные ногти*
 - *Отсутствие сыровидной смазки*
 - *Мацерация («банные» стопы и ладошки)*
 - *Плотные кости черепа, узость швов и родничков*
 - *Мекониальное окрашивание кожи, ногтей*

Диагностика

- Календарный метод
- Снижение веса
- Уменьшение окружности живота
- Мекониальное окрашивание вод
- Внутриутробное страдание плода, уменьшение шевелений
- Появление молока
- УЗИ


Тактика

(госпитализация в сроке 41 неделя)

- 1. Оценить готовность организма беременной к родам (зрелость шейки матки)**
- 2. Оценить состояние плода (УЗИ доплер, КТГ)**
- 3. Оценить соматического и акушерского статуса (факторы осложняющие течение беременности)**

Критерии зрелости шейки матки:

1. **Консистенция – мягкая**
2. **Длина - $\leq 1,5$ см**
3. **Положение – по центру**
4. **Пройодимость
канала - $>$ чем 1 палец**



Кесарево сечение в плановом порядке

□ **зрелость шейки матки**

□ **состояние плода**

□ **соматический и акушерский статус**

- Возраст первородящей
- Узкий таз
- Тазовое предлежание плода
- Крупный плод
- Гипотрофия плода
- Отягощенный акушерский анамнез
- Рубец на матке
- + незрелая шейка матки и гипоксия плода

**Родовозбуждение. Амниотомия. При
отсутствии схваток через 2-3 часа
окситоцин или энзапрост внутривенно**

**▣ зрелость шейки
матки**

▣ Зрелая

**▣ состояние
плода**

▣ Плод не страдает

**▣ соматический и
акушерский
статус**

▣ Не отягощен

Подготовка шейки матки с последующим родовозбуждением (амниотомией)

- ▣ *зрелость шейки матки*
- ▣ *состояние плода*
- ▣ *соматический и акушерский статус*
- ▣ Не зрелая
- ▣ Плод не страдает
- ▣ Не отягощен

Ведение родов

- Постоянный КМ контроль
- Функциональная оценка таза
- Профилактика внутриутробной гипоксии плода
- Профилактика кровотечения в III периоде родов и раннем послеродовом периоде