

A photograph of a lush tropical conservatory. The scene is filled with various green plants, including palm trees and ferns. A stone path with steps leads through the vegetation. The conservatory has a glass and metal structure visible in the background. The text "Экологические группы растений" is overlaid on a white rectangular background in the center of the image.

Экологические группы растений


Экологические группы растений – группы растений со сходными чертами организации, отражающими приспособленность к определенному *лимитирующему* фактору

Лимитирующим называется фактор, оказывающий настолько мощное влияние на растения, что влиянием остальных можно пренебречь

Основные лимитирующие факторы растений:

- **температура** (мега-, микро- и мезотермные);
- **влага** (гидро-, гигро-, мезо-, ксерофиты);
- **свет** (сцио- и гелиофиты);
- **субстрат** (лито- и псаммофиты, кальце- и нитрофилы, оксило- и галофиты, эпифиты)

**Экологические группы растений
по отношению к влаге**



Гидрофиты – растения, обитающие в воде

Гидатофиты – отрастающие от дна или свободно плавающие водные растения, все вегетативные органы которых находятся в толще воды

Аэрогидатофиты – растения с плавающими на поверхности воды листьями, остальные части которых погружены в воду (могут отрастать от дна или свободно парить в толще воды)

Реофиты – прикрепленные, полностью погруженные в воду растения, обитающие в ручьях и реках с быстрым течением


Гелофиты – полупогруженные в воду растения, населяющие мелководья и влажные берега

Гигрофиты – наземные растения, обитающие в условиях очень высокой влажности воздуха (около 100%) – под пологом тенистых лесов и в глубоких темных ущельях

Особенности водной среды

1. Недостаток света (особенно на глубине)
2. Питательные вещества растворены в воде
3. Недостаток кислорода
4. Высокая плотность воды, поддерживающая растения
5. Температурные колебания сглажены (если водоем не промерзает на всю глубину)

Гидрофиты



А – реофит *Aponogeton fenestralis*;

Б – аэрогидатофит лютик водный (*Ranunculus aquatilis*);

В – гидатофит валиснерия спиральная (*Vallisneria spiralis*);

Г – гидатофит уруть мутовчатая (*Myriophyllum verticillatum*);

Д - аэрогидатофит водокрас лягушачий (*Hydrocharis morsus-ranae*)

Растения с плавающими листьями (аэрогидатофиты) в ботаническом саду им. В.Л. Комарова




**Плавающие листья
Кувшинки амазонской (*Victoria regia*)**




Особенности строения гидрофитов

1. Корневая система развита слабо или отсутствует.
2. Большая поверхность органов по сравнению с массой тела, сильное расчленение листьев («листья-жабры»).
3. Наличие хлоропластов в клетках эпидермы
4. Отсутствие кутикулы и устьиц (кроме аэрогидатофитов).
5. Нет хорошо выраженной механической ткани, слабо развита проводящая система.
6. Крупные межклетники – увеличение плавучести и газообмена.
7. Появление разнолистности (гетерофиллии) у листьев, произрастающих в разных средах (вода и воздух).
8. Семенное размножение угнетено, преобладает вегетативное (частями побегов, корневищами, особыми почками – турионами)


Анатомическое строение гидрофитов



Б



Г 5 12



7 2 Д

Б – сегмент листа урути (*Myriophyllum* sp.);

Г – стебель элодеи канадской (*Elodea canadensis*);

Д – листовая пластинка гидатофита зостеры морской (*Zostera marina*)

1- астроклереида;

2- воздухоносный ход;

3- гидатода;

4- губчатая паренхима;

5- ксилема;

6- кортикальная паренхима;

7- мезофилл;

8- проводящий пучок;

9- столбчатая хлоренхима;

10- склеренхимные волокна;

11- устьице;


12- флоэма;

13- эпидерма


Внешний вид, строение стебля (А,Б) и листа (В) рдеста пронзеннолистного (*Potamogeton perfoliatus*)



А – схема строения стебля;
Б - фрагмент стебля;
В – половина листовой пластинки



Гелофиты – полупогруженные в воду растения




А – Стрелолист обыкновенный (*Sagittaria sagittifolia*); **Б** – деталь поперечного среза листовой пластинки *Сыти* очереднолистной (*Cyperus alternifolius*): 1- воздухоносный ход; 2- губчатая хлоренхима; 3- кутикула; 4- надводный лист; 5- подводный лист; 6- палисадная хлоренхима; 7- плавающий лист; 8- эпидерма

Гигрофиты – растения, обитающие на сильно увлажненной почве при относительной влажности 80-100% (под пологом леса, в глубоких ущельях)

Особенности строения гигрофитов


1. Тонкая кутикула листа
2. Листовые пластинки тонкие (иногда однослойные), хлоропласты могут содержаться в основных клетках эпидермы
3. Постоянно открытые и приподнятые устьица
4. Мезофилл только губчатый
5. Редкие живые трихомы

Внешний вид и строение листа гигрофита *Сыти очереднолистной (Cyperus alternifolius)*



Видна мощная система воздухоносных межклетников, все клетки сильно обводнены

Строение листовой пластинки гигрофита *руелии* (*Ruellia portelle*)



1- губчатая хлоренхима; 2- палисадная хлоренхима; 3- трихома; 4- устьице; 5- эпидерма


Фрагмент экспозиции тропического леса в ГБС им. В.Л. Комарова



**Фрагмент экспозиции биотопа с высокой влажностью
в ГБС им. В.Л. Комарова (растения – гигрофиты)**



**Экологические группы растений
по отношению к влаге**



Ксерофиты – растения, приспособленные к существованию при длительном сезонном дефиците влаги

Суккуленты – растения, запасующие большое количество воды в короткие влажные периоды и экономно расходующие ее во время засухи


Запас влаги осуществляется **водозапасающей паренхимой**, придающей некоторым органам суккулентов (стеблям или листьям) **мясистость**

Склерофиты – растения, обитающие в условиях длительной засухи и содержащие запас воды в **водоносной склеренхиме**. Главный механизм борьбы с водным дефицитом - **высокая сосущая сила** (60-80 атм) и глубоко проникающая в почву корневая система

Особенности строения ксерофитов

1. Особое строение эпидермы, снижающее *транспирацию*: мощная кутикула, восковой налет, густое опушение из мертвых кроющих трихомов, толстые наружные стенки клеток
2. Погруженные устьица
3. Способность всасывать конденсационную влагу трихомами эпидермы
4. Сильное развитие водозапасающих тканей - паренхимы (суккуленты) или склеренхимы (склерофиты)
5. Создание высокой осмотической силы в водоносных тканях и корнях
6. Клетки тканей сильно склерифицированы, межклетников мало – уменьшается внутренняя испаряющая поверхность (склерофиты)
7. Уменьшение поверхности листа (от скручивания до полной редукции листьев)
8. Хорошо развита корневая система (комбинированного типа), способность образовывать временные корни (на время влажного периода)

Стеблевые суккуленты



1 – схема строения побегов кактуса (а- ареолы);

2 – часть побега и цветок кактуса;


3 - часть побега и цветок молочая (*Euphorbia*);

4 – солерос (*Salicornia herbacea*);

5 - опунция




Листовые суккуленты



- 1 – алоэ (*p. Aloe*);
- 2 – очиток (*p. Sedum*);
- 3 – агава (*p. Agave*);
- 4 – молодило (*p. Sempervivum*)




Анатомическое строение листовых суккулентов



- А, Б – схема и фрагмент листовой пластинки дазилириона;
- В – лист очитка;
- Г – псаммофит джужгун (лист)

Внешний вид и строение листа олеандра (*Nerium oleander*)




Видна хорошо развитая
кутикула и гиподерма

Экологические группы автотрофных растений по отношению к субстрату

1. Литофиты (петрофиты)
2. Псаммофиты
3. Кальцефилы
4. Нитрофилы
5. Оксилофиты (ксероморфные олиготрофы)
6. Галофиты
7. Эпифиты

Псаммофиты (А,Б) и литофит (В) в условиях пустыни



А – образование придаточных корней на побегах песчаной акации (*Ammodendron* sp.), Б – песчаные чехлы на корнях селина (*Aristida karelinii*), В –остролодочник углубленный (*Oxytropis immersa*) в расщелине камней


Гребенщик многоветвистый (*Tamarix ramosissima*) общий вид и отдельная ветвь



**Ксероморфные олиготрофы
(Багульник обыкновенный, Мирт болотный,
Подбел болотный)**




Анатомическое строение листа багульника (*Ledum palustre*) (А,Б) и стебля тамарикса (*Tamarix ramosissima*) (В,Г)




В.п.-воздухоносная полость; **в.пфл.**-волокна протофлоэмы; **в.эп.**-верхняя эпидерма; **г.в.**- головчатые волоски; **г.мзф.**-губчатый мезофилл; **к**-кутикула; **кмб**-камбий; **кс**-ксилема; **л.п**-листовой прорыв; **л.с**-листовой след; **мж**-межклетник; **н.эп**-нижняя эпидерма; **о.л**-основание чешуйчатого листа ; **п.п**-проводящие пучки; **сл.ж**-солевая железка; **у**-устьице; **фл**-флоэма

Внешний вид и строение галофитов




А- внешний вид солероса; Б- поперечный срез стебля *Артрокнеума*;
В- поперечный срез листовой пластинки *Лебеды мягкой*; Г- поперечный срез
листовой пластинки *Авиценнии морской*

Внешний вид и строение сциофита и гелиофитов



А- лист кислицы (*Oxalis acetosella*); Б,В-внешний вид компасного растения сильфиума (*Silphium laciniatum*) с разных сторон; Г-поперечный срез листа фикуса каучуконосного (*Ficus elastica*); Д-срез листа иссопа мелового; Е-схема листа литопса (*Lithops sp.*)





Эпифитные растения



Экологические группы высших гетеротрофных растений


1. Полупаразиты и паразиты
 - корневые
 - стеблевые
 - микотрофные
2. Хищные растения

Растения - полупаразиты



- А – Марьяник полевой*
- Б – стадии прорастания Марьяника лесного*
- В – гаустория ленца*
- Г – омела (корни под корой растения-хозяина);*
- Д – омела на ветви ветви растения-хозяина;*

Растение-паразит *повилика (Cuscuta)*



- 1 – часть стебля с присосками;
- 2,4 – схема поперечного разреза стебля растения-хозяина и повилики;
- 3, 5 – отдельный побег и общий вид растения, паразитирующего на клевере;
- 6 – стадии развития проростков

Растения - хищники



РосЯнка круглолистная
(*Drosera rotundifolia*)

Листья росЯнки
превращены в ловчий
аппарат