

# **АКУПУНКТУРНАЯ КОРРЕКЦИЯ КОНТРАКТУРЫ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ**

**ЗАВ. КАФЕДРОЙ НЕВРОЛОГИИ, НЕЙРОХИРУРГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ  
ГЕНЕТИКИ ФБОУ ВО ИГМА  
д.м.н., профессор ОСЕТРОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ**

**ИЖЕВСК -2016**

# КОНТРАКТУРА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ - СТОЙКИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТ

Контрактура мимических мышц  
слева



Контрактура мимических мышц  
слева



# КОНТРАКТУРА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ

- Частота - от 7,5 до 73% всех случаев прозоплегий.
- Формируется клиническая картина диаметрально противоположная первоначальной симптоматике прозоплегии.

# КОНТРАКТУРА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ

- ◎ Этиология полностью не установлена.
- ◎ По мнению большинства клиницистов, КОНТРАКТУРА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ ВОЗНИКАЕТ вследствие аберрантной регенерации.
- ◎ Предполагается, что патогенез связан с дисфункцией супрасегментарных и сегментарных вегетативных аппаратов.

# КОНТРАКТУРА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ

- Является трудно курабельным патологическим состоянием.
- **Противопоказаны** лекарственные препараты стимулирующего действия и электропроцедуры.

# КОНТРАКТУРА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ

- ◎ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТРАДИЦИОННО
- ◎ ПРИМЕНЯЕТСЯ АКУПУНКТУРА.
- ◎ ИМЕЕТСЯ ДВА РАЗНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДА К АКУПУНКТУРЕ:
- ◎ 1 –й подход (традиционный). На основе древних восточных постулатов о циркуляции жизненной энергии «ЧИ» в организме по предполагаемым каналам. Необходимо добиться коррекции баланса энергии между отдельными каналами.

# КОНТРАКТУРА МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ

- ◎ Результаты лечения оставляют желать лучшего.
- ◎ 2-й подход. Акупунктура, в нейрофизиологическом плане, рассматривается прежде всего, как рефлексотерапия (Осетров А.С., Пелин А.И., 1994, 2015). При таком подходе становится возможным при воздействии на биологически активные точки кожных покровов получать строго закономерные рефлекторные реакции со стороны определенных внутренних органов и систем. -


# Контрактура мимических мышц

- При 2-м методологическом подходе при составлении акупунктурного «рецепта» предусматривается:
  - - Нормализация реактивности организма с помощью точек широкого спектра действия;
  - - Использование сегментарных точек;
  - - Использование аурикулярных точек.



# Нормализация реактивности организма с помощью точек широкого спектра действия

## Верхняя конечность



# Нормализация реактивности организма

## Нижняя конечность

Цзу-сань-ли 36\_Е





Сань-инь-дзяо 6\_РР



# Область головы

Тоу-вэй 8 E

Бай-хуэй  
20VG



gpn

# Сегментарные точки в области лица

Ян-бай (VB14)

Шэнь-тин (VG24)

Инь-тан (BM3)

Цуань-чжу (V2)


Тун-цзы-ляо (VB1)

Сы-чжу-кун (TR23)


Тай-ян (BM9)

Сы-бай (E2)

Цзюй-ляо (E3)




# Сегментарные точки в области лица





# Точки ушной раковины



- Корпорально-аурикулярная методика коррекции контрактуры мимических мышц может проводиться как отдельно, так и в сочетании с медикаментами, парафиновыми аппликациями, рациональной или суггестивной психотерапией, аутотренингом.
- Продолжительность одного сеанса 30-90 мин. Курс лечения состоит из 10-15 сеансов.

# РЕЗЮМЕ

- АКУПУНКТУРНАЯ КОРРЕКЦИЯ КОНТРАКТУРЫ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТАННОЙ НАМИ КОМПЛЕКСНОЙ
- корпорально-аурикулярной методики
- позволяет в существенной или умеренной степени уменьшить выраженность контрактуры.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

