

# **МЕТОДЫ АНАЛИЗА органических соединений**

***Органическая химия - предмет  
столь же логичный, сколь  
геометрия  
Гриньяр***

# Аналитические методы

- Качественный и количественный *элементный анализ*
- Определение *молекулярной массы*

# Аналитические методы

Позволяют исследовать параметры  
химического строения органических  
соединений:

последовательность и кратность химических связей, координационное число атомов, взаимное влияние атомов и групп атомов в молекуле, внутреннее вращение молекул и прочие перемещения с большими амплитудами, энергетические, электрические и другие молекулярные характеристики

# Аналитические методы


наиболее важные по практическому значению для определения строения органических соединений методы анализа:

- ***масс-спектрометрия***
- ***инфракрасная спектроскопия***
- ***спектроскопия ЯМР***
- ***электронная спектроскопия***

# Спектральные методы

- Спектроскопическими методами анализа называются методы, основанные на ***взаимодействии вещества с электромагнитным излучением***

# Области спектра



$\gamma$ -излучение

рентгеновское излучение



ультрафиолетовое излучение



видимое излучение





инфракрасное излучение



микроволновое излучение



радиоволны



# Электронная спектроскопия

- Можно судить о структуре ***электронных оболочек*** органических молекул




УФ-



# Электронная спектроскопия

- Поглощение веществом электромагнитных колебаний в **ультрафиолетовой** (180-400 нм) и **видимой** (400-700 нм) области обусловлено **переходом электронов** со связывающих орбиталей на разрыхляющие (возбуждение молекулы)

# Электронная спектроскопия





# Электронная спектроскопия

- Практическое значение имеют переходы  $\pi \rightarrow \pi^*$  и  $n \rightarrow \pi^*$
- Группировки, вызывающие избирательное поглощение электромагнитного колебания в видимой и ультрафиолетовой части спектра, называются ***хромофорами***

# Электронная спектроскопия



Хромофорная группа	$\lambda_{\text{макс}}$ , нм	$\epsilon_{\text{макс}}$	Переход	Растворитель
Этиленовая $\text{CH}_2=\text{CH}_2$	165	15 000	$\pi \rightarrow \pi^*$	Газ
$\text{RCH}=\text{CH}_2$	193	10 000		
$\text{RCH}=\text{CHR}$ - <i>транс</i>	177			
<i>-цис</i>	180			
Ацетиленовая $\text{HC}\equiv\text{CH}$	183			
Карбонильная $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O}$	173	6 000	$\pi \rightarrow \pi^*$	»
$\text{CH}_3\text{CH}=\text{O}$	190	1 900	$\pi \rightarrow \pi^*$	<i>n</i> -Гексан
Карбоксильная $\text{CH}_3\text{COOH}$	280	15	$n \rightarrow \pi^*$	Гептан
Азотинная $>\text{C}=\text{N}-$	290	16	$n \rightarrow \pi^*$	Вода
(ацетоксим)	204	60	$n \rightarrow \pi^*$	»
Нитрильная $-\text{C}\equiv\text{N}$	190	5 000	$\pi \rightarrow \pi^*$	
(ацетонитрил)	<160	—	—	—
Азо $-\text{N}=\text{N}-$	347	4,5	$n \rightarrow \pi^*$	Диоксан
(азометан)				
Нитрозо $-\text{N}=\text{O}$	300	100		Эфир
(нитрозобутан)	665	20		
Нитратная $-\text{ONO}_2$	270	12	$n \rightarrow \pi^*$	Диоксан
(этилнитрат)				
Нитро $-\text{NO}_2$	271	19	$n \rightarrow \pi^*$	Спирт
(нитрометан)				
Нитритная $-\text{ONO}$	218,5	1120	$\pi \rightarrow \pi^*$	Петролей-
(амилнитрит)	346,5	(широ-	$n \rightarrow \pi^*$	ный эфир
		кая со		
		струк-		
		турой)		
Сульфоксидная $>\text{S}=\text{O}$	210	1500		Спирт
(циклогексилметилсульфоксид)				
Сульфоновая $>\text{SO}_2$	<180	—	—	—
(диметилсульфон)				

# Спектр поглощения циклопентадиена



# Электронная спектроскопия


- Для *качественного анализа и идентификации*
- Роль «*паспорта вещества*»



# Электронная спектроскопия


- Введение в молекулу различных заместителей или изменение внешних условий (растворителя) обычно вызывает перемещение полосы поглощения






**Рис. XIV.2.** УФ спектры поглощения незамещенного (1) и 2, 6, 2', 6-тетразамещенного (2) дифенила

## Определение изомеров



$$\lambda_{\text{макс}} = 224 \text{ нм} \quad (\epsilon = 24000)$$

$$\lambda_{\text{макс}} = 280 \text{ нм} \quad (\epsilon = 10500)$$




$$\lambda_{\text{макс}} = 228 \text{ нм} \quad (\epsilon = 16400)$$

$$\lambda_{\text{макс}} = 295,5 \text{ нм} \quad (\epsilon = 29000)$$

(в спиртовом растворе)

# Электронная спектроскопия

- Возможность для **количественного анализа** веществ



# Электронная спектроскопия

- Установление строения органических веществ?
- *Мало пригоден*


# Инфракрасная спектроскопия

- Метод функционального анализа (***определение функциональных групп***)

# Инфракрасная спектроскопия

- Изучает *переходы* между *колебательными энергетическими состояниями*, которые связаны с колебаниями атомных ядер относительно равновесных положений и определяются строением молекулы

# ИК спектрометр




# Инфракрасная спектроскопия

## Основные типы колебаний:


- *Валентные*
- *Деформационные*



# Валентные колебания




# Деформационные колебания



а – ножничное, б – веерное, с – крутильное, d - маятниковое

# Инфракрасная спектроскопия

- При поглощении инфракрасного излучения возбуждаются только те колебания, которые связаны с изменением дипольного момента молекулы
- Все колебания, в процессе которых дипольный момент не изменяется, **в ИК-спектрах не проявляются**



# Инфракрасная спектроскопия

**Число и частоты полос зависят:**

- от числа образующих молекулу **атомов**
- **масс атомных ядер**
- строения и **симметрии** равновесной **ядерной конфигурации**
- от **внутримолекулярных сил**

# Инфракрасная спектроскопия

Распределение *интенсивности*


в спектре определяется:

- электрическим ***дипольным моментом*** ( $\mu$ )
- ***поляризуемостью*** ( $\alpha$ )
- изменением  $\mu$  и  $\alpha$  в процессе колебаний

# Инфракрасная спектроскопия

- Идентификация соединений
- Определение симметрии молекул
- ***Наличие функциональных групп***
- Сведения о внутримолекулярных силах
- Межмолекулярные взаимодействия




# Спектр поглощения ацетона






# Инфракрасная спектроскопия

- Для расшифровки ИК спектра необходимо идентифицировать **основные полосы поглощения**
- Значения волновых чисел для различных групп находят в **корреляционных диаграммах** и **таблицах** характеристических частот

Группа X	Химические связи	Alk-X		Ph-X		$\frac{I^S(\text{Ph-X})}{I^S(\text{Alk-X})}$
		$\bar{\nu}, \text{cm}^{-1}$	$I^S$	$\bar{\nu}, \text{cm}^{-1}$	$I^S$	
-CH <sub>3</sub>		2900	40	2900	50	1.2
-SO <sub>2</sub> R		1135	100	1160	80	0.8
-COO	C=O	1745	14	1725	100	7
-CO	C=O	1719	14	1690	160	11
-COCl	C=O	1803	12	1770	170	14
-COH	C=O	1729	13	1704	230	18
-CH=CH <sub>2</sub>	C=C	1642	30	1631	340	11
-C≡CH	C≡C	2118	75	2110	400	5.3
-CN	C≡N	2254	32	2231	330	10
-NO <sub>2</sub>		1380	35	1348	700	20

# 4-нитрофталонитрил



Name

Description

4НФН Sample 001 By Administrator Date понедельник, ноября 29 2010

# Инфракрасная спектроскопия

- ***Определение функциональных групп*** в органических соединениях

# Спектроскопия ЯМР

- ***Самый*** информативный метод в определении структуры органических соединений

# ЯМР спектрометр фирмы Bruker



# Спектроскопия ЯМР

- ***Молекулярную структуру***
- **Динамику молекул**
- **Межмолекулярные взаимодействия**
- **Механизмы химических реакций**
- **Количественный анализ веществ в различных агрегатных состояниях**

# Спектроскопия ЯМР

- Структуру промежуточных продуктов химической реакции: ионов, радикалов, ион-радикалов и др.
- Количественный анализ сложных смесей: продуктов реакции, стереоизомеров, таутомеров и др.



# Спектроскопия ЯМР

- Магнитными свойствами всегда обладают **ядра** с массой, выражаемой **нечетным** **числом**:  $^1\text{H}$ ,  $^{13}\text{C}$ ,  $^{15}\text{N}$ ,  $^{17}\text{O}$ ,  $^{19}\text{F}$ ,  $^{31}\text{P}$  и т. д.


# Спектроскопия ЯМР

- **Ядро  $^1\text{H}$**  имеет самый высокий магнитный момент среди всех других ядер (естественное содержание  $^1\text{H}$  в природе составляет почти 100 %)

# Спектроскопия ЯМР

- Метод **ЯМР  $^{13}\text{C}$**  (содержание изотопа  $^{13}\text{C}$  в природном углероде составляет 1,1% - для записи спектра необходимо проводить накопление сигнала, что требует дополнительного времени)


# Спектроскопия ЯМР



# Спектроскопия ЯМР

- Помещают образец одновременно в **два магнитных поля** – одно постоянное, а другое – радиочастотное

# Спектроскопия ЯМР



# Спектроскопия ЯМР

- Сигналы ЯМР отражают влияние целого ряда слабых **взаимодействий между ядрами и электронами** внутри молекулы, между различными ядрами одной молекулы и между ядрами соседних молекул

# Спектроскопия ЯМР


- Для каждого типа **неэквивалентных атомов** (с магнитными свойствами) имеется **свой сигнал**



# ЯМР-спектр

- ***Зависимость*** поглощенной энергии от частоты и представляет собой ЯМР-спектр

П



# Спектроскопия ЯМР

Важнейшие *характеристики* :

- *Химический сдвиг*  
(определяемый по центру мультиплета)


$$\delta = (\Delta\nu/\nu_0) \cdot 10^6 = (\Delta H/H_0) \cdot 10^6,$$

где  $\Delta\nu$  (или  $\Delta H$ ) – расстояние от резонансной линии до эталонной линии спектра (ТМС), измеренное в Гц

# Химический сдвиг

- Химические сдвиги ЯМР обусловлены ***электронным экранированием ядер***, а величина химического сдвига зависит от наличия тех или иных заместителей

# Химический сдвиг (этилформиат)



# Химический сдвиг

- Хлороформ ( $\text{CHCl}_3$ ) 7,27 м.д.
- Метиленхлорид ( $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ )  
5,3 м.д.
- Метилхлорид ( $\text{CH}_3\text{Cl}$ ) 3,1 м.д.
- Бензол ( $\text{C}_6\text{H}_6$ ) 7,27 м.д.

# Химический сдвиг

- Зависит от внешних факторов: растворителя, концентрации и температуры образца (для функциональных групп, содержащих гетероатомы NH, OH, SH и др.)

# Спектроскопия ЯМР

## Важнейшие *характеристики*

⋮


- ***Мультиплетность***

сигнала, связанная с числом взаимодействующих ядер и их спинами








# Мультиплетность

Йодистый этил  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}$



Вид сигнала	Число линий	Распределение интенсивностей
Синглет	1	1
Дублет	2	1 : 1
Триплет	3	1 : 2 : 1
Квартет (квадруплет)	4	1 : 3 : 3 : 1
Квинтет	5	1 : 4 : 6 : 4 : 1
Секстет	6	1 : 5 : 10 : 10 : 5 : 1
Септет	7	1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1

**M<sub>1</sub>**





# Спектроскопия ЯМР

Важнейшие характеристики :

- Константы ***спин-спинового взаимодействия*** ядер

# Константы спин-спинового взаимодействия ядер




# Спектроскопия ЯМР

Важнейшие характеристики :

- ***Интегральная интенсивность*** сигналов (мультиплетов), отношение интенсивностей компонент мультиплета

# ПМР-спектр этанола



# Спектроскопия ЯМР


- ***Самый информативный метод***  
в определении структуры органических соединений




# Новые методики ЯМР

- *Двумерная* спектроскопия ЯМР
- Информация может быть представлена как функция двух переменных
- Позволяет достигнуть достаточно хорошего разрешения в сложных спектрах

# Пример двумерного спектра



**NOESY-СПЕКТР 1-ЦИКЛОГЕКСИЛ-3-[2-(4-МЕТОКСИФЕНИЛ)-2-ОКСОЭТИЛИДЕН]-2-ОКСО-4Н-ХИНОКСАЛИН-5,6-ДИКАРБОНИТРИЛА 24d**



# Метод масс-спектрометрии


- ***Деструктивный метод***  
(при проведении анализа образец разлагается и исследуются его фрагменты)



# Метод масс-спектрометрии

- Разрушение молекулы под действием электронного удара или химической **ионизации**
- Процесс регистрации **отношения массы к заряду** образующихся осколков

# Схема формирования масс-спектра




# Метод масс-спектрометрии

- ***Определение молекулярной массы***
- Брутто-формулы соединения по картине спектра в области  $M^+$
- Принадлежность к тем или иным классам органических веществ
- Выявление отдельных фрагментов структуры по сериям молекулярного и главных осколочных ионов







# Графическая форма представления масс-спектра





# Цифровая форма масс-спектра

Отношение  $m/z$  (в скобках -  
интенсивности):

- 72(6), 71(2), 58(2), 57(54), 56(17),  
55(5), 53(2), 44(3), 43(100),  
42(86), 41(67), 40(4), 39(21),  
29(46)



# Пример спектра



*Совокупность* физико-химических методов анализа дает исчерпывающее доказательство структуры органического вещества или указание ограниченного числа изомеров

