

Биогенные элементы

Кобальт

27


Co

КОБАЛЬТ

Название химического элемента кобальт происходит от нем. Kobold — домовый, гном. При обжиге содержащих мышьяк кобальтовых минералов выделяется летучий ядовитый оксид мышьяка. Руда, содержащая эти минералы, получила у горняков имя горного духа Кобольда. Древние норвежцы приписывали отравления плавильщиков при переплавке серебра проделкам этого злого духа. Вероятно, имя злого духа восходит к греческому «кобалос» — дым. Этим же словом греки называли лживых людей.

Кобальт — элемент побочной подгруппы восьмой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, атомный номер 27. Обозначается символом Co (лат. Cobaltum).

		VIII				
б		б		а		
				He 2 ГЕЛИЙ 4,003		
9				Ne 10 НЕОН 20,179		
7				Ar 18 АРГОН 39,948		
In	26 Fe ЖЕЛЕЗО 55,849	27 Co КОБАЛЬТ 58,933	28 Ni НИКЕЛЬ 58,7			
5				Kr 36 КРИПТОН 83,8		
Gc	44 Ru РУТЕНИЙ 101,07	45 Rh РОДИЙ 102,906	46 Pd ПАЛЛАДИЙ 106,4			




Нахождение в природе


Массовая доля кобальта в земной коре $4 \cdot 10^{-3}\%$. Кобальт входит в состав минералов. Всего известно около 30 кобальтосодержащих минералов. Кобальту сопутствуют железо, никель, марганец и медь. Содержание в морской воде приблизительно $(1,7) \cdot 10^{-10}\%$.

В организме взрослого человека содержится около 1,5 мг кобальта:

- печень - 0,11 мг,



- скелетные мышцы – 0,20 мг,




- кости – 0,28 мг,




- волосы – 0,31 мг,



- жировую ткань – 0,36 мг.



В
12



Кобальт, один из микроэлементов, жизненно важных организму. Он входит в состав витамина В12 (кобаламин). Кобальт задействован при кроветворении, функциях нервной системы и печени, ферментативных реакциях.

Огромную роль в организме играет:

1. в обмене веществ, в первую очередь в синтезе белков;
2. в способности восстанавливать S-S группы, участвующие в процессах блокирования;
3. в утилизации токсичных элементов

Использование в медицине:

1. лечение постгеморрагических и железодефицитных, вызванных токсическими и лекарственными веществами анемий у детей;
2. лечение заболеваний нервной системы;
3. лечение кожных болезней

Токсикология

- Летальная доза кобальта для животных составляет 25-30 мг/кг.
- Токсическая доза для человека: 500 мг.
- Токсическая доза (LD_{50} для крыс) — 50 мг.
- ПДК пыли кобальта в воздухе 0,5 мг/м³, в питьевой воде допустимое содержание солей кобальта 0,01 мг/л.
- Особенно токсичны пары октакарбонила кобальта $Co_2(CO)_8$

Заболелвания, вызываемые избытком кобальта

- Причины избытка кобальта:
избыточное поступление;

- Основные проявления избытка кобальта:
 1. пневмосклероз, "кобальтовая" пневмония;
 2. поражение сердечной мышцы ("кобальтовая" кардиомиопатия);
 3. аллергодерматиты (контактный дерматит);
 4. гиперплазия щитовидной железы;
 5. поражение слухового нерва;
 6. повышение артериального давления и уровня липидов в крови;
 7. повышение содержания эритроцитов в крови.

Заболевания, вызываемые избытком кобальта

Причины избытка:

1. недостаточное поступление элемента;
2. нарушение регуляции обмена;
3. атрофия слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта;
4. пониженная кислотность желудочного сока;
5. снижение функции поджелудочной железы;
6. глистная инвазия;
7. дефицит витамина B₁₂

Проявление дефицита

8. общая слабость, утомляемость;
9. снижение памяти;
10. вегетососудистые нарушения, аритмии;
11. анемии;
12. замедленное развитие в детском возрасте;
13. медленное выздоровление после заболеваний.

Лекарственные препараты, содержащие кобальт

- Компливит
- Коамид
- Центриум
- Зорекс
- Мульти-табс



Из пищевых продуктов больше всего содержат кобальта:

- горох - 15 мкг/%,



- печень (говяжья) - 13,53 мкг/%,



- свекла - 12,1 мкг/%,



- земляника - 9,8 мкг/%,



- сыр - 4,38 мкг/%



Биологическая роль

- Кобальт задействован при кроветворении, функциях нервной системы и печени, ферментативных реакциях.
- Важнейшая роль кобальта состоит в эндогенном синтезе витамина В₁₂