

# Целые неотрицательные числа

Арифметические действия  
с целыми неотрицательными числами

## Деление

Электронный конспект для студентов  
педагогических колледжей

Составитель:  
преподаватель  
Московского педагогического колледжа №8 «Измайлово»  
Апарцева В. М.

Для продолжения работы щелкните мышкой по управляющей кнопке.



# Содержание:

- Понятие частного целого неотрицательного числа и натурального;
- Связь деления с умножением;
- Порядок действий;
- Отношение делимости. Теорема о единственности частного. Признаки делимости;
- Деление с остатком.
- Свойства деления;
- Алгоритм письменного деления;
- Изучение действия деления в начальном курсе математики.

Множество  $\mathbb{N}_0$

Сложение

Вычитание


Умножение



С помощью этих кнопок можно перейти в электронные конспекты по указанным темам.

Для возвращения в данный конспект нажмите `<esc>`.

Завершение работы

Для продолжения работы щелкните мышкой по соответствующей теме

В начальной школе знакомство с делением происходит при рассмотрении 2-х видов задач, раскрывающих конкретный смысл данного действия: 

 деление по содержанию;  деление на равные части.

**Задание:** Составьте данные задачи по сюжетам, которые появятся на экране после щелчка мышкой по оранжевому или зеленому кругам.

При ознакомлении с делением младшие школьники для нахождения частного выполняют предметные действия с множеством, которое разбивают на равночисленные непересекающиеся подмножества (классы). Эти действия соответствуют такому определению частного:

**Определение 15:** Частным целого неотрицательного числа  $a$  и натурального числа  $b$  называется целое неотрицательное число  $c$ , которое является:


- количеством классов, полученных при разбиении множества  $A$ , численность которого равна  $a$  ( $n(A)=a$ ) на равночисленные классы по  $b$  элементов в каждом;
- численностью класса, полученного при разбиении множества  $A$ , численность которого равна  $a$  ( $n(A)=a$ ) на  $b$  равночисленных классов.

Числа называются:  $a$  – делимое,  $b$  – делитель,  $c$  – частное, запись  $a : b$  так же называется – частное.


**Определение 16:** Действие, посредством которого находится частное, называется деление.

**Задание:** Укажите, какая часть **определения 15** относится к случаю

**деления по содержанию**, а какая к случаю **деления на равные части**.

Продолжите предложение. Чтобы проверить себя щелкните мышкой по кнопке с . Для продолжения работы вернитесь мышкой по любому полю экрана.

## Деление по содержанию



В этой задаче множество  $A$  – тетрадей,  $n(A) = 12$ , разбили на равночисленные подмножества (классы) по 3 элемента (тетради) в каждом. Решая задачу, дети выясняют, сколько классов (учеников) получилось.


**Задание:** Составьте свою задачу на данный вид деления и разберите ее с точки зрения теории множеств.


**Важные задания** – задания, которые даны в виде предложения.

**Для продолжения работы** – делайте щелчком мыши по значку в правом нижнем углу.



## Деление на равные части



В этой задаче множество  $A$  – тетрадей,  $n(A) = 12$ , разбили на 3 равночисленных класса (раздали трем ученикам). Решив задачу, вы узнаете, сколько тетрадей  каждом классе.

**Задание:** Составьте свою задачу на данный вид деления и разберите ее с точки зрения теории множеств.









# Связь деления с умножением

[Возврат в оглавление](#)

При ознакомлении с делением младшие школьники находят результат, производя предметные действия с множествами.

Знания взаимосвязи между действиями умножение и деление позволяет перейти от предметных поисков результата действия деления, к поиску ответа с помощью рассуждений.

		$3 \cdot 2 = 6$
		$6 : 3 = 2$
		$6 : 2 = 3$

Для установления этой взаимосвязи, можно предложить детям задание:

Нарисуй треугольники в **2** столбика по **3** в каждом. Сколько треугольников получилось?

Отвечая на данный вопрос, дети составят равенство.

Учитель может предложить детям два обратных задания, после выполнения которых дети получат еще два равенства.

**Задание:** Сформулируйте задания для получения 2-го и 3-го равенства.

Значение выражений  $6 : 3$  и  $6 : 2$  дети могут найти, используя результат, полученный в выражении  $2 \cdot 3$ , с помощью следующих рассуждений: «Шесть - это два умноженное на три, значит, если шесть разделить на три - будет два».

**Задание:** Запишите рассуждения детей при решении примера  $6 : 2$ .

В основе таких рассуждений лежит следующее определение частного:

**Определение 17:** Частным целого неотрицательного числа **a** и натурального числа **b** называется целое неотрицательное число **c**, являющееся корнем уравнения:  $x \cdot b = a$  или  $b \cdot x = a$ .

Таким образом: верно утверждение: « $a : b = c$  тогда и только тогда, когда  $b \cdot c =$

Запишите это в тетрадь и выполните задание.

Для продолжения работы щелкните по управляющей кнопке



Определение 17 лежит в основе следующего общего правила для нахождения результата действия деления, которое усваивают младшие школьники:

«Чтобы найти частное можно подобрать такое число, которое при умножении на делитель дает делимое»

Определение 17 связывает действия умножение и деление. Используя это определение, можно вывести правила нахождения неизвестного числа в этих действиях по известному результату и второму числу. Это правила:

## нахождение неизвестного множителя

*Чтобы найти неизвестный множитель, достаточно произведение разделить на известный множитель.*

## нахождение неизвестного делимого

*Чтобы найти неизвестное делимое, достаточно частное умножить на делитель.*

## нахождение неизвестного делителя

*Чтобы найти неизвестный делитель, достаточно делимое разделить на частное.*

Сформулируйте и запишите эти правила. Чтобы проверить себя, щелкните

выпуклой стрелкой в рядок над названием произведения и делителем вправо.

Для продолжения работы щелкните мышкой по любому из кнопок вправо экрана



Ознакомление младших школьников с этими правилами может проводиться при рассмотрении троек равенств. Например, для введения правил нахождения неизвестных делимого и делителя можно рассмотреть такую тройку равенств:

$$\underline{8 : 2 = 4}$$

$$4 \cdot 2 = 8$$

$$8 : 4 = 2$$

Эти тройки могут быть даны детям в готовом виде или могут быть получены ими в результате решения взаимно обратных задач.

Пример такой работы был рассмотрен в конспекте «[Вычитание](#)».

**Задание:** Придумайте задачи в обратном виде для введения правил нахождения неизвестных делимого и делителя взаимно обратных нахождения неизвестного множителя.

Пример такой работы был рассмотрен в конспекте «[Вычитание](#)» и предполагаемые ответы учеников.

**Решение уравнений.** После ознакомления с правилами нахождения неизвестного числа в действиях умножение и деление дети могут решать простейшие уравнения вида:

$$6 \cdot x = 24 \quad x : 4 = 7 \quad 36 : x = 9$$

$$6 \odot x = 24$$

$$x = 24 : 6$$

$$x = 4$$

$$\underline{6 \cdot 4 = 24}$$

Рассуждения учеников при решении уравнения могут быть такими:

- уравнение содержит действие умножение, значит нам неизвестен 2-ой множитель;
- чтобы найти 2-ой множитель, мы произведение 24 разделим на 1-ый множитель 6 и находим  $x$ . 2-ой множитель равен 4.
- проверяем: **шесть** умножить на **четыре** - получится **двадцать четыре**.

Если Вы хотите перейти в конспект «[Вычитание](#)» и еще раз посмотреть пример работы с задачами, щелкните мышкой по выделенному слову

**Задание** или **Задача**. Для рассуждения можно нажать клавишу «ESC» уравнений.

Выполните предложенное задание.

Возвратите это в табличку и щелкните мышкой по голубому полю экрана для продолжения работы щелкните мышкой в голубую полосу экрана.





Младшие школьники знакомятся также с уравнениями, состоящими из двух и более действий. Например:

$$\begin{aligned} (x \cdot 16) - 6 &= 90 & 160 : (x + 26) &= 4 \\ (x + 25) : 7 &= 8 & 28 - (45 : x) &= 13 \end{aligned}$$


**Задание:** Запишите рассуждения учеников при решении этих уравнений. Чтобы посмотреть пример рассуждения щелкните мышкой по кнопке со знаком вопроса при по...

- В данном уравнении последнее действие – вычитание;
- Неизвестное содержится в выражении  $(x \cdot 16)$ , значит нам неизвестно умноженное.

$$(x \cdot 16) - 6 = 90$$

$$x \cdot 16 = 90 + 6$$

$$x \cdot 16 = 96$$

$$x = 96 : 16$$

С помощью определения 17 можно объяснить невозможность деления на 0. Действительно:

- Полученное уравнение содержит действие умножение, если  $a \neq 0$ , то нет такого целого неотрицательного числа, которое бы при умножении на  $a$  равнялось бы  $0$ , так как при умножении любого числа на ноль получается ноль. Чтобы найти 1-ый множитель, мы произведение  $96$  разделим на 2-ой множитель  $16$ . Получаем  $6$ .
- Проверим.  $6 \cdot 16 = 96$ ,  $96 - 6 = 90$ .
- если  $a = 0$ , то значение выражения  $0 : 0$  неопределенно, так как любое число можно умножить на ноль, чтобы получить ноль.

$$(6 \cdot 16) - 6 = 90$$

Выполните это задание.

Для продолжения работы нажмите кнопку или любое место экрана



## Порядок действий

Знакомство с порядком выполнения действий начинается в 1-ом классе, когда дети приступают к решению примеров в два и более действий. После введения всех арифметических действий: сложение, вычитание, умножение и деление, дети обобщают полученные знания и формулируют следующие правила:

**Правило 1:** Если выражение содержит только действия сложение и вычитание или только действия умножение и деление, то в выражении могут выполняться по порядку.

**Правило 2:** Если выражение содержит одновременно действия сложение или вычитание, а так же умножение или деление, то выполняются действия умножение и деление по

- произведение тридцати восьми и сорока восьми разделить на сумму тридцати девяти и тридцати семи.
- частное произведения тридцати восьми и сорока восьми и суммы тридцати девяти и тридцати семи.

**Задание 1:** Запишите выражение:

Сумму трехсот шестидесяти девяти и четырехсот семидесяти одного разделить на разность чисел: восемьсот семьдесят два и восемьсот тридцать девять.

**Задание 2:** Запишите, как читается данное выражение:  $38 \cdot 48 : (39 + 37)$

**Задание 3:** Выполните действия в данных выражениях и запишите, что с точки зрения определения каждого арифметического действия Вы нашли.

**Выполните эти задания.**


Чтобы посмотреть варианты чтения второго выражения щелкните по нему

Продолжить чтение по правилу. Не забудьте заварить себя щелкните мышкой по кнопкам с

Для продолжения работы щелкните мышкой по голубой полукругу.

# Отношение делимости

В начальной школе дети сталкиваются со случаями невыполнимости действия деления на множестве целых неотрицательных чисел. Например, выполняя задание: *Составьте всевозможные пары чисел, которые делятся на 3, 6, 8, 12, 24*.



Для данного отношения справедливы свойства:

- **Рефлексивности**  $\forall x \in N \quad x \mid x$
- **Антисимметричности**  $\forall x, y \in N$  если  $x \mid y$ , то  $y \nmid x$
- **Транзитивности**  $\forall x, y, z \in N$  если  $x \mid y$ ,  $y \mid z$ , то  $x \mid z$
- **Отношение несвязное**, так как найдется пара элементов  $x$  и  $y$ , которая не связана данным отношением.

Из этого следует, что данное отношение является отношением нестрогого (рефлексивность) частичного (несвязность) порядка (антисимметричность, транзитивность).

Запишите это в тетрадь и щелкните мышкой по кнопке с вопросом

**Задание:** Постройте граф этого отношения на множестве  $X$ , определите его свойства и вид.

Для деления справедлива теорема:

**Теорема:** Если частное целого неотрицательного числа  $a$  и натурального числа  $b$  существует, то оно единственно.  $(\forall a \in N_0, b \in N) (\exists c \in N_0! \cdot c = a : b) \Rightarrow (\exists! c \in N_0)$

Выполните это задание. Чтобы проверить себя, щелкните мышкой по кнопке с вопросом в тетрадь и выполните предлагаемое детям задание.

Для продолжения работы щелкните мышкой по голубой кнопке с правой стороны.



# Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное

Опр

Ог

Ог

Ог

Н

Для НОД

- Найдем все простые делители каждого числа:
- Найдем общие делители и перемножим их:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 24$$

Значит  $D(48, 72) = 24$

- Для нахождения НОК воспользуемся формулой:  $K(a, b) \cdot D(a, b) = a \cdot b$ , тогда

$$K(a, b) = \frac{a \cdot b}{D(a, b)}, \text{ отсюда: } K(48, 72) = \frac{48 \cdot 72}{24} = \frac{2 \cdot 48 \cdot 72}{24 \cdot 1} = 144$$

**Замечание:** Для нахождения НОК этих чисел можно было бы одно из чисел, например **48**, умножить на те делители второго числа **72**, которые **?** среди делителей числа **48**:

$$48 \cdot 3 = 144$$

$$K(a, b) \cdot D(a, b) = a \cdot b$$

4	8	2			7	2	2		
2	4	2			3	6	2		
1	2	2			1	8	2		
<b>?</b>	6	2				9	3		
	3	3				3	3		
	1					1			



Число 24

**Задание:** **?**

Найдите НОД чисел: **48** и **72**; **52** и **78**; **54** и **81**. Пользуясь данной формулой, найдите НОК этих чисел.

Выполните задание. Чтобы посмотреть решение, щелкните кнопке с вопросом. Придобрите ПреДокЖения и др. Для продолжения работы с программой необходимо нажать на кнопку «Далее».



# Признаки делимости

позволяют, не производя вычислений, определить: имеет ли рассматриваемое выражение, содержащее действие деления, значение на множестве  $\mathbb{N}_0$ .

В школьном курсе рассматриваются следующие признаки делимости:

**делимость суммы:** Для того чтобы сумма делилась на число достаточно, чтобы каждое слагаемое суммы делилось на это число.

$$\forall x, y, z \in \mathbb{N}_0 \text{ если } x \div z, y \div z, \text{ то } (x + y) \div z$$

**делимость разности:** Для того чтобы разность делилась на число достаточно, чтобы уменьшаемое и вычитаемое делилось на это число.

$$\forall x, y, z \in \mathbb{N}_0 \text{ если } x \div z, y \div z, \text{ то } (x - y) \div z$$

**делимость произведения:** произведение делилось на число достаточно, чтобы один из множителей делился на это число.

$$\forall x, y, z \in \mathbb{N}_0 \text{ если } x \div z \text{ или } y \div z, \text{ то } (x \cdot y) \div z$$

**Задание:** Перепишите данные выражения в три столбика по следующим признакам:

1-ый – те, которые имеют значение на множестве  $\mathbb{N}_0$ , и это можно определить по признаку делимости;

2-ой – те, которые не имеют значение на множестве  $\mathbb{N}_0$ , и это можно определить по признаку делимости;

3-ий – те, для которых признак применить нельзя?

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| $(60 - 20) : 5$   | $(64 + 28) : 4$   |
| $(63 - 23) : 5$   | $(62 + 26) : 4$   |
| $(60 - 23) : 5$   | $(13 \cdot 17) :$ |
| $(48 + 23) : 4$   | $(26 - 20) : 4$   |
| $(60 \cdot 28) :$ | $(7 \cdot 22) :$  |
| 14                | 14                |

**Задание:** Объясните почему данные условия в признаках являются только достаточными? Допишите данные признаки делимости, пользуясь их математической записью. Подтвердите это данными примерами.

Выполнив задание, щелкните мышкой кругу рядом с названием признака.

Для продолжения работы щелкните мышкой по любому из кнопок.



## Признаки делимости на однозначные числа

позволяют, не производя вычислений, определить: делится ли заданное число на однозначное или нет. Рассмотрим эти признаки:

- на 2:** Для того, чтобы целое неотрицательное число делилось на 2 необходимо и достаточно, чтобы последняя цифра числа была четной.
- на 3:** Для того, чтобы целое неотрицательное число делилось на 3 необходимо и достаточно, чтобы сумма цифр числа была бы кратна 3 .
- на 4:** Для того, чтобы целое неотрицательное число делилось на 4 необходимо и достаточно, чтобы две последние цифры числа составляли число, кратное 4.
- на 5:** Для того, чтобы целое неотрицательное число делилось на 5 необходимо и достаточно, чтобы последняя цифра числа была бы 5 или 0
- на 6:** Для того, чтобы целое неотрицательное число делилось на 6 необходимо и достаточно, чтобы это число было кратно 2 и 3.
- на 7:** Для того, чтобы целое неотрицательное число делилось на 7 необходимо и достаточно, чтобы в значащей части числа разность полного числа десятков и удвоенной цифры единиц была бы кратна 7. Разность может быть отрицательной.
- на 8:** Для того, чтобы целое неотрицательное число делилось на 8 необходимо и достаточно, чтобы три последние цифры числа составляли число кратное 8.
- на 9:** Для того, чтобы целое неотрицательное число делилось на 9 необходимо и достаточно, чтобы сумма цифр числа была бы кратна 9.

Допишите данные признаки делимости. Чтобы проверить себя, щелкните мышкой кругу рядом  
Для продолжения работы щелкните мышкой по управляющей кнопке.




**Задание:** Используя признаки делимости, для каждого из приведенных чисел определите однозначные числа, на которые оно делится. **438562, 76545, 384364, 161000**

Признаки делимости можно использовать в рассуждениях при решении задач. Рассмотрим это на примере такой задачи:

*Задача, выгравированная на надгробном камне Диофанта – греческого математика, жившего в III веке н. э.*

*Путник! Здесь прах погребен Диофанта,  
И числа могут поведать, о чуде,  
Сколь долгод был век его жизни.  
Часть шестую его представляло счастливое детство,  
Двенадцатая часть протекла его жизни –  
Пухом покрылся подбородок.  
Седьмую в бездетном браке провел Диофант.  
Прошло пятилетье.  
Он был осчастливлен рождением прекрасного первенца сына,  
Коему рок половину лишь жизни счастливой и светлой,  
Дал на земле по сравненью с отцом.  
И в печали глубокой старец земного удела конец  
воспринял,  
Переживши года четыре с тех пор, как сына лишился  
Скажи, скольких лет жизни достигнув,  
Смерть воспринял Диофант?*



**Решение:**

1. Из условия задачи следует, что возраст Диофанта кратен числам **6, 12, и 7.**
2. Этому условию удовлетворяют числа: **84, 168, 252** и т. д.
3. Проверим наиболее вероятное число **84 – НОК** этих чисел:  
 Детство –  $84 : 6 = 14$  (лет);  
 Пухом покрылся подбородок –  $84 : 12 = 7$ ,  $14 + 7 = 21$  (год);  
 Бездетный брак –  $84 : 7 = 12$ ,  
 $12 + 21 = 33$  (года);  
 Рождение сына –  
 $33 + 5 = 38$  (лет);  
 Смерть сына –  $84 : 2 = 42$ ,  
 $38 + 42 = 80$  (лет);  
 Смерть Диофанта –  
 $80 + 4 = 84$  (года).

Ответ: 84 года.

Перепишите условие задачи. Попробуйте решить ее.  
 Выполните эту задачу, щелкните мышкой по кнопке с вопросом.  
 Для продолжения работы щелкните мышкой по любому полю экрана.



**Задание:** Решите данные задачи, используя в рассуждениях признаки делимости чисел.

**Древнеегипетская задача:**

Количество (число) и его четвертая часть дают вместе 15. Найти количество.

**Древнеиндийская задача:**

Есть кадамба цветок.

На один лепесток пчелок пятая часть опустилась.

Рядом тут же росла вся в цветку сименгда,

И на ней третья часть поместилась.

Разность их ты найди, трижды их ты сложи,

На кутай этих пчел посади.

Лишь одна не нашла себе места нигде,

Все летала то назад, то вперед

И везде ароматом цветов наслаждалась.

Назови теперь мне, подсчитавши в уме,

Сколько пчелок всего здесь собралось.

Число десятков двузначного числа составляет две трети числа единиц, а число, записанное теми же числами в обратном порядке, больше первоначального на 18. Найти число.

Придумайте десятизначное число, состоящее из неповторяющихся цифр, такое что первая слева цифра кратна 1, две первые слева цифры составляют число кратное 2, три первые слева цифры составляют число кратное 3 и т. д.

Решите эти задачи дома.

Для продолжения работы вернитесь в оглавление.





**Определение 24:** Целое неотрицательное число  $q$  называется частным, а целое неотрицательное число  $r$  – остатком от деления целого неотрицательного числа  $a$  на натуральное число  $b$ , если выполняются следующие условия:

$$1. 0 \leq r < b; \quad 2. a = b \cdot q + r.$$

Для деления справедлива теорема:

**Теорема:** Для любого целого неотрицательного числа  $a$  и любого натурального числа  $b$  существует и притом только одна пара целых неотрицательных чисел  $q$  и  $r$ , которые соответственно являются частным и остатком от деления  $a$  на  $b$ .

$$(\forall a \in \mathbb{N}_0, b \in \mathbb{N}) (\exists! q, r \in \mathbb{N}_0: a : b = q \text{ (ост. } r))$$

Рассмотрим справедливость данной теоремы в различных случаях:

1.  $a < b$ .  $a : b = 0$  (ост.  $a$ ). Например:  $a = 3$ ,  $b = 5$ , тогда:  $3 : 5 = 0$  (ост. 3)

2.  $a = b$ .  $a : a = 1$  (ост. 0). Например:  $a = 3$ ,  $b = 3$ , тогда:  $3 : 3 = 1$  (ост. 0)

3.  $a > b$ . Например:  $a = 23$ ,  $b = 3$ . Рассмотрим последовательность произведений:  $2 \cdot 3, 3 \cdot 3, 4 \cdot 3, 5 \cdot 3, 6 \cdot 3, 7 \cdot 3, 8 \cdot 3, \dots, 22 \cdot 3, 23$ . Выберем и неее самое большое произведение, меньше числа 23. Это произведение 3

Число 7 – искомое частное. Теперь найдем остаток.

Для этого от делимого отнимем выбранное произведение:  $23 - 7 \cdot 3 = 2$ .

Число 2 – искомый остаток. Запишем решение:  $23 : 3 = 7$  (ост. 2)

Деление без остатка можно рассматривать как частный случай деления с остатком. В этом случае остаток равен 0. Например:  $24 : 3 = 8$  (ост. 0).

Запишите это в тетрадь. Составьте свой пример.

Для продолжения видео необходимо нажать мышкой по любой точке экрана



## Обучение младших школьников делению с остатком

Можно выделить три этапа обучения младших школьников делению с остатком:

**I этап.** Знакомство с данным случаем деления и записью решения. На этом этапе дети выполняют предметные действия с множествами, в которых, при разбиении на равночисленные классы, остаются элементы, не образующие полный класс.

**Задание:** Составьте задачу по сюжету, который появится на экране.



... равночисленные  
... что во  
множестве  $A$  остались элементы, не образующие заданный условием класс. Решая задачу,  
дети выясняют ? полных классов (учеников) получилось и сколько элементов осталось в неполном классе.

Дети учатся записывать решение так:  $13 : 4 = 3$  (ост. 1).

Частное  $3$  показывает, ?, а остаток  $1$  показывает, ?

**Задание:** Составьте свою задачу на деление с остатком. Запишите ее решение. Опишите это решение с точки зрения теории множеств.

Продолжите предложение.

Для продолжения работы нажмите и перемещайте указатель мыши по ярлыку в нижнем правом углу экрана



**II этап.** Знание требования определения деления с остатком:  $0 \leq r < b$ .

На этом этапе для предметные действия с множествами, формулируют требования. **?** остаток всегда меньше делителя.

Объяснить можно с помощью задач на деление по содержанию с остатком. **Задание:** Сделайте задачу на деление с остатком по сюжету, который появится на экране.

Больше порций сделать нельзя.



**2** блинчиков

ОДНА ПОРЦИЯ:



? порций



В этой задаче множество **A** – блинчиков,  $n(A) = 9$ , разбивают на равночисленные подмножества (классы) по **2** элемента (блинчика) в каждом. После составления каждой порции, дети могут подсчитать оставшиеся блинчики и выяснить, можно ли из них сделать еще одну порцию.

При решении таких задач детям может быть предложено объяснить, почему неверно решение:  $9 : 2 = 3$  (ост. 3)?

**остаток всегда меньше делителя.**  
Продолжите предложение. Чтобы проверить себя щелкните мышкой по кнопке с **?** Для продолжения работы щелкните мышкой по большому белому экрану экрана.



## III этап. Знакомство с приемами подбора частного и нахождения остатка.

На этом этапе дети учатся подбирать частное и находить остаток без выполнения предметных действий. Например, чтобы **17** разделить на **5** с остатком, они учатся рассуждать так: *Найдем самое большое число до семнадцати, которое делится на пять.*

*Это число – пятнадцать.  $15 : 5 = 3$  – это частное.*

*Найдем остаток:  $17 - 15 = 2$ . Значит  $17 : 5 = 3$  (ост. 2).*

Для проверки полученных частного и остатка дети учатся таким рассуждениям:

*Чтобы проверить правильность ответа мы*

- *проверим сначала остаток:  $2 < 5$  (остаток меньше делителя);*
- *проверим частное: три умножим на делитель пять и к полученному результату прибавим остаток два:  $3 \cdot 5 = 15$ ;  $15 + 2 = 17$ . Получили делимое **17**, значит частное и остаток найдены верно.*

Таким образом, на частных примерах дети проверяют оба требования, предъявляемые к частному **q** и остатку **r**: **?** **1.  $0 \leq r < b$ ; 2.  $a = b \cdot q +$**

Умение проверять полученный результат позволяет применять **метод подбора** в тех случаях, когда трудно подобрать самое большое число, меньшее делимого, которое делится на делитель. Например, при нахождении частного и остатка в случае **87 : 27**

дети могут рассуждать так: *Попробуем в частном число **2**:  $27 \cdot 2 = 54$ , тогда остаток будет равен  $87 - 54 = 33$ ,  $33 > 27$  (остаток больше делителя), значит **2** – мало.*

*Попробуем в частном число **3**:  $27 \cdot 3 = 81$ , тогда остаток будет равен  $87 - 81 = 6$ ,  $6 < 27$  (остаток меньше делителя), значит **6** – остаток, а **3** – частное:*

*$87 : 27 = 3$  (ост. 6).*



Деление с остатком лежит в основе алгоритма письменного деления.

Недостаточное усвоение приемов подбора частного и нахождения остатка может привести к ошибкам при выполнении письменного деления. Например:

**Задание:** Найдите, где в данном случае была сделана ошибка, и объясните ее причину.

Для предупреждения подобных ошибок и обучения подбору частного, детям могут быть предложены следующие задания:

- Какие числа от 16 до 75 делятся на 7? на 8? на 9?
- Какое самое большое число до 19 делится на 5? на 6? на 7? на 8? на 9?;
- Какие остатки могут получиться при делении на 4? на 5? на 9?
- Вставьте пропущенные числа так, чтобы были верны равенства:

$$36 : \times = \times (\text{ост. } 1)$$

$$52 : \times = 7 (\text{ост. } \times)$$

$$\times : \times = \times (\text{ост. } 3)$$

	8	9	1	3			
—	6			2	8	1	7
	2						
—	2	4					
		5					
—		3					
		2					
—		2	1				
			0				

Выполни задание самостоятельно и Ваши объяснения.

Для продолжения работы вернитесь к оповещению по полю экрана.



# Свойства деления

Для действия деления справедливы следующие свойства (законы):

- Деление суммы на число;
- Деление разности на число;
- Деление произведения на число;
- Деление числа на произведение.

**Задание:** Для данных выражений :

$$39 : 3 \quad 68 : 4 \quad 560 : 8 \quad 680 : 4 \quad 5600 : 80$$

- запишите развернутое решение и найдите значение;
- опишите, что с точки зрения каждого определения действия деления Вы нашли;
- определите какое свойство лежит в основе вычислительного приема;
- придумайте задачу, иллюстрирующую данное свойство запишите все способы решения данной задачи, составлением числовых выражений;
- к каждому способу запишите план решения задачи.

Запишите это в тетрадь.

Для продолжения работы щелкните мышкой по выбранному свойству.

Для продолжения работы вернитесь в оглавление по голубому полю экрана.

## Деление суммы на число

Для любых целых неотрицательных чисел  $a$ ,  $b$  и натурального числа  $c$  верно равенство:  $(a + b) : c = a : c + b : c$

$$(\forall a, b \in \mathbb{N}_0, c \in \mathbb{N}) (c \neq 0) \Rightarrow (a + b) : c = a : c + b : c$$

В начальной школе знакомство с данным свойством сводится к знакомству с правилом:  
*Чтобы сумму разделить на число можно на это число разделить каждое слагаемое*

$$87 : 3 = (60 + 27) : 3 = 60 : 3 + 27 : 3 = 20 + 9 = 29$$

### Рассуждения ученика:

- представляю число **87** в виде суммы удобных слагаемых: 1-ое слагаемое – самое большое круглое число до восьмидесяти, которое делится на **3** – это **60**, тогда 2-ое слагаемое – это число **27**;
- нам удобно сначала каждое слагаемое разделить на **3**;
- затем сложить полученные результаты (частные) **20** и **9**, и получаем **29**.

идет к выводу правила.

Следует обратить внимание детей, что подобная задача не всегда имеет два способа решения. **Задание:** Измените условие данной задачи так, чтобы ее нельзя было решить вторым способом.

Правило «Деление суммы на число» лежит в основе вычислительных приемов деления двузначного числа на однозначное. Например:

### Задание:

- Запишите развернутое решение каждого примера;  $48 : 4$     $87 : 3$
- Запишите рассуждения ученика при решении этих примеров;  $36 : 3$     $60 : 5$
- Чем отличаются приемы решения примеров 1-ого и 2-ого столбика.

Для просмотра примера записи и рассуждений ученика, щелкните мышкой по знаку вопроса. Для формулировки задания щелкните по значку вопроса. Чтобы проверить себя щелкните мышкой по знаку вопроса. При повторном щелчке подсказка исчезнет. Для продолжения работы щелкните мышкой по голубому полю экрана.










ва  
в





Щелкните мышкой по оранжевому или зеленому кругу и Вы увидите иллюстрацию для объяснения одного из способов решения этой задачи. При повторном щелчке по кругу иллюстрация повторяется. Составьте задачу и решите ее разными способами.





## Деление разности на число

Для любых целых неотрицательных чисел  $a$ ,  $b$  и натурального числа  $c$  верно равенство:

$$(a - b) : c = a : c + b : c$$

$$(\forall a, b \in \mathbb{N}_0, c \in \mathbb{N}) \wedge (c \nmid b) \Rightarrow (a - b) : c = a : c - b : c$$

Данное свойство можно сформулировать в виде правила:

*Чтобы разность разделить на число можно на это число сначала разделить уменьшаемое, затем вычитаемое и из первого результата (частного) вычесть второе.*

В начальной школе дети специально не знакомятся с данным правилом, но при выполнении некоторых заданий сталкиваются с его применением. Например:

- Сравни выражения:
 
$$(18 - 6) : 3 \dots 18 : 3 - 6$$

$$(18 - 6) : 3 \dots 18 : 3 - 6 : 3$$

$$(18 - 6) : 3 \dots 18 - 6 : 3$$

**Задание:** Запишите рассуждения ученика при выполнении данного задания с использованием правила деления разности на число

2. Реши задачу разными способами:

*В шести вазах стояло по равному количеству цветов, всего 30 штук. Взяли 12 цветов так, что в вазах осталось цветов поровну. Сколько цветов осталось в каждой вазе?*

**Задание:** Решите задачу разными способами.

Способы решения задачи запишите выражением и к каждому способу напишите план решения задачи.

**Формулируйте правило.** Чтобы проверить себя щелкните мышкой по знаку вопроса. Для проверки результата деления используйте калькулятор.



## Деление произведения на число

Для любых целых неотрицательных чисел  $a$ ,  $b$  и натурального числа  $c$  верно равенство:

$$(a \cdot b) : c = (a : c) \cdot b = (b : c) \cdot a$$

$$(\forall a, b \in \mathbb{N}_0, c \in \mathbb{N}) \quad (a \cdot b) : c = (a : c) \cdot b$$

$$(\forall a, b \in \mathbb{N}_0, c \in \mathbb{N}) \quad (a \cdot b) : c = (b : c) \cdot a$$

Данное свойство можно сформулировать в виде правила:

Чтобы произведение разделить на число можно на это число разделить один из множителей и полученный результат (частное) умножить на второй множитель.



## Деление числа на произведение

Для любых целых неотрицательных чисел  $a$ ,  $b$  и натурального числа  $c$  верно равенство:  $a$

$$a : (b \cdot c) = (a : b) : c = (a : c) : b$$

$$(\forall a \in \mathbb{N}_0, b, c \in \mathbb{N}) \quad a : (b \cdot c) = (a : b) : c = (a : c) : b$$

Данное свойство можно сформулировать в виде правила:

Чтобы число разделить на произведение можно это число разделить сначала на один из множителей и полученный результат (частное) разделить на другой множитель.

Эти правила лежат в основе вычислительных приемов деления чисел, оканчивающихся нулями. Например:  $480 : 6$ ;  $4800 : 12$ ;  $48000 : 16$ ;  $4800 : 1200$ ;  $48000 : 1600$ .

Развернутое решение этих примеров можно записать так:

$$480 : 6 = (48 \cdot 10) : 6 = (48 : 6) \cdot 10 = 8 \cdot 10 = 80$$

$$4800 : 1200 = 4800 : (12 \cdot 100) = (4800 : 100) : 12 = 48 : 12 = 4$$

**Задание:** К каждой записи напишите соответствующее свойство.

В формулировке задания правило. Чтобы проверить себя щелкните мышкой по знаку


Дважды щелкните мышкой по знаку, чтобы увидеть решение остальных примеров.



Правила **Деление произведения на число** и **Деление числа на произведение** дети могут сформулировать после анализа различных способов решения задач, иллюстрирующих их.



### Деление произведения на число

6 пучков по 9 морковок в каждом разложили в ...



### Деление числа на произведение

54 морковки связали в пучки по 9 морковок в каждом и разложили их в корзины ...



**Задание:** Посмотрите иллюстрации к задачам и допишите условие, так, чтобы с их помощью можно было бы познакомить детей с соответствующим правилом деления.

- Решите составленные задачи различными способами, записав решения выражением.
- Запишите план решения задачи в каждом способе.
- Запишите план анализа способов решения задачи, подводящий к выводу соответствующего правила деления.

Для просмотра иллюстраций к задачам, щелкните мышкой по оранжевому или **Выводу** на терту. Задание повторном щелчке действие повторится.

Для продолжения работы щелкните мышкой по любому из крайних кнопок.

**I этап.** Ознакомление с делением. На этом этапе дети знакомятся:

- с конкретным смыслом деления;
  - с делением по содержанию и с этим делением на равные части
- На этом этапе находят деления на равные части на равночисленные подмножества.

Чтение выражения зависит от вида задачи, которую решает ребенок.

Например, выражение  $15 : 5$  может быть прочитано:

«пятнадцать разделить по 5» – **?** «пятнадцать разделить на 5» – **?**

**II этап.** Изучение табличных случаев деления. На этом этапе дети:

- знакомятся с названием чисел в делении (делимое, делитель, частное) и со способами чтения выражений. Например:  $15 : 5$  «Частное чисел **15** и **5**»,  
«Делимое – **15**, делитель – **5**, найти частное»;
- знакомятся с правилами: нахождения неизвестного множителя, делимого, делителя;
- изучают прием нахождения результата деления, как действия обратного умножению. Например:  $28 : 7$  «Чтобы получить **двадцать восемь** нужно **семь** умножить на **четыре**, следовательно  $28 : 7 = 4$ ».
- составляют к каждой таблице умножения таблицы с соответствующими случаями деления.
- знакомятся с особыми случаями деления:  
**деление на 1; деление нуля; невозможность деления на 0;**
- знакомятся с отношением «меньше в ...». После этого знакомства добавляются варианты чтения выражений. Например:  $15 : 5$  «Пятнадцать уменьшить в пять раз».

**Задание:** составьте таблицу умножения числа **7** и соответствующие ей таблицы деления.

Запишите это в тетрадь, дописав вид задачи, соответствующий каждому способу чтения выражения. Проверьте себя, щелкнув мышкой по знаку вопроса.

При повторном щелчке подсказка исчезнет. Для продолжения работы щелкните

Дальнейшее выполнение задания щелкните мышкой по любому месту экрана



**III этап.** Изучение внетабличных случаев деления. На этом этапе дети:

- учатся делить с остатком и проверять правильность подбора частного и остатка;
- знакомятся с ~~правилами деления с остатком~~

$$48 : 16$$

**Рассуждения ученика:** «Попробуем число 2:  $16 \cdot 2 = 32$  - мало; тогда попробуем 3:  $16 \cdot 3 = 48$ , значит  $48 : 16 = 3$ »

деление дву

деление кру

- знакомятся с

деления с умножением, пользуясь правилом. Чтобы найти **частное** можно подобрать **такое число**, которое при умножении на **делитель** дает **делимое**.

Например:  $48 : 16$ ;  $84 : 28$ ;  $76 : 19$  и т. д

**Задание:** запишите развернутое решение примеров, записанных выше, и рассуждения учеников при делении двузначного числа на двузначное. Чтобы посмотреть такое рассуждение, щелкните мышкой по знаку вопроса. При повторном щелчке подсказка исчезнет.

**IV этап.** Изучение алгоритмов письменного деления. На этом этапе дети:

- знакомятся с алгоритмом деления на однозначное число, при этом
- сначала рассматривают случаи, когда каждая цифра делимого делится на делитель. Например:  $936 : 3$ ;  $468 : 2$ ;

затем случаи, в которых при делении цифр числа получаются остатки, но количество цифр в делимом и частном совпадает, Например:  $968 : 4$ ;  $496 : 2$ ;

после этого рассматривают случаи, когда количество цифр в делимом и частном не совпадает. На этом этапе детей учат не только выделять неполное делимое, но и о определять количество цифр в частном. Например:  $136 : 4$ ;  $378 : 7$ ;

и наконец рассматривают случаи, когда в частном получаются нули.

Например:  $8136 : 4$ ;  $3780 : 7$ .

**Задание:** Решите все примеры, записанных выше.

**Выполните задание.** тетради и выполните задание.

Для продолжения работы щелкните мышкой по любой из кнопок экрана



**IV этап** Изучение алгоритмов письменного деления. (продолжение)

- знакомятся с алгоритмом деления на двузначное и многозначное число, при этом
  - сначала рассматривают случаи деления на круглое число с остатком, когда в частном получается одна цифра. Например: **638 : 90; 7350 : 800;**
  - затем случаи деления на круглое число без остатка и в частном получается более одной цифры. Например: **3240 : 60; 5920 : 80;**
  - после этого рассматривают случаи деления многозначного числа на многозначное, когда в частном получается сначала одна цифра, например: **432 : 72; 294 : 42;** затем более одной цифры, например: **828 : 36; 4725 : 63;**
  - наконец рассматривают случаи, когда в частном получаются нули. Сначала без остатка, например: **132192 : 324; 272640 : 284,** а затем с остатком, например:  
**37971 : 73; 48574 : 712 .**

**Задание:** Решите все примеры, записанные выше.

Если Вам нужно посмотреть пример рассуждений при использовании алгоритма деления, щелкните мышкой по знаку вопроса.



**Вблизи задания** с алгоритмом, щелкните мышкой по знаку вопроса.

**Для продолжения работы** щелкните мышкой по значку в правом нижнем углу экрана







Делитель последовательно умножают на однозначные числа, начиная с числа **2**, до тех пор пока не найдут самое большое произведение, меньшее неполного делимого.

частном;

Подберем цифру частного. Это можно сделать разными способами:

**Умножение**

**Используй**

**Подбор**

- В делимом слева отделяют столько цифр, сколько их содержится в делителе.
- Если полученное число больше делителя, то его считают первым неполным делимым.
- Если полученное число меньше делителя, то слева отделяют на одну цифру больше и полученное число считают первым неполным делимым.
- Определяют, единицы какого разряда составляет первое неполное делимое. Эти единицы, а также все предшествующие им должны быть в частном.

Например: **17572 : 23**

В делителе две цифры. Беру две первые слева цифры делимого. Получаю число **17**.  $17 < 23$ , поэтому беру слева три цифры и получаю **175** - первое неполное делимое.

**175** - это полное число сотен в числе **17572**, следовательно в частном будут сотни, а также десятки и единицы - всего **3** цифры.

Полученное в результате однозначное число **5** - пробная цифра частного, которую необходимо проверить.

цифры частного.

Запишите это в тетрадь. Для ознакомления а приемом определения первого неполного делимого. Для ознакомления а приемом определения первого неполного делимого. Для ознакомления а приемом определения первого неполного делимого.



# Алгоритм письменного деления (продолжение)

Например:  $4725 : 63$

	4	7	2	5	6	3		
—	<del>4</del>	<del>4</del>	<del>1</del>		7	5		
		3	1					
				0				

- Запишем числа уголком;
- Найдем первое неполное делимое и определим количество цифр в частном:  
В делителе две цифры. Беру две первые слева цифры делимого. Получаю число **47**.  $47 < 63$ , поэтому беру слева три цифры и получаю **472** - **первое неполное делимое**.

**472** - это полное число десятков в числе **4725**, следовательно в ответе у нас будут десятки и единицы - **2** цифры.

- Подберем цифру способом округления:

- Округлим делитель **63** до числа **60**;
- 472** разделим на **60 = 6 · 10**: для этого сначала разделим на **10** - получим **47**, а потом **47** разделим на **6** и получим **7**.

- Проверяем полученную цифру **7**.

Для этого **63** умножим на **7** и получим **441**:  $441 < 472$

Найдем остаток  $472 - 441 = 31$ . Остаток  $31 < 63$  - делителя, следовательно цифра подобрана верно и ее можно записать в ответ.

- Припишем к полученному остатку следующую цифру делимого. Получаем неполное делимое  $315 > 63$ . Подбираем следующую цифру частного **по поделенной цифре**:

Последняя цифра делимого равна **5**, значит, вероятнее всего, цифра частного будет **5**.

- Проверяем полученную цифру **5**.

Для этого **63** умножим на **5** и получим **315**, следовательно цифра подобрана верно и ее можно записать в ответ.

- Получили ответ - **75**.

Для продолжения работы щелкните по любому полю экрана





# Алгоритм письменного деления (продолжение)

**Например:**  $4725 : 63$

	4	7	2	5	6	3			
—	4	4	1		7	5			
		3	1						
				0					

- Запишем числа уголком;
- Найдем первое неполное делимое и определим количество цифр в частном:  
В делителе две цифры. Беру две первые слева цифры делимого. Получаю число **47**.  $47 < 63$ , поэтому беру слева три цифры и получаю **472** - первое неполное делимое.

**472** - это полное число десятков в числе **4725**, следовательно в ответе у нас будут десятки и единицы - **2** цифры.

Способом округления:

- Подберем цифру частного:  
• Округлим делитель **63** до числа **60**.;
- **472** разделим на **60 = 6 · 10**: для этого сначала разделим на **10** - получим **47**, а потом **47** разделим на **6** и получим **7**.

• Проверяем полученную цифру **7**.  
Для этого **63** умножим на **7** и получим **441**:  $441 < 472$

Найдем остаток  $472 - 441 = 31$ . Остаток  $31 < 63$  - делителя, следовательно цифра подобрана верно и ее можно записать в ответ.

- Припишем к полученному остатку следующую цифру делимого. Получаем неполное делимое  $315 > 63$ . Подбираем следующую цифру частного по поделеней цифре:  
Последняя цифра делимого равна **5**, значит, вероятнее всего, цифра частного будет **5**.

• Проверяем полученную цифру **5**.  
Для этого **63** умножим на **5** и получим **315**, следовательно цифра подобрана верно и ее можно записать в ответ.

• Получили ответ - **75**.

Чтобы вернуться к списку упражнений нажмите мышкой по голубой кнопке в нижнем правом углу экрана.



# Действия с целыми неотрицательными числами.

## Деление

Вы завершили знакомство с данной темой.

Если Вы хотите завершить работу – нажмите клавишу **<ESC>**

Если Вы хотите вернуться в оглавление – щелкните мышкой по управляющей кнопке

