




Хронический панкреатит

Цели лечения хронического панкреатита (ХП)

- 1** обеспечить функциональный покой поджелудочной железы (ПЖ);
- 2** купировать боль;
- 3** компенсировать внешнесекреторную функцию поджелудочной железы.



Алгоритм лечения болевой формы хронического панкреатита

рекомендации Американской Гастроэнтерологической Ассоциации (AGA)*

Больные хроническим панкреатитом (болевая форма)

- диета с низким содержанием жиров
- ненаркотические анальгетики
- отказ от алкоголя и табакокурения

неэффективно

1. 8 недельный курс **таблетированных** ферментных препаратов в высоких дозах, далее по требованию (*on demand*)

Мезим® 10 000 по 1–2 таблетки 3–4 раза в день

2. Ингибиторы желудочной секреции

3. Симптоматические средства

неэффективно

Предложить пациенту выбор между выжидательной тактикой и операцией, объяснить риск и преимущества хирургического лечения



Что такое терапия «по требованию»? «on-demand»?

После проведения базового 8 недельного курса ферментными препаратами
Мезим® 10 000 по 1–2 таблетки 3–4 раза в день



Возобновление симптомов



Дополнительный курс 2 недели,
затем – по показаниям*
с учётом выраженности проявлений
вплоть до постоянного приема
в тяжёлых случаях



Исчезновение клинических
проявлений



Прекращение приёма
ферментных препаратов

* режим «по требованию»

Преимущество таблетированных форм пищеварительных ферментов



Высокая эффективность традиционных таблетированных препаратов панкреатина при лечении болевой формы хронических панкреатитов (G. Isaksson et al. 1983, Slaff et al. 1984)

Быстрое купирование панкреатической боли

Высокая концентрация протеаз и активация в начальном отделе двенадцатиперстной кишки



Создают функциональный покой поджелудочной железы за счёт запуска механизма обратной отрицательной связи



**При лечении
хронического панкреатита
с болевым синдромом
следует отдавать предпочтение
таблетированным препаратам
чистого панкреатина**

Е. А. Джанашия, А. В. Калинин, Справочник поликлинического врача, 2007, №11 (кафедра гастроэнтерологии Государственного института усовершенствования врачей МО РФ)

Боль при хроническом панкреатите

«Боль есть величайшее
из всех зол»


Эпикур

В развернутой стадии ХП
боль регистрируется
у **80–90%** больных




Начальные симптомы при ХП

(A.Lohr, 1990)




Боль – основная жалоба у пациентов с хроническим панкреатитом



Динамика развития симптомов ХП
P.G. Lankisch et al. (1997)

Боль – основная жалоба у пациентов с хроническим панкреатитом



Мезим® 10 000

- 1 Содержит панкреатин без дополнительных компонентов
- 2 Имеет высокую ферментную активность:
 - липазы **10 000** ЕД
 - амилазы **7500** ЕД
 - протеазы **375** ЕД
- 3 Таблетки покрыты кишечнорастворимой оболочкой, защищающей энзимы от воздействия соляной кислоты
- 4 Высвобождение и активация ферментов происходит в начальных отделах двенадцатиперстной кишки, благодаря этому обеспечиваются два эффекта:
 - купирование панкреатической боли
 - компенсация недостаточной функции поджелудочной железы



Мезим® 10 000

Два эффекта в одной таблетке

купирование
болевого
абдоминального
синдрома
при хроническом
панкреатите^{1,2}




полноценная
терапия внешне-
секреторной
недостаточности
поджелудочной
железы^{1,2}



10 000 ЕД липазы для быстрого
лечебного эффекта

1. Джанашия Е. А., Калинин А. В. Применение ферментных препаратов для лечения и профилактики обострений хронического панкреатита. Справочник поликлинического врача №11, 2007.
2. Ткаченко Е. И., Успенский Ю.П., Пахомова И. Г. Терапия экзокринной недостаточности поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом. Справочник поликлинического врача , №1, 2007.





Клиника пропедевтики, гастроэнтерологии
и гепатологии им. В. Х. Василенко ММА,
Ивашкин В.Т., Шифрин О.С., 2009 г


...

**Клиническое исследование
эффективности препаратов
Мезим[®] 10 000 и капсулированного
микрогранулированного панкреатина в
аналогичной дозировке по липазе (Креон[®] 10 000)
в лечении хронического панкреатита**


*(болевая форма, умеренные нарушения
внешнесекреторной функции поджелудочной железы)*

Мезим® 10 000 более эффективен при лечении панкреатической боли, чем капсулированные формы панкреатина

Пациенты (N-30),
получавшие Мезим® 10 000



Пациенты (N-30),
получавшие капсулированный
микрогранулированный панкреатин



купирование
боли



Уменьшение боли


Исчезновение боли

Усиление боли


Без динамики

Мезим® 10 000 обеспечивает эффективную компенсацию недостаточности функций поджелудочной железы

Пациенты*,
получавшие Мезим® 10 000




Пациенты (N-30),
получавшие капсулированный
микрогранулированный панкреатин



* n = 18
** n = 22

Мезим[®] 10 000 не способствует развитию запоров


Пациенты (N-30),
получавшие Мезим[®] 10 000



1 чел.

Пациенты (N-30),
получавшие капсулированный
микрогранулированный панкреатин

■ возникновение
запора



6 чел.

$p < 0,05$




Клиника пропедевтики,
гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко

Результаты исследования

- 1** **Мезим[®] 10 000** более часто позволяет купировать или существенно уменьшить абдоминальную боль панкреатогенного генеза ($p < 0,05$)
- 2** **Мезим[®] 10 000** обеспечивает сравнимую с капсулированными микрогранулированными препаратами панкреатина компенсацию недостаточности внешнесекреторной функции поджелудочной железы
- 3** На фоне терапии **Мезим[®] 10 000** осложнения в виде запоров регистрируются существенно реже, чем при аналогичной терапии капсулированными микрогранулированными препаратами панкреатина ($p < 0,05$)

Указанные выводы позволяют рекомендовать Мезим[®] 10 000 в качестве препарата выбора больных с хроническим панкреатитом
(болевая форма с умеренными проявлениями внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы)

Мезим® 10 000 улучшает показатели качества жизни




PF – физическое функционирование; **RP** – ролевое физическое функционирование; **BP** – шкала боли; **G_H** – общее здоровье; **VT** – жизнеспособность; **SF** – социальное функционирование; **RE** – ролевое эмоциональное функционирование; **M_H** – психологическое функционирование.

Выводы

- 1** Мезим® 10 000: более эффективен при лечении панкреатической боли, чем капсулированные формы панкреатина
- 2** Мезим® 10 000: обеспечивает высокую настроенность пациентов на прием препарата *(за счёт быстрого купирования панкреатической боли)*
- 3** Мезим® 10 000 при лечении хронического панкреатита – это:
 - купирование панкреатической боли
 - компенсация внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы





**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**