

СОСТАВ

Каждые 5 мл (1 чайная ложка) содержат:

- Папаин – 80 мг
- Пепсин – 40 мг
- Санзим-2000 – 10 мг

Состав

Папаин

- Фермент класса гидролаз. Выделен в кристаллическом виде из сока дынного дерева. Катализирует гидролиз белков, пептидов и амидов, эфиров и тиоэфиров. Особенно эффективно расщепляет белки мяса

Состав

- Пепсин

- Фермент класса гидролаз животного происхождения. Катализирует гидролиз белков и пептидов

Состав

- Санзим -2000

- универсальный дигестант, состоящий из более тридцати различных ферментов: протеазы, амилазы, липазы, целюлазы, рибонуклеазы, трипсиногенактивирующего и других ферментов

Показания к применению

- функциональные диспепсии у детей всех возрастов,
- дисбаланс или дефицит пищеварительных ферментов, сопровождающиеся чувствам дискомфорта, переполненности желудка, тошноты после еды;
- хронический энтерит, гастрит с пониженной секреторной функцией, панкреатит, синдром мальдигестии и мальабсорбции у детей и взрослых;
- неадекватность секреторных пищеварительных функций, связанная с заболеванием или операцией на желудке, тонком кишечнике или поджелудочной железе;
- токсикоз у беременных, метеоризм;
- отсутствие аппетита у детей;
- нервная анорексия у взрослых

Дозировка


- Детям от 3 х до 14 лет:
1 чайная ложка 3 раза в день
- Взрослым и подросткам:
1 столовая ложка 3 раза в день

Препарат принимается
во время или сразу после еды

САНЗИМ

сироп

процент излеченных пациентов страдающих функциональной диспепсией



Производитель: Фарко (Египет)

За дополнительной информацией
обращайтесь в Представительство
компании Фарко в Украине

Тел. 044 537 6893;
Факс: 044 537 68 94;