

# Аномалии развития матки и влагалища

Все пороки развития матки и  
влагалища являются  
проявлением нарушения  
правильного развития  
Мюллеровых протоков в  
эмбриональном периоде.

# Развитие Мюллеровых протоков происходит в три этапа

- Рост протоков в каудальном направлении 5-11 неделя (*аплазия влагалища и матки, удвоение матки и влагалища*).
- Слияние протоков с урогенитальным синусом 11-12 неделя (*двурогая матка, перегородка в матке*).
- Рассакывание срединной перегородки в месте слияния протоков с образованием единой матки, шейки матки и влагалища 12-16 нед. (*гипоплазия матки*).

# Классификация (Богданова Е.А.)

- Класс I *аплазия протоков репродуктивной системы.*
- Класс II *атрезия гимена (варианты строения гимена).*
- Класс III *пороки связанные с отсутствием слияния или неполных слияний (удвоение) протоков репродуктивной системы.*
- Класс IV *пороки связанные с сочетанием удвоения и аплазии протоков.*

# Аплазия протоков

1. Полная аплазия матки и влагалища.
2. Аплазия протоков РС с сохранением влагалища.
3. Аплазия протоков РС при функционирующей матке (*аплазия шейки матки, аплазия влагалища*).

# Пороки связанные с отсутствием слияния или неполных слияний протоков РС.

- Частичное удвоение протоков РС.

- Полное удвоение протоков РС.


- *Удвоение тела и шейки матки при наличии одного влагалища.*

- *Удвоение тела матки при наличии одной шейки матки, одного влагалища (двурогая, седловидная матка, внутренняя перегородка матки).*

# Пороки, связанные с сочетанием удвоения и аплазии РС

- Аплазия всего протока с одной стороны (однорогая матка).
- Удвоение матки и влагалища (с частичной аплазией обоих влагалищ ,с полной аплазией обоих влагалищ ,с частичной аплазией одного влагалища).
- Удвоение матки и влагалища с полной аплазией шейки и влагалища с одной стороны (*матка с добавочным рогом с эндометриальной полостью или без нее*).

# Синдром Майера-Рокитанского-Кюстнера (полная аплазия матки и влагалища).



- Врожденная аплазия матки и влагалища.
- Женский фенотип.
- Женский кариотип.
- Нормальная функция яичников.
- Нормальные вторичные половые признаки.
- Частое сочетание с другими врожденными пороками (скелета, мочевыделительной системы).




# Аплазия шейки матки при функционирующей матке.




- Матка может быть нормальной или рудиментарной.
- Лечение — гистерэктомия, при гематосальпинксе — с трубами.

# Аплазия влагалища при функционирующей матке.




- Может быть полным и частичным, как при функционирующей нормально так и при рудиментарной матке.
- Лечение – кольпопоз. При полной аплазии влагалища – гистерэктомия.

# Удвоение матки и влагалища



- Без нарушения оттока крови.
- С частичной аплазией одного влагалища.
- При нефункционирующей одной матке


## Сочетание удвоения с частичной аплазией одного влагалища.



### Лечение:


- При аплазии нижней трети влагалища — иссечение нижней стенки.
- При полной аплазии влагалища — удаление добавочной матки, гематосальпинкса.

# Однорогая матка




- С рудиментарным рогом, сообщающимся с основным рогом.

# Однорогая матка



- С замкнутым рудиментарным рогом.
- Лечение – удаление рудиментарного рога.

# Однорогая матка



- Рудиментарный рог без полости.


# Однорогая матка



- Без рудиментарного рога.



# Двурогая матка



- Полная форма двурогой матки подлежит реконструктивно-пластической операции.

# Внутриматочная перегородка.



- Может быть полной и неполной
- Лечение – гистерорезектоскопия, требуется при бесплодии или невынашивании беременности.

Пороки развития матки и  
влагалища часто сочетаются с  
хромосомными аномалиями  
(мозаицизм, инверсии, делеции  
по X хромосоме).

Закладка мочевыделительной системы и полового тракта происходит в одни и те же сроки эмбриогенеза. Обязательно изучение мочевыделительной системы.

Нередко встречаются аномалии  
пояснично – крестцового  
отдела позвоночника,  
анатомически узкий таз.

Спасибо за внимание!