

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов поворота.

Алгебра и начала анализа, 10 класс

Вспомним, что любая точка координатной плоскости имеет две координаты – абсциссу и ординату:



x – абсцисса точки M

y – ордината точки M

$(x; y)$ – координаты точки M

Рассмотрим произвольный острый угол поворота α.



cosα – абсцисса точки поворота

sinα – ордината точки поворота

(под «точкой поворота» следует понимать – «точку единичной тригонометрической окружности, полученной при повороте на ***α*** радиан от начала отсчета»)

Проследим за координатами точки единичной тригонометрической окружности, полученной при вращении на различные положительные углы от 0 до 2π :

0(1; 0)



$cos\,0 = 1$

$sin\,0 = 0$

Проследим за координатами точки единичной тригонометрической окружности, полученной при вращении на различные положительные углы от 0 до 2π :

$\frac{\pi}{6}\left(\frac{\sqrt{3}}{2};\frac{1}{2}\right)$



$$\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$$

Проследим за координатами точки единичной тригонометрической окружности, полученной при вращении на различные положительные углы от 0 до 2π :

$\frac{\pi}{4}\left(\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$



$\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

Проследим за координатами точки единичной тригонометрической окружности, полученной при вращении на различные положительные углы от 0 до 2π :

$\frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$



$\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$

$\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

Проследим за координатами точки единичной тригонометрической окружности, полученной при вращении на различные положительные углы от 0 до 2π :



Проследите и самостоятельно запишите значения синуса и косинуса остальных углов поворота:



Также самостоятельно определите точки поворота для III и IV координатных четвертей.

Проведем луч из начала координатной плоскости через точку поворота α.



А теперь добавим числовую прямую, являющуюся касательной к окружности в точке 0, совпадающая с ней началом отсчета и таким же ед.отр. как на оси Оу.

Эта координатная прямая называется *линией тангенсов*, т.к. в точке пересечения луча, проведенного из центра окружности через точку поворота α (или обратно, если точка поворота в II или III координатных четвертях), находится значение tgα.



Докажите этот факт самостоятельно, рассматривая два подобных прямоугольных треугольника.


ЛИНИЯ
тангенсов
tgα4
π/2
y
α4
1
1
tgα5
π
0
x
0
1
tg0
α5
tgα3
α3
α2
α1
tgα2
−π/2
tgα1

Постарайтесь самостоятельно разобраться в содержании данного слайда…



Итогом всей предыдущей работы может являться следующий чертеж:



Выполните его аккуратно в своих тетрадях!