

Бактерии- возбудители кишечных инфекций


БУДАНОВА Елена Вячеславовна

К.М.Н., доцент


Кишечные инфекции – это большая группа заболеваний, которые характеризуются фекально-оральным механизмом заражения и преимущественным поражением различных отделов желудочно-кишечного тракта

Этиология: бактерии, вирусы, простейшие и микроскопические грибы

Реализация фекально-орального механизма заражения



Немного истории



Немного истории



Заблеваемость кишечными инфекциями



- В мире – около 500 млн. случаев в год, около 3 млн. человек погибает
- В России – ежегодно около 1 млн. случаев





Фото ЕРА

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ

- Семейство – *Enterobacteriaceae*
- Род *Escherichia*
- Род *Shigella*
- Род *Salmonella*
- Род *Yersinia* и др.

Кишечные палочки (эшерихии) – *Escherichia coli*




Теодор Эшерих (1857-1911)



- Немецкий педиатр
- Выделил *E. coli* из фекалий ребенка, больного «детской холерой» (1885)
- Назвал *Bacterium coli commune*

Морфологические и тинкториальные свойства



- Мелкие прямые грамотрицательные палочки с закругленными концами
- Спор и капсул не образуют
- Могут иметь микрокапсулу
- Подвижны (*перитрихи*)

Культуральные свойства эшерихий

- Факультативные анаэробы
- Хорошо растут на простых питательных средах
- На жидких средах дают диффузное помутнение
- Условия культивирования: pH 7,2 – 7,4; оптимальная температура 37°C



Культуральные свойства эшерихий

- На лактозо-содержащих дифференциально-диагностических средах образуют окрашенные колонии (на рис. среда Эндо)




Биохимические свойства эшерихий

- Высокая биохимическая активность:
- Глюкоза «+» (КГ)
- Лактоза «+»
- Индол «+»
- H_2S «-»
- Утилизация цитрата «-»



Антигенные свойства эшерихий

- Имеют *O*-, *H*-, *K*-антигены
- *O*-(170 разновидностей), *K*- (~100), *H*- (~70)
- По *O*-антигену разделены на *серогруппы*
- Определяют в реакции агглютинации на стекле





Классификация эшерихий

- Делят на 2 биовара:
- ❖ Бивар 1 – условно-патогенные эшерихии (нормальная микрофлора) – могут вызывать **п а р е н т е р а л ь н ы е э ш е р и х и о з ы**
- ❖ Биовар 2 –
д и а р е е г е н н ы е э ш е р и х и и
(вызывают кишечные эшерихиозы)

Классификация диареегенных эшерихий



- *Энтеропатогенные кишечные палочки (ЭПКП)*
– вызывают колиэнтерит у детей
- Передаются контактно-бытовым путем
- Поражают тонкий кишечник, вызывая «секреторную диарею»



Классификация



диареегенных эшерихий

- *Энтеротоксигенные кишечные палочки (ЭТКП)* – вызывают холероподобный гастроэнтерит («диарея путешественников»). Продуцируют энтеротоксин; поражают тонкий кишечник, вызывая «секреторную диарею»




Классификация диареегенных эшерихий

- *Энтероинвазивные кишечные палочки (ЭИКП)*
– поражают толстый кишечник, вызывая «инвазивную диарею» как при дизентерии



Классификация диареегенных эшерихий

- *Энтерогеморрагические кишечные палочки (ЭГКП)* - поражают тонкий и проксимальные отделы толстого кишечника, вызывая «инвазивную диарею» с геморрагическим синдромом и острой почечной недостаточностью



Факторы вирулентности эшерихий

- Белок наружной мембраны (*ИНТИМИН*)
- Инвазивные белки наружной мембраны
- Шигаподобные токсины
- Гемолизины
- Веротоксин
- термолабильный (LT) и
- термостабильный (ST) энтеротоксины

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Биовары 1 и 2 различаются по антигенным свойствам и факторам вирулентности, обусловленным наличием генов в плазмидах или хромосоме

Резистентность эшерихий

- Малоустойчивы в окружающей среде
- Являются санитарно-показательными бактериями для оценки санитарного благополучия объектов внешней среды – воды и почвы, лекарственных средств и пр.
- Их обнаружение в воде и почве свидетельствует о свежем (недавнем) фекальном загрязнении этих объектов



Особенности эпидемиологии эшерихиозов

- Источник инфекции – человек (больной или носитель), при ЭГКП – сельскохозяйственные животные



носитель),
е
ЖИВОТНЫЕ




Спий
фекаль
инфекции –
ТОВОЙ, ВОДН



й
й

Клиника и иммунитет при кишечном эшерихиозе

- Клиника определяется серогруппой и факторами вирулентности возбудителя
- Иммунитет после выздоровления не формируется
- Важное значение имеет наличие местного иммунитета и антагонизм нормальной микрофлоры



**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА
ЭШЕРИХИОЗОВ**



Микробиологическая диагностика

- Материал для исследования:

Фекалии, редко – рвотные массы



- Метод исследования:

бактериологический

Лечение кишечных эшерихиозов

- ✓ антибиотики (при тяжелом течении и маленьким детям)
- ✓ Пробиотики (колибактерин, бифидумбактерин, лактобак



Профилактика эшерихиозов

- Специфическая профилактика:

не разработана



**Шигеллы – возбудители
бактериальной дизентерии
(шигеллеза)**

Таксономическое положение и классификация

- Семейство – *Enterobacteriaceae*
- Род *Shigella*

Виды:

- ❖ *S.dysenteriae* (группа А)
- ❖ *S.flexneri* (группа В)
- ❖ *S.boydii* (группа С)
- ❖ *S.sonnei* (группа D)


Шига Киеси (1870-1957)



- Японский бактериолог
- Открыл возбудитель дизентерии (1897) во время эпидемии в Японии
- Род получил его имя в 1919 г.


Морфологические и тинкториальные свойства шигелл

- Мелкие грамотрицательные палочки с закругленными концами
- Спор и капсул не образуют
- Могут иметь *микрокапсулу*
- Неподвижны




Культуральные свойства шигелл

- Факультативные анаэробы
- Хорошо растут на простых питательных средах
- Условия культивирования: pH 7,2 – 7,4, оптимальная температура 37°C
- На лактозо-содержащих дифференциальных средах образуют желтые колонии



Биохимические свойства шигелл

- Биохимическая активность относительно низкая
- Глюкоза «+» (К)
- Лактоза «-», кроме *S.sonnei* (лак «+», 72 ч.)
- H_2S «-»
- Утилизация цитрата «-»
- Группа А - маннит «-», остальные - маннит «+»




Антигенные свойства шигелл

- Имеют *O*- и *K*-антигены

Факторы вирулентности шигелл

- Факторы адгезии (белки наружной мембраны и фимбрии)
- Инвазивные белки (*ipa*-белки)
- Белковые экзотоксины – токсин Шига (*ST*) и Шига-подобный токсин (*SLT*)
- Белки внутриклеточного распространения



Резистентность шигелл

- Низкая
- Чувствительны к дезинфектантам и УФ
- Погибают в кислой среде и под действием бактериофага, поэтому:




- Посев исслед. материала - у постели больного
- Доставка материала (фекалий) в транспортной среде с консервантом

Особенности эпидемиологии шигеллезов

- Источник инфекции – человек (больной или бактерионоситель)
- Механизм заражения – фекально-оральный

Особенности эпидемиологии шигеллезов

- Пути
- ❖ дизентерии
- ❖ контактно-бытовой
- ❖ пищевой
- ❖ водной
- ❖ фекально-оральной



ой;

пи

Патогенез шигеллеза

- «Входные ворота» инфекции – рот, ЖКТ
- Адгезия в толстом кишечнике
- Выделение экзотоксина, обладающего цитотоксическим действием
- Гибель колоноцитов с развитием эрозий и язв
- Процесс локальный – *бактериемия* не развивается

Клиника и иммунитет при шигеллезе

Бактериальная дизентерия (шигеллез) – острое или хроническое инфекционное заболевание человека с язвенным поражением толстого кишечника

- Инкубационный период – 2-5 дней
- Острое начало
- Лихорадка
- Диарея
- Стул с примесью крови, слизи и гноя

Иммунитет непродолжительный

Микробиологическая диагностика шигеллезов

- Материал для исследования: Фекалии
- Методы исследования:
 - ❖ Бактериологический
 - ❖ Серологический (РПГА для ретроспективной диагностики и при хронической дизентерии)



Лечение и профилактика

- Лечение:

- ✓ антибиотики (при тяжёлых формах)

- ✓ NB: Шигеллы устойчивы к пенициллину и ампициллину

- ✓ Пробиотики (*колибактерин, бификол* и др.)

- Специфическая профилактика:

- ❖ Дизентерийный бактериофаг для профилактики

- ❖ Вакцина не разработана



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ




***Бактерии- возбудители
кишечных инфекций
(продолжение)***

БУДАНОВА Елена Вячеславовна

К.М.Н., доцент

сальмонеллы



ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Семейство – *Enterobacteriaceae*

Род *Salmonella*

Виды *S. Typhi*

S. Paratyphi A

S. Paratyphi B

S. Typhimurium

S. Enteritidis и др.

Сэлмон Дэниел (1850-1914)



- Американский ветеринарный врач
- Открыл возбудитель «холеры свиней» (1885)
- Род *Salmonella* получил его имя в 1933 г.

Морфологические и тинкториальные свойства

- Мелкие грамотрицательные палочки с закругленными концами
- Спор и капсул не образуют
- Могут иметь *микрокапсулу*
- Подвижны (*перитрихи*)



Культуральные свойства сальмонелл

- Факультативные анаэробы
- Хорошо растут на простых питательных средах
- Среда обогащения – желчный бульон
- Условия культивирования: рН 7,2 – 7,4, оптимальная температура 37°C


Культуральные свойства сальмонелл

- На средах Эндо, Левина, Плоскирева образуют бесцветные колонии
- На висмут-сульфитном агаре – колонии черного цвета



Биохимические свойства сальмонелл

- Высокая биохимическая активность
- Глюкоза «+» (КГ)
- Лактоза «-»
- Индол «-»
- H_2S «+»
- Утилизация цитрата «+»
- Лизиндекарбоксилаза «+»




Антигенные свойства сальмонелл

- Имеют *O-, H-, K-антигены*
- *S. Typhi* имеет *Vi-антиген*

- По *O-антигену* сальмонеллы разделены на *серогруппы (A, B, C, D, E)*
- По *H-антигену* – на *серовары*, соответствующие названию вида

Факторы вирулентности сальмонелл



- Адгезины
- Инвазины
- Ингибиторы образования фаголизосомы
- Эндотоксин
- Энтеротоксин (экзотоксин)

Резистентность сальмонелл

- Относительно малоустойчивы
- Чувствительны к дезинфектантам, нагреванию и УФ
- Устойчивы к низким температурам
- В окружающей среде могут переходить в некультивируемую форму

- **Брюшной тиф и паратифы А и В** –острые инфекционные заболевания человека с циклическим течением, которые характеризуются лихорадкой, поражением лимфоидных органов тонкого кишечника и интоксикацией
- Возбудитель брюшного тифа - *S. Typhi*, паратифа А - *S. Paratyphi A*, паратифа В - *S. Paratyphi B*



Особенности эпидемиологии брюшного тифа и паратифов

- Источник инфекции – человек (больной или бактерионоситель)
- *Паратиф В* может передаваться от ЖИВОТНЫХ
- Механизм заражения – фекально-оральный
- Пути передачи инфекции – водный (ведущий), пищевой и контактно-бытовой

Патогенез брюшного тифа и паратифов

- «Входные ворота» инфекции – рот, ЖКТ
- Адгезия в тонком кишечнике
- Размножение в лимфоидных органах тонкого кишечника
- Захват макрофагами
- *Бактериемия*
- Фиксация в органах РЭС (печень, почки, селезенка, красный костный мозг и др.)

КЛИНИКА брюшного тифа и паратифов



Иммунитет после перенесенного брюшного тифа или паратифа

- Стойкий
- Клеточный иммунитет
- Антитела непротективные, т.е. не защищают от заболевания, но являются «свидетелями» инфекционного процесса
- Динамика образования антител:
 - О-антитела* -острый период;
 - Н-антитела* –реконвалесценция;
 - Vi-антитела* - бактерионосительство

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА
БРЮШНОГО ТИФА И
ПАРАТИФОВ**



Микробиологическая диагностика

Материал для исследования:

1 неделя – кровь, 2-3 неделя – фекалии, моча, желчь, пунктат красного костного мозга


Методы диагностики:

- ✓ Экспресс-диагностика (РИФ, ПЦР)
- ✓ Бактериологический
- ✓ Серологический

Лечение и профилактика брюшного тифа и паратифов

- Лечение:
- ✓ антибиотики
- ✓ эффективны ампициллин, левомицетин, фторхинолоны

Лечение и профилактика брюшного тифа и паратифов



Профилактика:

Бактериофаг – для

Профилактики

Химическим

✓ Убитая с

✓ Химическая вакцина, обогащенная

✓ Живая аттенуированная



а

М

1)

- ***Сальмонеллез*** – острая кишечная инфекция человека или животных, которая характеризуется преимущественным поражением ЖКТ и интоксикацией, реже – тифоподобным течением или септикопиемией
- Возбудители – *S. Typhimurium*, *S. Enteritidis*, *S. Newport* и др.

Особенности эпидемиологии сальмонеллезов

- Сальмонеллезы – зооантропоинфекции
- Источник инфекции – животные и пресмыкающиеся
- Механизм заражения – фекально-оральный
- Пути передачи (основной); возможны водопроводной, контактно-бытовой



Источник инфекции при сальмонеллезе





Патогенез сальмонеллеза

- «Входные ворота» инфекции – рот, ЖКТ
- Адгезия в тонком кишечнике
- **Энтеротоксин** активирует аденилатциклазу, что ведет к «секреторной диарее»
- **Эндотоксин** активирует арахидоновую кислоту, а затем – аденилатциклазу, что усиливает диарею

Клиника сальмонеллеза

- Инкубационный период – от нескольких часов до 2-3 дней
- Острое начало
- Гастроэнтерит
- Интоксикация
- Обезвоживание




Иммунитет

- Непродолжительный
- Видоспецифический

Микробиологическая диагностика сальмонеллеза

- Материал для исследования:
Рвотные массы, промывные воды желудка, фекалии; пищевые продукты
- Метод исследования:

бактериологический



Лечение и профилактика сальмонеллеза

- Лечение:

- ✓ Антибиотики в тяжелых случаях
- ✓ Протекторы кишечника эффективны
- кальций и витамин D снижают заболеваемость
- аденин снижает заболеваемость
- Зы




- Специфическая профилактика:

не разработана

**Возбудитель холеры -холерный
вибрион
(*Vibrio cholerae*)**



Роберт Кох (1843-1910)



- Немецкий бактериолог
- Лауреат Нобелевской премии 1905 г. за открытие возбудителя туберкулеза
- Открыл возбудителя холеры (1883)- «запятая Коха»

ЕРМОЛЬЕВА Зинаида Виссарионовна (1898-1974)




- Советский микробиолог, профессор, действительный член АМН
- Изучала холерные и холероподобные вибрионы; провела опыт по самозаражению холерными вибрионами
- Открыла «светящийся» вибрион
- Изучала применение бактериофагов для профилактики и лечения кишечных инфекций

Заболееваемость холерой



В 2006 г. в 52 странах мира—
заболели 236896 человек, 6311
из них умерли




Таксономическое положение и классификация

- Семейство – *Vibrionaceae*
- Род *Vibrio*
- Вид: *Vibrio cholerae*

Классификация внутри вида:

- ❖ Деление на серогруппы (**O1** и **O139** – вызывают холеру)
- ❖ Серогруппу **O1** делят на биовары – *cholerae classic* и *eltor*
- ❖ Серогруппа **O139** – биовар *Bengal*

Морфологические и тинкториальные свойства



- Мелкие грамотрицательные палочки **в форме запятой**
- Спор и капсул не образуют
- Подвижны (*монотрихи*)

Культуральные свойства

- Факультативные анаэробы, но лучше растут в аэробных условиях
- Хорошо растут на простых питательных средах
- Щелочелюбивы: оптимальная рН 8,5-9,0

Культуральные свойства




- На жидкой питательной среде образуют нежную пленку через 6-8 часов



- На *TCBS* агаре образуют желтые колонии (ферментируют сахарозу)

Биохимические свойства

- Высокая биохимическая активность
- Глюкоза «+»
- Лактоза «+»
- Гликоген «+»
- Крахмал «+»
- Индол «+»
- Разжижают желатину




Антигенные свойства

- Имеют *O-* и *H-антигены*
- По *O-антигену* разделены на *серогруппы*

Факторы вирулентности

- Адгезины (пили)
- Муциназа
- Нейраминидаза
- Эндотоксин
- Экзотоксин
(*холероген*)



Механизм действия холерогена



Резистентность

- Чувствительны к слабым растворам кислот, дезинфектантам
- Сохраняются в морской и пресной воде непроточных водоемов
- Переходят в некультивируемую форму
- Вступают в симбиоз с планктоном



- *Холера – острая кишечная инфекция человека с фекально-оральным механизмом заражения, которая характеризуется тяжелым обезвоживанием вследствие потери жидкости с испражнениями и рвотными массами.*
- Холера относится к карантинным инфекциям

Эпидемиология холеры

- Сапрофитная бактерия
- Источники инфекции – человек (носитель или больной)
- Механизм заражения – фекально-оральный
- Пути передачи инфекции – водный, пищевой, контактно-бытовой (во время эпидемий)



Патогенез холеры

- «Входные ворота» инфекции – рот, ЖКТ
- Первый барьер – кислая среда желудка
- Адгезия в тонком кишечнике
- Выработка холерогена
- Обезвоживание

Клиника холеры

холерный алгид



Иммунитет

- Клеточно-гуморальный
- Нестойкий и непродолжительный

Микробиологическая диагностика холеры

- Материал для исследования:

испражнения

реакционный
продукты



- Методы и

□ Экспресс-

□ Бактерио

□ Бактериологический



Лечение и профилактика холеры

Лечение:

- ✓ Антибиот
- ✓ Санация
фуросол
- ✓ Регидр



Лечение и профилактика холеры

Специфическая профилактика:

- ▣ Убитая холерная вакцина*
- ▣ Комбинированная холерная вакцина
(содержит O1 антиген и холероген-анатоксин)*



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ



***Бактерии- возбудители
кишечных инфекций
(окончание)***

БУДАНОВА Елена Вячеславовна

К.М.Н., доцент


Возбудители бруцеллеза

БРЮС, сэр Дэвид (1855-1931)



- Английский военный врач и паразитолог
- Открыл возбудителя мальтийской лихорадки (1886), выделив его из организма умершего человека
- Этот возбудитель отнесен в 1920г. к роду *Brucella*

БАНГ Бернхард (1848-1932)



- Датский ветеринарный врач
- Изучал туберкулез домашних животных
- Открыл возбудителя инфекционного аборта животных – *Brucella abortus* (1897), который называют «палочкой Банга»

Таксономическое положение

- Семейство – *Brucellaceae*
- Род *Brucella*
- Виды: *B. abortus*,
B. melitensis,
B. suis, и др.


Морфологические и тинкториальные свойства бруцелл

- Очень мелкие грамотрицательные палочки и коккобактерии
- Обладают полиморфизмом
- Спор и капсул не образуют
- Могут иметь *микрокапсулу*
- Неподвижны




Культуральные свойства бруцелл

- Микроаэрофилы (аэробный метаболизм)
- Некоторые виды нуждаются в 10-15% CO₂ (капнофилы)
- Растут на сложных питательных средах, медленно – в течение 1-3 недель
- Колонии мелкие гладкие с перламутровым оттенком
- Факультативны
- Культивируются
- **Внимание!** только в с бор



Биохимические свойства бруцелл

- Низкая биохимическая активность
- Глюкоза «+» (К)
- Оксидаза «+»
- Каталаза «+»
- Дифференциация видов основана на:
 - ✓ продукции H_2S
 - ✓ потребности в CO_2 для роста
 - ✓ бактериостатическом действии анилиновых красителей – *фуксина* и *тионина*



Антигенные свойства бруцелл

- Имеют соматический *O-антиген*, который состоит из субъединиц *A* и *M* (*видовые поверхностные антигены*)
- Антиген *M* доминирует у *B.melitensis*, антиген *A* – у *B.abortus*, *B.suis*
- Наличие *A* и *M* компонентов у всех видов бруцелл создает *перекрестный иммунитет*

Факторы вирулентности бруцелл

- Факторы адгезии (пили)
- Факторы инвазии (*гиалуронидаза*)
- Эндотоксин
- Антифагоцитарные факторы (микрокапсула, ингибиторы образования фаголизосомы)

Резистентность бруцелл

- Устойчивы к низким температурам
- Сохраняются в молоке до 9 мес., сыре из непастеризованного молока – до 1 года
- Чувствительны к нагреванию – погибают при кипячении и пастеризации молока, термической обработке пищи
- Чувствительны к дезинфектантам

БРУЦЕЛЛЕЗ – острое, подострое или хроническое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется гриппоподобным течением и поражением опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, центральной нервной и мочеполовой систем.

Особенности эпидемиологии бруцеллеза

- Источник инфекции – сельскохозяйственные животные (КРС, МРС, свиньи,

От человека



друзья



передачи инфекции
пищ




и)
о-оральный
душий) –
ментарный)

Особенности эпидемиологии бруцеллеза


- ❖ Бруцеллез передается также контактно, аэрогенно - при уходе за больными ЖИВОТНЫМИ
- ❖ Заболевание обычно носит профессиональный характер

Показатели профессиональной заболеваемости по основным нозологическим формам за 1997-2004 г.г.



Патогенез бруцеллеза

- Возбудитель попадает через рот, кожу, слизистые оболочки
- Размножение в макрофагах
- *Бактериемия*
- Фиксация во внутренних органах - печени, почках, селезенке, красном костном мозге, суставах, ЦНС и др.
- Выделяются с молоком!



Клиника бруцеллеза и иммунитет

- Клиника:

- Инкубационный период (4-6 недель)
- Острое начало (по типу грипп)
- Подострое и хроническое течение по типу ревматизма.
- Нарушение опорно-двигательного аппарата, нервно-мышечной системы
- Инвалидность
- При аэрогенном заражении - пневмония



- Иммунитет нестерильный. Развивается ГЗТ



Методы диагностики:

□ ПЦР

□ Бактериоскопический

□ Бактериологический

(«холодовое обогащение»)

□ Биологический


□ Серологический

Микробиологическая диагностика бруцеллеза

- Материал для исследования:

кровь, моча, грудное молоко
пунктат

- Методы исследования:



РПГА)

Бюрне с бруцеллином)

Лечение и профилактика бруцеллеза

- Лечение:

- ✓ антибиотики (тетрациклины, аминогликозиды, фторхинолоны)
- ✓ *убитая бруцеллезная вакцина* (при хроническом бруцеллезе, комбинируют с антибиотиками — иммуноантибиотикотерапия)

- Специфическая профилактика:

- ✓ *Живая бруцеллезная вакцина 19/18*



Профилактика бруцеллеза

- Неспецифическая профилактика:



**Возбудитель ботулизма
(*Clostridium botulinum*)**



Таксономическое положение и классификация

- Семейство – *Clostridiaceae*


- Род *Clostridium*

- Вид: *C. botulinum*

(греч. “clostr” - веретено; лат. “botulus” - колбаса)

- ❖ Возбудитель открыт бельгийским бактериологом Э. ван Эрменгемом в 1896 г.

Морфологические и тинкториальные свойства



- Крупные грамположительные палочки с обрубленными концами
- Имеют овальные споры, расположенные субтерминально (бактерии со спорами похожи на «теннисные ракетки»)
- Капсул не имеют
- Подвижны (*перитрихи*)

Культуральные свойства



- Строгие анаэробы
- Условия культивирования: оптимальная температура 35°C, кровяной агар;
- через сутки образуют мелкие блестящие колонии с небольшими зонами гемолиза

Биохимические свойства


- Высокая биохимическая активность
- Имеют выраженные протеолитические и сахаролитические свойства, проявляют липазную активность
- Изучение биохимических свойств не имеет практического значения

Факторы вирулентности

- **Ботулинический экзотоксин**
(нейротоксин, Zn^{2+} -зависимая эндопептидаза)
- Механизм действия токсина – блокирование выделения ацетилхолина, нарушение передачи нервного импульса в синапсах, что приводит к параличу



Антигенные свойства



БОТОКСИНА
В – А, В, С, 1

восприимч
F)



BEFORE BOTOX



AFTER BOTOX



Резистентность

- Вегетативные клетки малоустойчивы в окружающей среде
- Споры бактерий выдерживают кипячение до 20 часов
- Автоклавирование при 120°C убивает споры через 20 минут
- Ботулотоксин сохраняет активность при нагревании до 100°C в течение при 80°C – 30-40 мин.



БОТУЛИЗМ – это острая интоксикация с преимущественно фекально-оральным механизмом заражения, которая характеризуется поражением ЦНС с развитием параличей и высокой летальностью

Особенности эпидемиологии ботулизма



животные, птицы,
поже



рекал

Путь передачи и



В... КТ
путь инфицирован



ра

Патогенез ботулизма

- **Ботулизм – интоксикация**, т.к. заболевание возникает вследствие попадания в организм ботулотоксина
- Токсин попадает через рот, реже – через раневую поверхность в кровь
- Всасывание в желудке (при попадании через рот)
- В тонком кишечнике под действием трипсина *протоксин* превращается в **ТОКСИН**
- **Токсинемия**
- Развитие вялых параличей

Клиника ботулизма и иммунитет

- Клиника:
 - Инкубационный период – несколько часов – несколько дней
 - Симптомы поражения мозговых центров – *диплопия, паралич аккомодации, блефароптоз, афагия, афония, амимия, анизокория*
 - Паралич
 - Летальность 20-40%

Иммунитет после выздоровления не формируется, т.к. **токсическая доза ботулотоксина значительно ниже иммуногенной**

Клиника ботулизма



Микробиологическая диагностика ботулизма

- Материал для исследования:
промывные воды желудка, рвотные массы, кровь, фекалии, пищевые продукты
- Цель диагностики – обнаружение ботулотоксина и определение его типа
- Обнаружение возбудителя носит вспомогательный характер, т.к. малоинформативно
- Методы исследования:
 - ❖ Биологический (РН токсина в мышцах)
 - ❖ Серологический (РПГА)
 - ❖ Бактериологический и биохимический (вспомогательные методы)



Лечение ботулизма

- Цель лечения – нейтрализация токсина

✓ Антитоксическая противоботулиническая

✓ Иммуноглобулины (полученные от животных)
✓ Иммуноглобулины (от человека)



✓ Иммуноглобулины (полученные от человека)
моноклональные сыворотки соответствующих серотипов



Профилактика ботулизма

- Специфическая профилактика:

Ботулинические анатоксины типов А, В, Е
в составе следующих препаратов:

- ✓ *Трианатоксин*
- ✓ *Тетраанатоксин*
- ✓ *Пентаанатоксин*
- ✓ *Секстаанатоксин*

- **Вводят группам риска**

Профилактика ботулизма

- Неспецифическая профилактика:





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!