



Прекращение ИВЛ и удаление трахеостомической трубки в нейрореанимации

**НИИ нейрохирургии
им Н.Н. Бурденко
Горячев А.С., Савин И.А.,
Ошоров А.В.**

План лекции

Часть первая

- Прекращение ИВЛ или WEANING

Часть вторая

- Деканюляция трахеи

Часть первая

Прекращение ИВЛ или WEANING

- Определения
- Протоколы и рекомендации
- Простой weaning
- Сложный weaning
- Длительный weaning
- Трахеостомия и weaning
- Режимы ИВЛ и weaning


Поехали!

- **Определения**
- Протоколы и рекомендации
- Простой weaning
- Сложный weaning
- Длительный weaning
- Трахеостомия и weaning
- Режимы ИВЛ и weaning

WEANING



Мадонна Литта, 1480 г.



Мадонна с гвоздикой, 1473 г.

WEANING



ИВЛ

**(from mechanical
ventilation)**




**Самостоятельно
е
дыхание**



6 международная согласительная конференция по интенсивной терапии

Eur Respir J 2007; 29: 1033–1056
DOI: 10.1183/09031936.00010206
Copyright©ERS Journals Ltd 2007



TASK FORCE

Weaning from mechanical ventilation

J-M. Boles^{*}, J. Bion[#], A. Connors[¶], M. Herridge⁺, B. Marsh[§], C. Melot^f, R. Pearl^{**},
H. Silverman^{##}, M. Stanchina^{¶¶}, A. Vieillard-Baron⁺⁺, T. Welte^{§§}

Statement of the Sixth International Consensus Conference on Intensive Care Medicine

Organised jointly by the European Respiratory Society (ERS), the American Thoracic Society (ATS), the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), the Society of Critical Care Medicine (SCCM) and the Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), and approved by the ERS Executive Committee, February 2007

TABLE 3

Group/catego

Simple weaning

Patients who proceed from initiation of weaning to successful extubation on the first attempt without difficulty

Difficult weaning

Patients who fail initial weaning and require up to three SBT or as long as 7 days from the first SBT to achieve successful weaning

Prolonged weaning

Patients who fail at least three weaning attempts or require >7 days of weaning after the first SBT

SBT: sponta

SBT: тест спонтанного дыхания или spontaneous breathing trial

• **Простой weaning – успешное прекращение ИВЛ без осложнений с первой попытки**

• **Сложный weaning – успешное прекращение ИВЛ потребовало 2-3 SBT или заняло до 7 дней**

• **Длительный weaning – 3 или более неуспешных попытки или длительность более 7 дней от первого SBT**

Тест спонтанного дыхания или spontaneous breathing trial (SBT)

Пациент дышит самостоятельно 30-120мин
в CPAP, в PSV или совсем без поддержки

Оценка функции:

- **дыхания,**
- **гемодинамики,**
- **признаков утомления,**
- **сознания**

Часть первая

- Определения
- **Протоколы и рекомендации**
- Простой weaning
- Сложный weaning
- Длительный weaning
- Трахеостомия и weaning
- Режимы ИВЛ и weaning



Effect on the Duration of Mechanical Ventilation of Identifying Patients Capable of Breathing Spontaneously

E. WESLEY ELY, M.D., M.P.H., ALBERT M. BAKER, M.D., DONNIE P. DUNAGAN, M.D., HENRY L. BURKE, M.D., ALLEN C. SMITH, M.D., PATRICK T. KELLY, M.D., MARGARET M. JOHNSON, M.D., RICK W. BROWDER, M.D., DAVID L. BOWTON, M.D., AND EDWARD F. HAPONIK, M.D.

**Исследование показало
уменьшение длительности ИВЛ
и сокращение времени пребывания
в отделении ИТ при использовании
протокола WEANING**





Effect on the Duration of Mechanical Ventilation of Identifying Patients Capable of Breathing Spontaneously

E. WESLEY ELY, M.D., M.P.H., ALBERT M. BAKER, M.D., DONNIE P. DUNAGAN, M.D., HENRY L. BURKE, M.D., ALLEN C. SMITH, M.D., PATRICK T. KELLY, M.D., MARGARET M. JOHNSON, M.D., RICK W. BROWDER, M.D., DAVID L. BOWTON, M.D., AND EDWARD F. HAPONIK, M.D.

Протокол

1) Ежедневная оценка

- $PaO_2/FiO_2 > 200$
- $PEEP < 5$
- Адекватный кашель
- $f/V_t < 105$
- Нет вазопрессоров
- Нет седации

2) 2-часовой SBT

PSV или T-tube



Bedside Criteria for Discontinuation of Mechanical Ventilation

Steven A. Sahn, M.D., and S. Lakshminarayan, M.B.

CHEST, VOL. 63, NO. 6, JUNE, 1973

BEDSIDE CRITERIA FOR





FIGURE 1. Diagrammatic representation of system used for MV and MVV measurements. Note two one-way flutter valves which ensured nonrebreathing system.



1996

Effect on the Duration of Mechanical Ventilation of Identifying Patients Capable of Breathing Spontaneously

E. WESLEY ELY, M.D., M.P.H., ALBERT M. BAKER, M.D., DONNIE P. DUNAGAN, M.D., HENRY L. BURKE, M.D., ALLEN C. SMITH, M.D., PATRICK T. KELLY, M.D., MARGARET M. JOHNSON, M.D., RICK W. BROWDER, M.D., DAVID L. BOWTON, M.D., AND EDWARD F. HAPONIK, M.D.





Effect on the Duration of Mechanical Ventilation of Identifying Patients Capable of Breathing Spontaneously

E. WESLEY ELY, M.D., M.P.H., ALBERT M. BAKER, M.D., DONNIE P. DUNAGAN, M.D., HENRY L. BURKE, M.D., ALLEN C. SMITH, M.D., PATRICK T. KELLY, M.D., MARGARET M. JOHNSON, M.D., RICK W. BROWDER, M.D., DAVID L. BOWTON, M.D., AND EDWARD F. HAPONIK, M.D.

Crit Care Med. 1997 Apr;25(4):567-74.

A randomized, controlled trial of protocol-directed versus physician-directed weaning from mechanical ventilation.

Kollef MH, Shapiro SD, Silver P, StJohn RE, Prentice D, Sauer S, Ahrens TS, Shannon W, Baker-Clinkscale D.

Department of Internal Medicine, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110, USA.

Abstract

OBJECTIVE: To compare a practice of protocol-directed weaning from mechanical ventilation implemented by nurses and respiratory therapists with traditional physician-directed weaning.

SETTING: Medical and surgical intensive care units in two university-affiliated teaching hospitals.

PATIENTS: Patients requiring mechanical ventilation (n = 357).

CONCLUSION: Protocol-guided weaning of mechanical ventilation, as performed by nurses and respiratory therapists, is safe and led to extubation more rapidly than physician-directed weaning.

1997





Effect on the Duration of Mechanical Ventilation of Identifying Patients Capable of Breathing Spontaneously

E. WESLEY ELY, M.D., M.P.H., ALBERT M. BAKER, M.D., DONNIE P. DUNAGAN, M.D., HENRY L. BURKE, M.D., ALLEN C. SMITH, M.D., PATRICK T. KELLY, M.D., MARGARET M. JOHNSON, M.D., RICK W. BROWDER, M.D., DAVID L. BOWTON, M.D., AND EDWARD F. HAPONIK, M.D.

Crit Care Med. 1997 Apr;25(4):567-74.

A randomized, controlled trial of protocol-directed versus physician-directed weaning from mechanical ventilation.

[Kollef MH](#), [Shapiro SD](#), [Silver P](#), [StJohn RE](#), [Prentice D](#), [Sauer S](#), [Ahrens TS](#), [Shannon W](#), [Baker-Clinkscale D](#).

Department of Internal Medicine, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 63110, USA.

Abstract

Protocol Weaning of Mechanical Ventilation in Medical and Surgical Patients by Respiratory Care Practitioners and Nurses*

2000

Effect on Weaning Time and Incidence of Ventilator-Associated Pneumonia

Gregory P. Marelich, Susan Murin, Felix Battistella, John Inciardi, Terry Vierra and Marc Roby *Chest* 2000;118;459-467





Effect on the Duration of Mechanical Ventilation of Identifying
Patients Capable of Breathing Spontaneously

Predictors of Successful Extubation in Neurosurgical Patients

2001

ANDREW M. NAMEN, E. WESLEY ELY, STEPHEN B. TATTER, L. DOUGLAS CASE, MICHAEL A. LUCIA,
ALLEN SMITH, SCOTT LANDRY, JOHN A. WILSON, STEVEN S. GLAZIER, CHARLES L. BRANCH,
DAVID L. KELLY, DAVID L. BOWTON, and EDWARD F. HAPONIK
Am J Respir Crit Care Med Vol 163. pp 658-664, 2001

directed weaning.

SETTING: Medical and surgical intensive care units in two university-affiliated teaching hospitals.

PATIENTS: Patients requiring mechanical ventilation (n = 357).


CONCLUSION: Protocol-guided weaning of mechanical ventilation, as performed by nurses and respiratory therapists, is safe and led to extubation in 80% of patients.

phy:

Protocol Weaning of Mechanical Ventilation in Medical and Surgical Patients by Respiratory Care Practitioners and Nurses*

Effect on Weaning Time and Incidence of
Ventilator-Associated Pneumonia

Gregory P. Marelich, Susan Murin, Felix Battistella, John Inciardi, Terry
Vierra and Marc Roby Chest 2000;118;459-467



Predictors of Successful Extubation in Neurosurgical Patients

ANDREW M. NAMEN, E. WESLEY ELY, STEPHEN B. TATTER, L. DOUGLAS CASE, MICHAEL A. LUCIA, ALLEN SMITH, SCOTT LANDRY, JOHN A. WILSON, STEVEN S. GLAZIER, CHARLES L. BRANCH, DAVID L. KELLY, DAVID L. BOWTON, and EDWARD F. HAPONIK
Am J Respir Crit Care Med Vol 163. pp 658–664, 2001

TABLE 2. COMPARISON OF OUTCOMES IN STUDY GROUPS

Outcome Measure	Intervention Group (<i>n</i> = 49)	Control Group (<i>n</i> = 51)	p Value
Days of treatment	Median Number of Days		
Days from enrollment until passing DS	2 (1–5)	2 (1–7)	0.883
Days to first extubation attempt	5 (4–9)	4 (2–11)	0.715
Days of mechanical ventilation	6 (4–11)	6 (2–13)	0.387
Days to first successful extubation	10 (6–14)	10 (3–19)	0.682
Days of intensive care	15 (12–21)	14 (8–23)	0.941
Days of hospital care	40 (24–55)	32 (15–50)	0.380
Cost of care per patient	Median Number of Thousand U.S. \$ (Interquartile Range)		
Intensive care	55.7 (28.5–66.6)	44.0 (26.4–72.4)	0.737
Mechanical ventilation	2 (1.3–3.3)	1.8 (0.7–4.2)	0.711
Respiratory	4.1 (2.5–6.5)	4.8 (1.7–7.5)	0.928
Nonrespiratory	52.0 (25.7–60.6)	39.3 (24.2–66.0)	0.706
Entire hospitalization	64.5 (29.5–89.7)	57.7 (31.1–95.7)	0.749
Complications	Number of Patients (%)		
Any reintubation	10 (20%)	6 (12%)	0.239
Self-extubation	2 (4%)	4 (8%)	0.678
Tracheostomy	14 (29%)	15 (29%)	0.926
Pneumonia	3 (6%)	3 (6%)	1.0
Mechanical ventilation > 21 d	1 (2%)	5 (10%)	0.201
Death	20 (41%)	16 (31%)	0.325

Predictors of Successful Extubation in Neurosurgical Patients

ANDREW M. NAMEN, E. WESLEY ELY, STEPHEN B. TATTER, L. DOUGLAS CASE, MICHAEL A. LUCIA, ALLEN SMITH, SCOTT LANDRY, JOHN A. WILSON, STEVEN S. GLAZIER, CHARLES L. BRANCH, DAVID L. KELLY, DAVID L. BOWTON, and EDWARD F. HAPONIK
 Am J Respir Crit Care Med Vol 163. pp 658–664, 2001

TABLE 2. COMPARISON OF OUTCOMES IN STUDY GROUPS

Outcome Measure	Intervention Group (n = 49)	Control Group (n = 51)	p Value
Days of treatment	Median Number of Days		
Days from enrollment until passing DS	2 (1–5)	2 (1–7)	0.883
Days to first extubation attempt	5 (4–9)	4 (2–11)	0.715
Days of mechanical ventilation	6 (4–11)	6 (2–13)	0.387
Days to first successful extubation	10 (6–14)	10 (3–19)	0.682
Days of intensive care	15 (12–21)	14 (8–23)	0.941
Days of hospital care	40 (24–55)	32 (15–50)	0.380
Cost of care per patient	Median Number of Thousand U.S. \$ (Interquartile Range)		
Intensive care	55.7 (28.5–66.6)	44.0 (26.4–72.4)	0.737
Mechanical ventilation	2 (1.3–3.3)	1.8 (0.7–4.2)	0.711
Respiratory	4.1 (2.5–6.5)	4.8 (1.7–7.5)	0.928
Nonrespiratory	52.0 (25.7–60.6)	39.3 (24.2–66.0)	0.706
Entire hospitalization	64.5 (29.5–89.7)	57.7 (31.1–95.7)	0.749
Complications	Number of Patients (%)		
Any reintubation	10 (20%)	6 (12%)	0.239
Self-extubation	2 (4%)	4 (8%)	0.678
Tracheostomy	14 (29%)	15 (29%)	0.926
Reintubation	3 (6%)	3 (6%)	1.0
Mechanical ventilation > 21 d	1 (2%)	5 (10%)	0.201
Death	20 (41%)	16 (31%)	0.325

УМЕРЛО

20(41%)

16(31%)



Evidence-Based Guidelines for Weaning and Discontinuing Ventilatory Support

A Collective Task Force Facilitated by the American College of Chest Physicians, the American Association for Respiratory Care, and the American College of Critical Care Medicine

Neil R MacIntyre MD FAARC (Chairman)

Chest 2001;120(6)375–395

**Рекомендации по weaning
и прекращению ИВЛ на
основе доказательной
медицины
(2001)**



Evidence-Based Guidelines for Weaning and Discontinuing Ventilatory Support

Chest 2001;120(6)375–395

- Критерии готовности к SBT
- Оценка результатов SBT
- Реинтубация в 8 раз повышает риск развития нозокомиальной пневмонии
- в 6-12 раз увеличивается смертность
- Трахеостомия облегчает weaning, переносимость ИВЛ, меньше седации, легче активизировать пациента

Критерии готовности к weaning и SBT

- Адекватный кашель
- Отсутствие мокроты
- Разрешение заболевания потребовавшего ИВЛ
- Стабилизация клинического состояния
- Стабильная гемодинамика
- Адекватная оксигенация
- Адекватная функция легких
- Нормализация уровня сознания

Оценка SBT

Table 6. Criteria Used in Several Large Trials* to Define Tolerance of an SBT

Objective measurements
indicating tolerance/success

Объективные показатели

Gas exchange acceptability ($S_{pO_2} \geq 85-90\%$; $P_{O_2} \geq 50-60$ mm Hg; $pH \geq 7.32$; increase in $P_{aCO_2} \leq 10$ mm Hg)

Hemodynamic stability (HR $< 120-140$ beats/min; HR not changed $> 20\%$; systolic BP $< 180-200$ mm Hg and > 90 mm Hg; BP not changed $> 20\%$, no pressors required)

Stable ventilatory pattern (eg, RR $\leq 30-35$ breaths/min, RR not changed $> 50\%$)

Subjective clinical assessments
indicating intolerance/failure

Клинические проявления непереносимости теста

Change in mental status (eg, somnolence, coma, agitation, anxiety)

Onset or worsening of discomfort
Diaphoresis

Signs of increased work of breathing (use of accessory respiratory muscles, thoracoabdominal paradox)

Газообмен;
Оксигенация;
CO₂; pH

Стабильная
гемодинамика

Стабильное
самостоятельное
дыхание

Нарушение сознания;
Ухудшение самочувствия;
обильный пот;
признаки усиления
работы дыхания

Evidence-Based Guidelines for Weaning and Discontinuing Ventilatory Support

A Collective Task Force Facilitated by the American College of Chest
iratory Care, and the American
Medicine

Прекращение ИВЛ

Chest 2001;120(6)375–395

Discontinuing Mechanical Ventilatory Support*

Neil MacIntyre


Chest 2007;132;1049-1056




Discontinuing Mechanical Ventilatory Support*

Neil MacIntyre

Chest 2007;132:1049-1056




1. Адекватный газообмен
2. Стабильная гемодинамика
3. Разрешение основного заболевания
4. Спонтанная дыхательная активность



6 международная согласительная конференция по интенсивной терапии

Eur Respir J 2007; 29: 1033–1056
DOI: 10.1183/09031936.00010206
Copyright©ERS Journals Ltd 2007



TASK FORCE

Weaning from mechanical ventilation

J-M. Boles^{*}, J. Bion[#], A. Connors[¶], M. Herridge⁺, B. Marsh[§], C. Melot^f, R. Pearl^{**},
H. Silverman^{##}, M. Stanchina^{¶¶}, A. Vieillard-Baron⁺⁺, T. Welte^{§§}

Statement of the Sixth International Consensus Conference on Intensive Care Medicine

Organised jointly by the European Respiratory Society (ERS), the American Thoracic Society (ATS), the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), the Society of Critical Care Medicine (SCCM) and the Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), and approved by the ERS Executive Committee, February 2007

TABLE 3

Group/catego

Simple weaning

Patients who proceed from initiation of weaning to successful extubation on the first attempt without difficulty

Difficult weaning

Patients who fail initial weaning and require up to three SBT or as long as 7 days from the first SBT to achieve successful weaning

Prolonged weaning

Patients who fail at least three weaning attempts or require >7 days of weaning

• **Простой weaning – успешное прекращение ИВЛ без осложнений с первой попытки**

• **Сложный weaning – успешное прекращение ИВЛ потребовало 2-3 SBT или заняло до 7 дней**

• **Длительный weaning – 3 или более неуспешных попытки или длительность более 7 дней от первого SBT**

Простой weaning – 69%


**Сложный weaning
Длительный weaning**

A Prospective, Controlled Trial of a Protocol-based Strategy to Discontinue Mechanical Ventilation

Jerry A. Krishnan, Dana Moore, Carey Robeson, Cynthia S. Rand, and Henry E. Fessler

Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland

Am J Respir Crit Care Med Vol 169. pp 673–678, 2004




**Исследование
не показало
различий в
длительности ИВЛ
и эффективности
weaning между
действием
по протоколу и
без протокола**

A Prospective, Controlled Trial of a Protocol-based Strategy to Discontinue Mechanical Ventilation

Jerry A. Krishnan, Dana Moore, Carey Robeson, Cynthia S. Rand, and Henry E. Fessler

Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland

Am J Respir Crit Care Med Vol 169. pp 673–678, 2004



Почему?

Исследование не показало различий в длительности ИВЛ и эффективности weaning между действием по протоколу и без протокола

Use of weaning protocols for reducing duration of mechanical ventilation in critically ill adult patients: Cochrane systematic review and meta-analysis

Bronagh Blackwood, lecturer in nursing,¹ Fiona Alderdice, director,¹ Karen Burns, clinician scientist,² Chris Cardwell, lecturer in medical statistics,³ Gavin Lavery, consultant in intensive care medicine,⁴ Peter O'Halloran, lecturer in nursing¹

BMJ 2011; 342:c7237

**11 трайлов (исследований)
общее количество пациентов 1971**

Use of weaning protocols for reducing duration of mechanical ventilation in critically ill adult patients: Cochrane systematic review and meta-analysis

Использование протоколов привело к снижению длительности ИВЛ, weaning, пребывания в отделении ИТ

ns, clinician scientist,² Chris care medicine,⁴ Peter


2011; 342:c7237

Conclusion There is evidence of a reduction in the duration of mechanical ventilation, weaning, and stay in the intensive care unit when standardised weaning protocols are used, but there is significant heterogeneity among studies and an insufficient number of studies to investigate the source of this heterogeneity. Some studies suggest that organisational context could influence

Наше отношение к протоколам

- Мы используем алгоритм МакИнтайра
- Учитываем индивидуальные особенности пациента
- Протокол предлагает план действий, в который можно вносить поправки

1. Адекватный газообмен
2. Стабильная гемодинамика
3. Разрешение основного заболевания
4. Спонтанная дыхательная активность



Часть первая

- Определения
- Протоколы и рекомендации
- **Простой weaning**
- Сложный weaning
- Длительный weaning
- Трахеостомия и weaning
- Режимы ИВЛ и weaning

Сложности простого weaning


В общем ИТАР

- Неоправданное продление ИВЛ


В нейрореанимации

- **Недооценка утомляемости пациента**
- **Недооценка необходимости протекции дыхательных путей от аспирации**

бульбарный синдром



Оценка нарушений глотания у интубированного больного



1. Способность больного широко открыть и закрыть рот
2. Способность проглотить слюну
3. Объем движения щитовидного хряща
4. Напряжение диафрагмы рта
5. Полость рта и ротоглотки должна быть свободна от слюны
6. Объем движений языка
7. Реакция больного на интубационную трубку
8. Реакция на санацию трахеи

Часть первая

- Определения
- Протоколы и рекомендации
- Простой weaning
- **Сложный weaning**
- Длительный weaning
- Трахеостомия и weaning
- Режимы ИВЛ и weaning

Если не получилось с первой попыткой перейти на самостоятельное дыхание

- **Установить причину неудачи**
- **Повтор после устранения причины**
- **2 неудачные экстубации – показание к трахеостомии**

Реинтубация в 8 раз повышает

риск развития

нозокомиальной пневмонии

в 6-12 раз увеличивается смертность

Evidence-Based Guidelines for Weaning
and Discontinuing Ventilatory Support

Neil R MacIntyre

Chest 2001;120(6)375–395

- **повторное**
- **2 неудачные экстубации – показание к трахеостомии**

Часть первая

- Определения
- Протоколы и рекомендации
- Простой weaning
- Сложный weaning
- **Длительный weaning**
- Трахеостомия и weaning
- Режимы ИВЛ и weaning

TABLE 4 Common pathophysiologies and their incidence, which may impact on the ability to wean a patient from mechanical ventilation

Pathophysiology

Consider

Respiratory load

Респираторная перегрузка

Increased work of breathing: inappropriate ventilator settings
 Reduced compliance: pneumonia (ventilator-acquired); cardiogenic or noncardiogenic oedema; pulmonary fibrosis; pulmonary haemorrhage; diffuse pulmonary infiltrates
 Airway bronchoconstriction
 Increased resistive load
 During SBT: endotracheal tube
 Post-extubation: glottic oedema; increased airway secretions; sputum retention

Cardiac load

Сердечная перегрузка

Cardiac dysfunction prior to critical illness
 Increased cardiac workload leading to myocardial dysfunction: dynamic hyperinflation; increased metabolic demand; unresolved sepsis

Neuromuscular

Нейромышечные

Depressed central drive: metabolic alkalosis; mechanical ventilation; sedative/hypnotic medications
 Central ventilatory command: failure of the neuromuscular respiratory system
 Peripheral dysfunction: primary causes of neuromuscular weakness; CINMA

Neuropsychological

Нейропсихические

Delirium

Metabolic

Метаболические

Anxiety, depression
 Metabolic disturbances
 Role of corticosteroids
 Hyperglycaemia

Nutrition


Питание

Overweight
 Malnutrition

Anaemia Анемия

Ventilator-induced diaphragm dysfunction

Eur Respir J 2007; 29: 1033–1056





Часть первая

- Определения
- Протоколы и рекомендации
- Простой weaning
- Сложный weaning
- Длительный weaning
- Трахеостомия и **weaning**
- Режимы ИВЛ и weaning

Длительная ИВЛ – показание для трахеостомии

- Оптимальные сроки выполнения трахеостомии не определены
- При наличии показаний операция выполняется безотлагательно

Выгоды ожидаемые от трахеостомии 1

1.надёжное обеспечение проходимости дыхательных путей и защита от аспирации

2.качество санации ротоглотки

3.облегчается санация ТБД

4.комфорт пациента

5.возможно кормление через рот

Выгоды ожидаемые от трахеостомии 2

6.нет травматизации гортани

7.нет травматизации голосовых складок

8.уменьшение мертвого пространства

9.снижение сопротивления дыхательных путей

10.уменьшение работы дыхания

Выгоды ожидаемые от трахеостомии 3

11.облегчение прекращения респираторной поддержки и сокращение длительности ИВЛ


12.уменьшение числа ВАП

13.сокращение времени пребывания в ИТАР

14 сокращение времени пребывания в Л/У

15.снижение смертности

Уменьшается мертвое пространство



Внутр. диаметр(мм) тип длина(см) мертвое (мл)
пространство

Inside Tube Diameter (mm)	Type	Length (cm)	Dead Space (mL)
7.0	ETT	34.5	15
7.0	TT	12.0	5
8.5	ETT	36.5	24
8.5	TT	12.0	6

Анатомическое мертвое пространство:


общий объём : ~ 2 ml/kg BW

грудной объём : ~ 50%

внегрудной объём: ~ 50%

Мертвое пространство уменьшается !

Изменение работы дыхания (WOB)



Уменьшение работы дыхания (WOB: work of breathing)

Variable	Breathing Through Endotracheal Tube	Breathing Through Tracheostomy Tube	P
Tidal volume (mL)	329 ± 104	312 ± 119	0.47
Respiratory rate (breaths/min)	28 ± 5	26 ± 6	0.51
Minute ventilation (L/min)	9.2 ± 3.0	8.1 ± 3.1	0.26
Intrinsic PEEP (cm H ₂ O)	2.9 ± 1.7	1.6 ± 1.0	0.02
Work of breathing (J/L)	0.97 ± 0.32	0.81 ± 0.46	0.09
Work of breathing (J/min)	8.9 ± 2.9	6.6 ± 1.4	0.04

Variable	Endotracheal Tube	Extubated	Tracheostomy Tube
Tidal volume (mL)	383 ± 107	429 ± 124	378 ± 81
Respiratory rate (breaths/min)	29 ± 8	34 ± 6	28 ± 5
Minute ventilation (L/min)	11.1 ± 3.1	14.5 ± 4.2	10.6 ± 2.7
Work of breathing (J/L)	0.8 ± 0.2	1.2 ± 0.2	0.8 ± 0.2
Work of breathing (J/min)	9.0 ± 2.7	17.2 ± 2.8	8.2 ± 2.2

После трахеостомии работа дыхания уменьшается!

Часть первая

- Определения
- Протоколы и рекомендации
- Простой weaning
- Сложный weaning
- Длительный weaning
- Трахеостомия и weaning
- **Режимы ИВЛ и weaning**

Режимы ИВЛ должны соответствовать следующим требованиям

- Не угнетать спонтанного дыхания больного**
- Поддерживать адекватную вентиляцию легких и оксигенацию**
- Уменьшать нагрузку на дыхательные мышцы**
- Создавать условия для поэтапного перехода к самостоятельному дыханию**
- Быть максимально комфортными**

Режимы ИВЛ и weaning

1. SIMV
2. MMV Dräger
3. Режимы на основе двух уровней CPAP типа «BIPAP» Dräger
4. «AUTOMODE» Servo-i и Inspiration LS
5. «Adaptive support ventilation»
«ASV» на аппаратах фирмы Hamilton-medical

Названия режимов на основе двух уровней CPAP

- 1 названия, принадлежащие фирмам:
 - 1.1. «Biphasic positive airway pressure» («BIPAP») Dräger
 - 1.2 «Duo-CPAP» Hamilton Galileo, G-5
 - 1.3 «ARPV/ Biphasic» Viasys Avea
 - 1.4 «BiVENT» «Bi-vent» MAQUET Servo-s, Servo-i
 - 1.5 «Bilevel» Puritan Bennett 840
 - 1.6 «SPAP» E-Vent Inspiration LS
- 2 названия, доступные всем:
 - 2.1 «Airway pressure release ventilation» («APRV»)
 - 2.2 «Intermittent CPAP».
 - 2.3 «CPAP with release».

«Нейрохирургия — это война!»

Проф. Габбиров Г.А.



NSICU.RU

— сайт отделения реанимации НИИ им Н.Н. Бурденко



Ещё одна лекция в полном объёме!

Добавлено | Июнь 21, 2010 | Нет комментариев

Ещё один результат наших усилий уже на сайте в новом разделе «Видеолекции».

Это лекция Ивана Савина «Водно-электролитные нарушения у нейрореанимационных больных.» [Послушать и посмотреть.](#)

КАТЕГОРИИ

- › Библиотека
- › Авторефераты
- › Видеолекции
- › Доклады

ABOUT

Цель сайта: предоставить коллегам медицинскую информацию. Все материалы сайта в свободном доступе бесплатно. Если вы будете цитировать наши материалы в докладах или публикациях

**О режимах ИВЛ прочтите в нашей книге «Основы ИВЛ»
Книга в свободном доступе на сайте NSICU.RU
в формате pdf и как электронная книга**

План лекции

Часть первая

- Прекращение ИВЛ или WEANING



Часть вторая


- Деканюляция трахеи

Критерии готовности трахеостомированного пациента к деканюляции


1. Восстановление адекватного самостоятельного дыхания
2. Восстановление функции глотания
3. Отсутствие стенозов трахеи
4. Отсутствие трахеопищеводного свища
5. Окклюзионный тест























BÜSCH
I.D. 5



RUSCH
I.D. 7

nsicu.ru

Neuro
Surgical
Intensive
Care
Unit

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ НЕЙРОХИРУРГИИ им. академика Н.П. БУРДЕНКО РАМН



ТРАХЕОСТОМИЯ У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

(ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ,
МЕТОДИКА ТРАХЕОСТОМИИ, УХОД)

Издание второе, дополненное.

Пособие для врачей

