

***ШОК***

## ШОК


---

*Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна.*

*"Вот как потухает изорванный человек, - подумал я, - тут уж ничего не сделаешь..."*


*М.А. Булгаков "Записки юного врача"*

## ПРИЧИНЫ ШОКА




### УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК)

- Кровотечение,
- Обезвоживание (понос, рвота, профузный пот, ожоги).



### УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА КАПИЛЛЯРОВ

- Аллергические реакции,
- Инфекционные заболевания,
- Сильная боль,
- Повреждение нервной системы.



### РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА


Инфаркт миокарда

## **САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ШОКА ПРИ ТРАВМАХ – КРОВОПОТЕРЯ!**

---

Изолированный закрытый перелом бедра сопровождается потерей 30-40 % объема циркулирующей крови (ОЦК); перелом обеих костей голени до 25 %, также, как и перелом плеча; множественные переломы костей таза– до 60%.

## КРОВОТЕЧЕНИЕ



## ПРИЗНАКИ

---

- частый, слабый (нитевидный) пульс,
- холодные, бледные, влажные кожные покровы,
- учащенное дыхание,
- сухость во рту, жажда,
- тошнота, рвота,
- нарушение сознания.

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

---

- Прервать или по возможности уменьшить воздействие фактора, послужившей причиной шока.
- Постарайтесь обеспечить нормальную температуру тела.
- Успокойте пострадавшего, постарайтесь обеспечить ему покой.

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (продолжение)

---

- Уложите пострадавшего и приподнимите его ноги.
- Н.В. в следующих случаях не следует приподнимать ноги пострадавшего:
  - ✓ повреждения грудной клетки и затрудненное дыхание
  - ✓ повреждения головы и позвоночника,
  - ✓ повреждения живота и таза,
  - ✓ перелом бедра,
  - ✓ сердечная недостаточность и стенокардия.
- Вызовите скорую помощь.



# АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК

## ПРИЗНАКИ

---

- головная боль, ранее нарушение и потеря сознания,
- чувство жжения,
- покрасневшая, теплая кожа, высыпания, отеки,
- возбужденное либо подавленное состояние, страх смерти,
- боль и сдавление в груди,
- затрудненное шумное дыхание, нехватка воздуха,
- нитевидный пульс.

# АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

---

- По возможности прекратите воздействие вещества, являющегося причиной аллергии.
- Срочно вызовите скорую помощь.
- Обычно аллергики стараются держать при себе противоаллергические лекарства. Если пострадавший имеет при себе такие лекарства, помогите ему срочно принять их.