

ШОК


ШОК

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна.

"Вот как потухает изорванный человек, - подумал я, - тут уж ничего не сделаешь..."


М.А. Булгаков "Записки юного врача"

ПРИЧИНЫ ШОКА




УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ (ОЦК)

- Кровотечение,
- Обезвоживание (понос, рвота, профузный пот, ожоги).



УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА КАПИЛЛЯРОВ

- Аллергические реакции,
- Инфекционные заболевания,
- Сильная боль,
- Повреждение нервной системы.




РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА

Инфаркт миокарда

САМАЯ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ШОКА ПРИ ТРАВМАХ – КРОВОПОТЕРЯ!

Изолированный закрытый перелом бедра сопровождается потерей 30-40 % объема циркулирующей крови (ОЦК); перелом обеих костей голени до 25 %, также, как и перелом плеча; множественные переломы костей таза– до 60%.

КРОВОТЕЧЕНИЕ



ПРИЗНАКИ

- частый, слабый (нитевидный) пульс,
- холодные, бледные, влажные кожные покровы,
- учащенное дыхание,
- сухость во рту, жажда,
- тошнота, рвота,
- нарушение сознания.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- Прервать или по возможности уменьшить воздействие фактора, послужившей причиной шока.
- Постарайтесь обеспечить нормальную температуру тела.
- Успокойте пострадавшего, постарайтесь обеспечить ему покой.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (продолжение)

- Уложите пострадавшего и приподнимите его ноги.
- Н.В. в следующих случаях не следует приподнимать ноги пострадавшего:
 - ✓ повреждения грудной клетки и затрудненное дыхание
 - ✓ повреждения головы и позвоночника,
 - ✓ повреждения живота и таза,
 - ✓ перелом бедра,
 - ✓ сердечная недостаточность и стенокардия.
- Вызовите скорую помощь.

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК

ПРИЗНАКИ

- головная боль, ранее нарушение и потеря сознания,
- чувство жжения,
- покрасневшая, теплая кожа, высыпания, отеки,
- возбужденное либо подавленное состояние, страх смерти,
- боль и сдавление в груди,
- затрудненное шумное дыхание, нехватка воздуха,
- нитевидный пульс.

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- По возможности прекратите воздействие вещества, являющегося причиной аллергии.
- Срочно вызовите скорую помощь.
- Обычно аллергики стараются держать при себе противоаллергические лекарства. Если пострадавший имеет при себе такие лекарства, помогите ему срочно принять их.