



Лекция

# Рак легкого

Лектор: Напольских В. М.

# Эпидемиология

- С 1985 года рак легкого – главный онкологический киллер!
- По данным МАИР в 2002 году в мире зарегистрировано 1 350 000 новых случаев рака легкого, т. е. 12,4% от всех форм рака.
- Показатели мировой заболеваемости РЛ с 1985 года увеличился для мужчин на 51% и для женщин – на 75%
- В 2002 году в мире умерло 1 180 000 больных раком легкого или 17,6% от всех онкологических смертей у обоих полов.
- Соотношение умерших от рака легкого ко вновь зарегистрированным заболевшим составляет 0.87

# Эпидемиология

- Рак легкого занимает первое место в структуре злокачественных опухолей
- Заболеваемость раком легкого возросла за последние 20 лет в 2 раза (в России составляет 34.1 на 100000 населения)
- Мужчины болеют раком легкого в 6 раз чаще женщин
- В начале XXI века рак легкого остается одной из основных причин смерти онкологических больных в мире.

# Эпидемиология

- В США в 2005 году было зарегистрировано 172 570 больных РЛ, что составляет 12,6% от всех онкологических заболеваний умрет 163510 больных, т. е. 29,1% от всех ЗНО
- 5-летняя выживаемость в течение 25 лет остается на уровне 15%
- Только 16% больных регистрируется в ранней стадии
- Заболеваемость РЛ наивысшая у мужчин в Восточных странах – 65,7 на 100000, в Южной Европе – 56,9, в Западной – 50,9, в Северной Европе – 44,3 на 100000
- В 2000 году заболеваемость РЛ в Европе варьирует у мужчин от 95,4 в Венгрии до 21,4 до 21,4 в Швеции, у женщин от 27,7 в Дании до 4,0 на 100000 в Испании
- В странах Северной и Западной Европы заболеваемость РЛ у мужчин снизилась в связи с массовым отказом их от курения. Особенно это заметно в Великобритании, Финляндии, Норвегии. Швеции.
- У женщин по РЛ на первом месте Дания

# Эпидемиология

- По смертности от РЛ мужчин список возглавляют Венгрия и Польша, у женщин – Дания.
- По данным 20 Европейских регистров в 1990-1994 гг. в первый год после установления диагноза РЛ в живых оставались 31,4%, через 5 лет – 9,7% (мужчины).
- В России РЛ стоит на 1 месте среди всех опухолей у лиц обоего пола. В 2003 году зарегистрировано 58812 больных. У мужчин РЛ составляет 22,8% от всех вновь выявленных ЗНО, у женщин – 4%. По показателям заболеваемости РЛ в 2002 г. среди европейских стран Россия занимала 3-е место среди мужчин, и 17 среди женщин

# ЭТИОЛОГИЯ

## I. Генетические факторы риска:

1. Первичная множественность опухолей (лечение ранее по поводу злокачественной опухоли).
2. Три и более наблюдений рака легкого в семье (ближайших родственников).

## II. Модифицирующие факторы риска

### A. Экзогенные:

1. Курение.
2. Загрязнение окружающей среды канцерогенами.
3. Профессиональные вредности.
4. Ионизирующее излучение.

### Б. Эндогенные:

1. Возраст старше 45 лет.
2. Хронические легочные заболевания (пневмония, туберкулез, бронхит, локализованный пневмофиброз и др.).

# Этиология. Курение

- Только 15 % РЛ не имеют отношения к экспозиции табака на слизистую бронхов
- У некурильщиков практически не возникает плоскоклеточный и мелкоклеточный рак
- Риск РЛ зависит от числа ежедневно выкуриваемых сигарет, продолжительности курения, от стажа, от типа сигарет.
- Кумулятивный риск смерти от РЛ у курящих мужчин в 22 раза выше, у женщин – в 12 раз выше, чем у некурящих
- Риск смерти от РЛ на 30% выше у женщин, живущих с курящими мужчинами
- Если после 10 лет курения человек бросает курить, риск РЛ у него уменьшается на 50%
- Курение сигар или трубки – в 2 раза повышает риск развития РЛ
- 85% РЛ у мужчин и 47% РЛ у женщин – последствия курения

# Этиология. Прочие факторы

- Экспозиция асбеста от 1 до 5% РЛ, у некурящих рабочих риск РЛ в 3 раза выше чем у неработающих курящих, а у курящих, связанных с асбестом риск возрастает в 90 раз
- МАИР среди химических веществ, имеющих связь с РЛ называют радон, мышьяк, хром, никель, бериллий
- Хронические обструктивные болезни легких на 13% повышают риск РЛ у некурящих и на 16% у курящих



# Патогенез

Воздействие факторов риска на эпителий бронхов

нарушение мукоцилиарного клиренса

воздействие канцерогенов на ткань респираторного тракта

десквамация эпителия

патологическая регенерация

метаплазия

дисплазия

плоскоклеточный рак

аденокарцинома

# Клинико-анатомическая классификация

- **Центральный рак легкого**  
(возникает в крупных бронхах -  
главный, долевой, промежуточный,  
сегментарный)
- **Периферический рак легкого**  
(возникает в субсегментарных бронхах и  
их ветвях или локализующийся в  
паренхиме легкого)

# Классификация рака легкого по Савицкому А. И. (1957 г.)

## 1. Центральный рак:

- а) эндобронхиальный (эндофитный и экзофитный)
- б) перибронхиальный узловой;
- в) перибронхиальный разветвленный.

## 2. Периферический рак:

- а) круглая опухоль;
- б) пневмониеподобный;
- в) верхушки легкого (Пенкоста);

## 3. Атипичные формы, связанные с особенностями метастазирования:

- а) медиастинальная;
- б) милиарный карциноматоз;
- в) мозговая;
- г) костная;
- д) печеночная.

# Патогистологическая классификация

РЛ возникает из мультипотентных стволовых клеток бронхиального эпителия

I. Плоскоклеточный рак (возникает в проксимальных сегментарных бронхах):

- а) высокодифференцированный рак;
- б) умеренно дифференцированный рак (без ороговения);
- в) малодифференцированный рак.

II. Мелкоклеточный рак (возникает в центральных крупных воздухопроводящих бронхах):

- а) овсяноклеточный рак;
- б) промежуточно-клеточный рак.

III. Аденокарцинома (возникает в периферических бронхах):

- а) высокодифференцированная аденокарцинома (ацинарная, папиллярная);
- б) умеренно-дифференцированная аденокарцинома (железисто-солидная);
- в) малодифференцированная аденокарцинома (солидный слизеобразующий рак);
- г) бронхиолоальвеолярная аденокарцинома ("аденоматоз").

IV. Крупноклеточный рак:

- а) гигантоклеточный рак;
- б) светлоклеточный рак.

V. Смешанный рак

# РЛ

(из-за различных и общих подходов к лечению)

Мелкоклеточный



Овсяноклеточный



Веретеноклеточный



- Крупноклеточный

Немелкоклеточный

- Аденокарцинома

- Плоскоклеточный

- Полигонально-клеточный


# НМРЛ

- На долю аденокарциномы приходится 40% РЛ. Встречается у некурящих женщин. Особый вид – бронхиолоальвеолярный рак, больные им эффективнее других отвечают на терапию таргетными препаратами – гефитиниб, эрлотиниб
- Плоскоклеточный рак встречается у 30% больных. Локализация – центральная зона легких






# МРЛ

- Встречается у 15% больных РЛ, опухоль имеет центральное или хилюсное происхождение в 95%, 5% - периферическое. 98% больных МРЛ - курильщики

Анатомические области: 1. главный бронх (С34.0) 2. верхняя доля (С34.1) 3. средняя доля (С34.2) 4. нижняя доля (С34.3)







# Клиника рака легкого

- ✓ Симптомы, вызванные интраторакальным распространением опухоли
- ✓ Симптомы, вызванные внеторакальным распространением опухоли
- ✓ Паранеопластические синдромы

(Для раннего РЛ нет специфических симптомов, 15% РЛ вообще бессимптомно)

# Симптомы, вызванные внутриторакальным распространением опухоли

- Центральный рак легкого:
  - ✓ Кашель (80-90%)
  - ✓ Кровохарканье (50%)
  - ✓ Повышение температуры тела и одышка (ателектаз и гиповентиляция)
  - ✓ Лихорадка и продуктивный кашель (параканкротный пневмонит)
- Периферический рак легкого:
  - ✓ Боль в груди (60-65%)
  - ✓ Кашель
  - ✓ Одышка (30-40%)
  - ✓ Клиника абсцесса легкого (при распаде опухоли)

# Симптомы, вызванные внеторакальным распространением опухоли

- ✓ Поражение печени
- ✓ Поражение надпочечников
- ✓ Поражение костей
- ✓ Поражение внеторакальных лимфоузлов (парааортальные, надключичные, передние шейные)
- ✓ Внутричерепные метастазы


# Принципы диагностики рака легкого

- Методы первичной диагностики (рекомендованные для всех пациентов):
  - ✓ Полное клиническое обследование
  - ✓ Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
  - ✓ Бронхологическое исследование (в случае центрального рака)
  - ✓ Трансторакальная пункция опухоли (в случае периферического рака)
  - ✓ Патоморфологическое подтверждение злокачественности


# Принципы диагностики рака легкого

- Уточняющие методы диагностики (рекомендованные для пациентов, которым необходимо хирургическое или лучевое лечение):
  - ✓ Компьютерная томография органов грудной клетки (точность метода 70% и более) и надпочечников
  - ✓ Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и грудной клетки
  - ✓ Сканирование костей скелета
  - ✓ Рентгенография костей скелета
  - ✓ Компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга
  - ✓ Функциональное исследование легких и сердца
  - ✓ Медиастиноскопия, медиастинотомия, торакоскопия, торакотомия

# Алгоритм обследования больного раком легкого




# Гематогенное метастазирование (милиарный канцероматоз)






# Ателектаз средней доли на фоне контрастированного пищевода



Центральный рак нижней доли правого  
легкого (S6), перибронхиально-узловая  
форма




# Периферический рак нижней доли левого легкого



# Экзофитная опухоль в просвете промежуточного бронха



# Инфильтративный рост опухоли правого главного бронха



# Лечение рака легкого

- Мелкоклеточный рак легкого
  - ✓ Химиотерапия
- Немелкоклеточный рак легкого
  - ✓ Хирургическое лечение
  - ✓ Лучевое лечение
  - ✓ Химиотерапия
  - ✓ Комбинированное лечение

## Объем оперативного вмешательства:

- **сегментэктомия**
- **лобэктомия**
- **лобэктомия верхняя с циркулярной резекцией бронхов**
- **билобэктомия верхняя, нижняя (правое легкое)**
- **пневмонэктомия**

## Варианты оперативного вмешательства:

- **типичная (стандартная) операция**
- **расширенная операция:**
  - **расширенная по принципиальным соображениям**
  - **вынужденно расширенная операция**
- **комбинированные операции**
- **расширенно-комбинированные операции**



# Лучевая терапия НМРЛ

**Лучевая терапия при НМРЛ  
может носить радикальный и  
паллиативный характер**

**Лучевая терапия по радикальной программе (суммарная очаговая доза 60-79 Гр.) показана больным НМРЛ I-IIIА стадии, которые отказались от операции или которым хирургическое лечение противопоказано (возраст, общее состояние, сопутствующая патология)**

**Лучевая терапия по паллиативной программе (суммарная очаговая доза не более 40Гр.) проводится при местно нерезектабельном НМРЛ с целью облегчения тягостных клинических проявлений опухоли**

**При выраженной регрессии опухоли в процессе лучевой терапии и удовлетворительном общем состоянии больного план лечения может быть изменен и лучевая терапия может быть проведена по радикальной программе.**

# Противопоказанием к лучевой терапии являются:

- деструкция в первичной опухоли или ателектаз с образованием полостей распада
- обильное кровотечение
- злокачественный выпот в плевральной полости
- недавно (до 6 месяцев) перенесенный инфаркт миокарда
- активный туберкулез легких
- тяжелое общее состояние пациента

# Сочетанная лучевая терапия

- Включает в себя дистанционное облучение и эндобронхиальную лучевую терапию.

# Режимы облучения при ЭБЛТ

- По 5 Гр через день, 3 раза в неделю СОД 25-30 Гр;
- По 7-10 Гр 1 раз в неделю СОД 28-40 Гр

Дистанционное облучение проводят в различных режимах до СОД 40-60 Гр. Интервал между компонентами сочетанного лучевого лечения в среднем составляет 10-20 дней.

## **Лучевая терапия по радикальной программе:**

- классическое фракционирование СОД - 70Гр x 35дн.
- динамическое фракционирование СОД - 70Гр x 30дн.
- суперфракционирование СОД - 46,8Гр x 13дн.
- сочетанная лучевая терапия СОД - 60-80Гр x 34дн

## **Лучевая терапия по паллиативной программе:**

- классическое фракционирование - 40Гр x 20дн
- динамическое фракционирование - 40Гр x 17дн
- укрупненное фракционирование - 40Гр x 10дн



## **Предоперационная лучевая терапия:**

- классическое фракционирование - 30Гр x 15дн
- динамическое фракционирование - 30Гр x 12дн
- укрупненное фракционирование - 20Гр x 5дн
- сочетанная лучевая терапия - 30-40Гр x 17дн

## **Послеоперационная лучевая терапия (после радикальной операции):**

- классическое фракционирование - 46Гр x 23 дн
- динамическое фракционирование - 30Гр x 12дн
- суперфракционирование - 46,8Гр x13дн

# Химиотерапия НМРЛ

# Химиотерапия рака легкого

- Препараты:
- ✓ Винорельбин
- ✓ Гемцитабин
- ✓ Цисплатин
- ✓ Карбоплатин
- ✓ Паклитаксел
- ✓ Этопозид
- ✓ Циклофосфамид
- ✓ Доксорубицин
- ✓ Митомицин
- ✓ Ифосфамид
- ✓ винбластин

**В настоящее время стандартной химиотерапией I линии при НМРЛ III-IV стадии являются комбинации:**

- **таксол + карбоплатин**
- **таксол + цисплатин**
- **таксотер + цисплатин**
- **навельбин + цисплатин**
- **гемзар + цисплатин**

**Применение этих режимов позволяет получить общий эффект у 40-60% больных, при однолетней выживаемости 31-50% больных.**

# Цели неоадьювантной химиотерапии

- уменьшение размеров первичной опухоли
- воздействие на микрометастазы
- повышение абластичности операции и резектабельности опухоли

# Особенности неоадьювантной химиотерапии

1. Курсы лечения должны быть короткими, с небольшими интервалами. Оптимально проведение 2 курсов, но не более 3-4
2. Режимы лечения не должны обладать выраженной токсичностью, чтобы не препятствовать выполнению хирургической операции
3. Соотношение эффективность/токсичность, используемых режимов лечения должно быть оптимальным.

# Таргетная терапия НМРЛ

- Таргетные препараты действуют на:
  - ✉ Угнетение ферментов, участвующих в синтезе ДНК, РНК
  - ✉ Пути передачи и механизмы трансдукции сигналов
  - ✉ Ангиогенез
  - ✉ Экспрессия генов
  - ✉ Апоптоз

# Таргетная терапия НМРЛ

- Мишенью препаратов является рецептор эпидермального фактора роста. Он экспрессируется при НМРЛ (плоскоклеточный в 84%, железистый – 68%) и вовлечен в сигнальный каскад, ведущий к клеточной пролиферации ангиогенезу, инвазии, метастазированию, остановку апоптоза.
- Таргетные препараты в комбинации с химиотерапией дают объективный положительный эффект по сравнению с химиотерапией.
- Препараты: алимта, иресса, эрлотиниб, панитумумаб



# Общие принципы современной тактики лечения больных МРЛ

- **при резектабельных опухолях (T1-2 N1 M0) возможна операция с последующей послеоперационной комбинированной химиотерапией (4 курса)**
- **целесообразность использования индукционной химио- и химиолучевой терапии с последующей операцией продолжает изучаться, однако убедительных доказательств преимуществ такого подхода пока не получено**

- при нерезектабельных опухолях (локализованная форма) показана комбинированная химиотерапия (4-6 циклов) в сочетании с облучением области опухоли легкого и средостения. В случае достижения полной клинической ремиссии – профилактическое облучение головного мозга (25-30 Гр).
- при наличии отдаленных метастазов (распространенная форма МРЛ) - показана комбинированная химиотерапия, лучевая терапия проводится по специальным показаниям (метастазы в головной мозг, в кости, в надпочечники)

- **в настоящее время убедительно доказана возможность излечения около 30% больных МРЛ в ранних стадиях заболевания и 5-10% больных с нерезектабельными опухолями.**
- **то обстоятельство, что в последние годы появилась целая группа новых противоопухолевых препаратов, активных при МРЛ, позволяет надеяться на дальнейшее усовершенствование терапевтических режимов и соответственно улучшение результатов лечения**

Современное стандартное  
лечение больных раком  
легкого в зависимости от  
стадии заболевания

- Оккультный рак легкого (TxN0M0) – динамическое наблюдение
- Стадия 0 (TisN0M0):
  - ✓ резекция (сегментэктомия или клиновидная резекция) с максимальным сохранением легочной ткани
  - ✓ эндобронхиальная лучевая терапия (опухоли менее 1 см)

- Стадия IV (T1N0M0, T2N0M0):

- ✓ Лобэктомия

Альтернатива:

- ✓ радикальная лучевая терапия (не менее 60 Гр)

- ✓ эндобронхиальная лучевая терапия

- Стадия II A, B (T1N1M0, T2N1M0, T3N0M0):

- ✓ лобэктомия, пульмонэктомия

Альтернатива:

- ✓ радикальная лучевая терапия



- Стадия III A (T3N1M0, T1-3N2M0):
- ✓ неоадьювантная химиотерапия (с включением препаратов платины) + хирургическое лечение
- ✓ лучевая терапия + хирургическое лечение
- ✓ химиолучевая терапия + хирургическое лечение
- ✓ хирургическое лечение + лучевая терапия

### Альтернатива:

- ✓ радикальная лучевая терапия
- ✓ химиолучевая терапия
- ✓ химиотерапия в самостоятельном варианте

- Стадия III В (Т-любая N3M0, T4N-любая M0):

В связи с возможной различной хирургической тактикой выделяют:

- ✓ T4a – прорастание трахеи, карины, верхней поллой вены, левого предсердия (потенциально резектабельные поражения)
- ✓ T4b – диффузное поражение средостения, поражение миокарда, прорастание позвонка, пищевода, злокачественный плевральный выпот (хирургия не показана)

- Стадия IV (Т любая N любая M1):
  - ✓ химиолучевая терапия
  - ✓ паллиативная полихимиотерапия
  - ✓ симптоматическое лечение

# Прогноз при раке легкого

## 5-летняя выживаемость

I стадия – 65 %

II стадия – 40%

III A стадия – 19%

III B стадия – 5%

IV стадия – 2%

# Скрининг РЛ

- РЛ диагностируется у большинства на поздних стадиях, лишь диагностика в I стадии позволяет 50-80% больных пережить 5 лет
- Ежегодная или 1 раз в 4 месяца рентгенография легких
- Спиральная компьютерная томография – выявляется от 0.44% до 2.7% РЛ, причем 74-78% в I стадии
- Изучается значение ПЭТ и флюоресцентной бронхоскопии

# Профилактика рака легкого

- **Первичной, или гигиенической, профилактикой** является система медицинских и государственных мероприятий, направленных на прекращение или резкое уменьшение воздействия на организм веществ и факторов, признаваемых в настоящее время канцерогенными (борьба с загрязнением вдыхаемого воздуха, курением).
- **Вторичной, или клинической, профилактикой** называется специально организованная система выявления и лечения предопухолевых заболеваний (ежегодная флюорография, наблюдение и лечение у специалистов).

# Профилактика рака легкого

- борьба с курением
- снижение содержания смол в сигаретах до установленных МАИР пределов
- борьба за чистоту атмосферного воздуха
- устранение или максимальное уменьшение влияния на производстве профессиональных вредностей
- оздоровление лиц с хроническими заболеваниями бронхов и легких
- рациональное питание с регулярным потреблением продуктов, богатых витамином А и каротиноидами
- проведение скрининга в группе повышенного риска по раку легкого с помощью крупнокадровой флюорографии

«В начале болезнь трудно  
распознать, но легко излечить,  
если же она запущена, то ее  
легко распознать, но излечить  
трудно.»

Н. Маккиавели, 1513г.



# Резюме теории возникновения рака

- Ген-супрессор (при мутации – потеря контроля) ↓
- Протоонкоген (постоянно мутирует, что обеспечивает адаптацию)

Размножение опухолевых клеток

↓  
Неоангиогенез и метастазирование

↓  
Иммунологический паралич

↓                      ↓                      ↓  
Организм гибнет    Организм выживает, при  
наличии помощи (лечения)

Оперативное    Лучевое    Химиотерапия



- Таким образом, рак – это полиэтиологическое заболевание, где многочисленные факторы внешней среды накладываются на генетически детерминированную предрасположенность, в результате чего возникают злокачественные новообразования.
- Современные эпидемиологи утверждают, что до 90 % опухолей вызывается внешними причинами:
  1. На 1 больного раком пищевода в Нигерии приходится 300 больных в Иране
  2. На 1 больного раком полового члена в Израиле приходится 300 больных в Уганде
  3. На 1 больного раком кожи индуса приходится 200 больных в Австралии

# Первичная профилактика рака

- **Рекомендации по питанию: (35 %)**
  - ✓ Потребление свежих овощей, фруктов и грубоволокнистой клетчатки
  - ✓ Ограничение потребления соли и консервантов
  - ✓ Ограничение алкоголя
  - ✓ Избегать пищевых добавок
  - ✓ Рациональный пищевой рацион для сохранения нормальной массы тела
  - ✓ Ограничение жиров до 30% от общей энергетической ценности пищи

# Первичная профилактика рака

- Отказ от курения (30 %)
- Профилактика и лечение хронических воспалительных, инфекционных, вирусных и паразитарных заболеваний
- Ограничение контакта с канцерогенами (в т. ч. контроль профессиональных факторов )
- Нормализация репродуктивной функции
- Ограничение инсоляции
- Ограничение ионизирующего излучения

# Вторичная профилактика рака

Диагностика и лечение предраковых заболеваний,  
а также ранняя диагностика рака

Действующие в мире программы скрининга:

1. Прямая кишка – геомультиест
2. Желудок (Япония) – флюорография
3. Легкие – флюорография
4. Молочная железа – самообследование (по данным ВОЗ может уменьшить смертность на 20 %), маммография (в 4 раза информативнее, чем пальпация, выявляет опухоли до 3-4 мм)

# Скрининг

Скрининг – выявление опухолей среди практически здорового населения («просеивание»). Перспективное, но дорогое, требующее значительных денежных затрат, именно поэтому зачастую недоступные большинству государств.

Общие требования к скринингу опухолей любых локализаций:

- Недорогой
- Безопасный
- Легко проводимый
- Приемлемый для испытуемых и испытателей
- Высокочувствительный (мало ложноотрицательных ответов)
- Специфичный (мало ложноположительных ответов)

- Скрининг за счет диагностики предрака и последующего лечения его потенциально может уменьшить заболеваемость (и запущенность, конечно). А снижение заболеваемости приводит к уменьшению смертности.
- Скрининг проводится:
  - У групп повышенного риска
  - У формально здоровых

# Таргетная терапия

В результате достижения молекулярной онкологии, вошедшей в 21 век с достаточно четкими представлениями о патогенезе опухоли, возникла и активно развивается весьма перспективная, так называемая таргетная терапия опухолей. Ранее существовавший эмпирический подход (чаще случайный подбор лекарств) замещается научно-обоснованным, молекулярно-направленным поиском специфических противораковых средств, направленных на активацию или инактивацию биохимических компонентов опухолевой трансформации. Это таргетные препараты. Их действие направлено на:

- Угнетение ферментов, участвующих в синтезе РНК и ДНК
- Пути передачи и механизмы трансдукции сигналов
- Ангиогенез
- Экспрессия генов
- Апоптоз

Таргетные препараты в комбинации с химиотерапией дают объективный положительный эффект, а поиск новых средств внушает большой оптимизм. Известно уже множество подобных препаратов, действующих на различные звенья патогенеза. Это уже активно применяемые герцептин, мабтера, гливек, алипта, иресса, моноклональные антитела – авастин, сутент.



# Фотодинамическая терапия

- ФДТ – многообещающая методика лечения злокачественных и других новообразований. Суть ее состоит в том, что в организм вводится фотосенсибилизатор (ФС) с последующим облучением ткани светом в видимом спектральном диапазоне (400-700 нм). При этом происходит возбуждение молекул ФС и молекулярных энергетических переносов, что приводит к высвобождению синглетного кислорода и других высокореактивных цитотоксических веществ, вызывающих гибель клетки. Обычно ФС захватываются злокачественными или диспластическими клетками. При сочетании этих условий (тропности ФС к злокачественной ткани и селективной доставке света к опухоли) обеспечивается эффективность противоопухолевой терапии с минимальным повреждением здоровых тканей