Имодиум®

НИЧТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ ДИАРЕЮ БЫСТРЕЕ*

*По результатам исследования Johnson & Johnson Consumer LTD, Великобритания 2008 год

Диарея

Диарея - учащенное (как правило, более 3х раз в сутки) опорожнение кишечника с выделением жидких или кашицеобразных испражнений.

Отличительным признаком диареи следует считать более высокое, чем в норме, **содержание воды** в кале, возрастающее с 60-75% (в случаях твердого или оформленного кала) до **85-95**%*.

*В.Х. Василенко, В.Т. Ивашкин, А.А. Шептулин, Е.К. Баранская, М.И. Секачева. Методическое пособие для врачей «Рекомендации по обследованию и лечению больных с синдромом острой диареи», Москва, 2002 г.

Чего больше всего хочет пациент с диареей?

БЫСТРО ОСТАНОВИТЬ ДИАРЕЮ!!!

Имодиум® - оригинальный препарат

- Более 35 лет успешного применения
- Помогает людям более чем в 70 странах мира
- Более чем 2 миллиарда человек на всех пяти континентах
- Во многих странах *Imodium*® – №1 среди всех антидиарейных безрецептурных препаратов

История препарата

Диарея- это..



Опасны последствия :

•обезвоживание

•Потеря электролитов микроэлементов.

Хроническая диарея часто вызывает витаминную недостаточность и водно-электролитный дисбаланс, что может повлечь за собой другое заболевание, такое как анемия.

Имодиум® действует на ключевые механизмы диареи

1. Нормализует перистальтику

2. Уменьшает секрецию жидкости в просвет кишечника



3. Нормализует обратное всасывание воды и солей из кишечника

4. Усиливает тонус анального сфинктера

ИМОДИУМ® ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ РИТМ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА И БЫСТРО ОСТАНАВЛИВАЕТ ДИАРЕЮ

Видео – механизм действия Имодиум

Имодиум® подходит для частого применения

*Я знаю, что Имодиум® - **эффективное** средство, но могу ли я использовать Имодиум® **часто?***

*Имодиум® нормализует работу кишечника, восстанавливая его **естественный ритм.** Поэтому Имодиум® подходит и для **частого** применения.*

Фармакокинетика

- Действует только в кишечнике
- Начинает действовать очень быстро, с первой дозы

В 80% случаев эффект достигается уже после первого приема препарата

- Максимум действия достигает через 4-6 часов
- Не накапливается, период полувыведения 9-14 часов

Не проникает через ГЭБ и не воздействует на ЦНС

* *Loperamide And Loperamide-Simethicone Professional Product Information. © Copyright 2008 by McNeil Consumer Healthcare. Pp. 8-9*
McNeil Study Report 15-003. An Open Label, Randomized, Crossover Study to Evaluate the Bioequivalence of a New Chewable Tablet of Loperamide Taken With and Without Water to Imodium® A-D Caplets. Fort Washington, PA: McNeil Consumer & Specialty Pharmaceuticals; 2006.
McNeil Study Report 15-001. Determination of Bioequivalence of Loperamide From a New Formulation of Imodium® A-D Liquid vs Currently Marketed Imodium® A-D Liquid. Fort Washington, PA: McNeil Consumer & Specialty Pharmaceuticals; 2004.

Алгоритм действий при острой диарее

При обследовании больных, в первую очередь, обращают внимание на наличие или отсутствие «красных флажков» :

- высокая лихорадка (свыше 38,50С),
- стул с кровью
- тяжелая рвота
- признаки обезвоживания.

Консультация врача!

При отсутствии указанных симптомов больным проводится Симптоматическая терапия, кот. включает:

- регидратационная терапия,
- диетические мероприятия,
- **применение антидиарейных лекарственных препаратов.**

*В.Х. Василенко, В.Т. Ивашкин, А.А. Шептулин, Е.К. Баранская, М.И. Секачева. Методическое пособие для врачей «Рекомендации по обследованию и лечению больных с синдромом острой диареи», Москва 2002 г.

Таблетки для рассасывания Имодиум® растворяются в 50 раз быстрее, чем капсулы

Время растворения:
2 минуты (120 секунд)

Время растворения:
2-3 секунды

По результатам исследований: «Европейский журнал фармацевтических наук 34 (2008) 243-249», К. Питерс, Р. Де Маесщалк и др. Анализ на растворение по месту при использовании потенциометрических сенсоров, 2008; «Инновации в фармацевтике сегодня 2010,2(1),81-88», Б.Судхур, Дж. Винэй и др. Таблетки для рассасывания: Обзор, 2010.

Видео – таблетки для рассасывания Имодиум

Имодиум® таблетки для рассасывания

- Моментально (в течение 2–3 секунд) растворяются на языке
- Не требуют запивания водой
- Возможно применение у больных с затрудненным глотанием и повышенным рвотным рефлексом
- Имеют приятный мятный вкус

Основное сообщение

<u>Каждый эпизод диареи нужно лечить</u>

1. Большинство плохих бактерий выходят с первым жидким стулом
2. С каждым последующим жидким стулом организм теряет полезные вещества и жидкость
3. Имодиум помогает сохранить полезные вещества и жидкость

Дополнительная информация

Как Имодиум® помогает бороться с инфекцией

- Большинство микробов выводятся с первым жидким стулом
- Замедление перистальтики уменьшает распространение инфекции по кишечнику, а значит
- Уменьшаются потери иммуноглобулинов с жидким стулом[1] и
- Увеличивается время контакта иммуноглобулинов с микробами и вирусами

Эффективное подавление инфекции в кишечнике, быстрая остановка диареи

1 Effect of changing transit time on colonic microbial metabolism in man. Stephen A., Wiggins HS., Cummings JH. Gut, 1987, 28, pp.601-609.

Схема дозирования таблеток для рассасывания Имодиум®

	Острая диарея	Хроническая диарея	Максимальная суточная доза
Взрослые	Начальная доза — 2 таб.	Начальная доза — 2 таб. в сутки	8 таб.
Дети старше 6 лет	Начальная доза — 1 таб.	Начальная доза — 1 таб. в сутки	3 таб. на 20 кг веса, но не более 8 таб.
Общие рекомендации	1 таб. после каждого жидкого стула	Для частоты стула 1–2 раза в сутки поддерживающая доза от 1 до 6 таб. в сутки	При нормализации стула или при его отсутствии более 12 часов препарат отменяют

Противопоказания

- Острая дизентерия и другие инфекции ЖКТ (вызванные, в том числе Salmonella, Shigella and Campylobacter)
- Кишечная непроходимость, дивертикулез, острый язвенный колит, псевдомембранозный колит, вызванный антибиотиками широкого спектра действия
- Первый триместр беременности
- Период лактации
- Детский возраст (до 6 лет) - Имодиум®(таблетки для рассасывания)
- Детский возраст (до 12 лет) - только Имодиум® Плюс (таблетки жевательные)
- Повышенная чувствительность к лоперамиду и/или другим компонентам препарата

С осторожностью

- При печеночной недостаточности

Во время беременности применение возможно только, если оно оправдано ожидаемой терапевтической пользой (только 2 и 3 триместр)

Побочные эффекты

- Аллергические реакции
- Утомляемость, головная боль, сонливость или бессонница, головокружение
- Сухость во рту, снижение содержания электролитов
- Тошнота, рвота, дискомфорт или боль в нижней части живота
- Метеоризм, запор, мегаколон
- Крайне редко – кишечная непроходимость, задержка мочи