Имодиум®

НИЧТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ ДИАРЕЮ БЫСТРЕЕ*

Диарея

Диарея - учащенное (как правило, более 3х раз в сутки) опорожнение кишечника с выделением жидких или кашицеобразных испражнений.

Отличительным признаком диареи следует считать более высокое, чем в норме, **содержание воды** в кале, возрастающее с 60-75% (в случаях твердого или оформленного кала) до **85-95**%*.

Чего больше всего хочет пациент с диареей?



БЫСТРО ОСТАНОВИТЬ ДИАРЕЮ!!!


Имодиум[®] - оригинальный препарат

- Более 35 лет успешного применения
- Помогает людям более чем в 70 странах мира
- Более чем 2 миллиарда человек на всех пяти континентах
- Во многих странах Imodium[®] №1 среди всех антидиарейных безрецептурных препаратов



История препарата

Диарея- это..




Опасны последствия:

- •обезвоживание
- •Потеря электролитов микроэлементов.

Хроническая диарея часто вызывает витаминную недостаточность и водно-электролитный дисбаланс, что может повлечь за собой другое заболевание, такое как анемия.

Имодиум[®] действует на ключевые механизмы диареи



ИМОДИУМ® ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ РИТМ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА И БЫСТРО ОСТАНАВЛИВАЕТ ДИАРЕЮ

Видео – механизм действия Имодиум

Имодиум[®] подходит для частого применения

Я знаю, что Имодиум° эффективное средство, но могу
ли я использовать Имодиум°
часто?



Имодиум® нормализует работу кишечника, восстанавливая его естественный ритм. Поэтому Имодиум® подходит и для частого применения.



Фармакокинетика

- Действует только в кишечнике
- Начинает действовать очень быстро, с первой дозы

В 80% случаев эффект достигается уже после первого приема препарата

- Максимум действия достигает через 4-6 часов
- Не накапливается, период полувыведения 9-14 часов

Не проникает через ГЭБ и не воздействует на ЦНС

McNeil Study Report 15-001. Determination of Bioequivalence of Loperamide From a New Formulation of Imodium® A-D Liquid vs Currently Marketed Imodium® A-D Liquid. Fort Washington, PA: McNeil Consumer & Specialty Pharmaceuticals; 2004.

^{*} Loperamide And Loperamide-Simethicone Professional Product Information. © Copyright 2008 by McNeil Consumer Healthcare. Pp. 8-9

McNeil Study Report 15-003. An Open Label, Randomized, Crossover Study to Evaluate the Bioequivalence of a New Chewable Tablet of Loperamide Taken With and Without Water to Imodium® A-D Caplets. Fort Washington, PA: McNeil Consumer & Specialty Pharmaceuticals; 2006.

Алгоритм действий при острой диарее



При обследовании больных, в первую очередь, обращают внимание на наличие или отсутствие

«красных флажков»:

- •высокая лихорадка (свыше 38,50С),
- •стул с кровью
- •тяжелая рвота
- •признаки обезвоживания.

Консультация врача!


При отсутствии указанных симптомов больным проводится Симптоматическая терапия, кот. включает:

- •регидратационная терапия,
- •диетические мероприятия,
- •применение антидиарейных лекарственных препаратов.

Таблетки для рассасывания Имодиум[®] растворяются в 50 раз быстрее, чем капсулы











Видео – таблетки для рассасывания Имодиум

Имодиум° таблетки для рассасывания





Моментально (в течение 2-3 секунд) растворяются на языке



Не требуют запивания водой



Возможно применение у больных с затрудненным глотанием и повышенным рвотным рефлексом



Имеют приятный мятный вкус

Основное сообщение

Каждый эпизод диареи нужно лечить




- 1. Большинство плохих бактерий выходят с первым жидким стулом
- 2. С каждым последующим жидким стулом организм теряет полезные вещества и жидкость
- 3. Имодиум помогает сохранить полезные вещества и жидкость

Дополнительная информация

Как Имодиум[®] помогает бороться с инфекцией

- Большинство микробов выводятся с первым жидким стулом
- Замедление перистальтики уменьшает распространение инфекции по кишечнику, а значит
- Уменьшаются потери иммуноглобулинов с жидким стулом¹ и
- Увеличивается время контакта иммуноглобулинов с микробами и вирусами



Эффективное подавление инфекции в кишечнике, быстрая остановка диареи

Схема дозирования таблеток для рассасывания Имодиум[®]



	Острая диарея	Хроническая диарея	Максимальная суточная доза
Взрослые	Начальная доза — 2 таб.	Начальная доза — 2 таб. в сутки	8 таб.
Дети старше 6 лет	Начальная доза — 1 таб.	Начальная доза — 1 таб. в сутки	3 таб. на 20 кг веса, но не более 8 таб.
Общие	1 таб. после каждого жидкого стула	Для частоты стула 1–2 раза в сутки поддерживающая доза от 1 до 6 таб. в сутки	При нормализации стула или при его отсутствии более 12 часов препарат отменяют

Противопоказания

- Острая дизентерия и другие инфекции ЖКТ (вызванные, в том числе Salmonella, Shigella and Campylobacter)
 - Кишечная непроходимость, дивертикулез, острый язвенный колит, псевдомембранозный колит, вызванный антибиотиками широкого спектра действия
 - Первый триместр беременности
 - Период лактации
 - Детский возраст (до 6 лет) Имодиум® (таблетки для рассасывания)
 - Детский возраст (до 12 лет) только Имодиум[®] Плюс (таблетки жевательные)
 - Повышенная чувствительность к лоперамиду и/или другим компонентам препарата
 - Состорожностью
 - При печеночной недостаточности
 Во время беременности применение возможно только, если оно оправдано ожидаемой терапевтической пользой (только 2 и 3 триместр)

Побочные эффекты

- Аллергические реакции
- Утомляемость, головная боль, сонливость или бессонница, головокружение
- Сухость во рту, снижение содержания электролитов
- Тошнота, рвота, дискомфорт или боль в нижней части живота
- Метеоризм, запор, мегаколон
- Крайне редко кишечная непроходимость, задержка мочи