

Имодиум®

**НИЧТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ
ДИАРЕЮ БЫСТРЕЕ***

Диарея

Диарея - учащенное (как правило, более 3х раз в сутки) опорожнение кишечника с выделением жидких или кашицеобразных испражнений.

Отличительным признаком диареи следует считать более высокое, чем в норме, **содержание воды** в кале, возрастающее с 60-75% (в случаях твердого или оформленного кала) до **85-95%***.

Чего больше всего хочет
пациент с диареей?



БЫСТРО ОСТАНОВИТЬ ДИАРЕЮ!!!


Имодиум® - оригинальный препарат

- Более 35 лет успешного применения
- Помогает людям более чем в 70 странах мира
- Более чем 2 миллиарда человек на всех пяти континентах
- Во многих странах *Imodium*® – №1 среди всех антидиарейных безрецептурных препаратов



История препарата

Диарея- это..



Опасны последствия :

- обезвоживание
- Потеря электролитов микроэлементов.

Хроническая диарея часто вызывает витаминную недостаточность и водно-электролитный дисбаланс, что может повлечь за собой другое заболевание, такое как анемия.


Имодиум® действует на **ключевые** механизмы диареи

1. Нормализует перистальтику

2. Уменьшает секрецию жидкости в просвет кишечника

3. Нормализует обратное всасывание воды и солей из кишечника

4. Усиливает тонус анального сфинктера



**ИМОДИУМ® ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ РИТМ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА
И
БЫСТРО ОСТАНАВЛИВАЕТ ДИАРЕЮ**

Видео – механизм действия Имодаиум

Имодиум® подходит для частого применения

Я знаю, что Имодиум® -
эффективное средство, но могу
ли я использовать Имодиум®
часто?



Имодиум®
нормализует
работу
кишечника,
восстанавливая
его **естественный
ритм**. Поэтому
Имодиум®
подходит и
для **частого
применения**.



Фармакокинетика

- ▶ Действует только в кишечнике
- ▶ Начинает действовать очень быстро, с первой дозы

В 80% случаев эффект достигается уже после первого приема препарата

- ▶ Максимум действия достигает через 4-6 часов
- ▶ Не накапливается, период полувыведения 9-14 часов

Не проникает через ГЭБ и не воздействует на ЦНС

Алгоритм действий при острой диарее

При обследовании больных, в первую очередь, обращают внимание на наличие или отсутствие

«красных флажков» :

- высокая лихорадка (свыше 38,50С),
- стул с кровью
- тяжелая рвота
- признаки обезвоживания.

Консультация врача!

При отсутствии указанных симптомов больным проводится Симптоматическая терапия, кот. включает:

- регидратационная терапия,
- диетические мероприятия,
- применение антидиарейных лекарственных препаратов.

Таблетки для рассасывания Имодиум® растворяются в 50 раз быстрее, чем капсулы



The image is divided into three main sections. On the left, a rounded rectangular box is split vertically. The left half contains a green and purple capsule with the text 'Время растворения: 2 минуты (120 секунд)'. The right half contains a white, oval-shaped tablet with the text 'Время растворения: 2-3 секунды'. A large blue arrow points from this comparison box to the right, where a larger rounded rectangular box features a box of Imodium tablets. The text in this box reads 'в 50 раз быстрее, чем капсулы™' and 'Таблетки для рассасывания Имодиум® растворяются'. Below the text is an image of the Imodium box, which includes the brand name 'Имодиум®', the word 'Лоперамид', and '10 таблеток'. A small green plant is also visible at the bottom left of the box image.

Время растворения:
2 минуты (120 секунд)

Время растворения:
2-3 секунды

в **50** раз быстрее,
чем капсулы™

Таблетки для рассасывания
Имодиум® растворяются

Имодиум®
Лоперамид
таблетки
для рассасывания
Противодиарейное
средство
10
таблеток

Видео – таблетки для рассасывания
Имодиум

Имодиум® таблетки для рассасывания



Моментально (в течение 2–3 секунд) растворяются на языке



Не требуют запивания водой



Возможно применение у больных с затрудненным глотанием и повышенным рвотным рефлексом



Имеют приятный мятный вкус

Основное сообщение

Каждый эпизод диареи нужно лечить




1. Большинство плохих бактерий выходят с первым жидким стулом
2. С каждым последующим жидким стулом организм теряет полезные вещества и жидкость
3. Имодиум помогает сохранить полезные вещества и жидкость

Дополнительная информация

Как Имодиум® помогает бороться с инфекцией

- Большинство микробов выводятся с первым жидким стулом
- Замедление перистальтики уменьшает распространение инфекции по кишечнику, а значит
- Уменьшаются потери иммуноглобулинов с жидким стулом¹ и
- Увеличивается время контакта иммуноглобулинов с микробами и вирусами



Эффективное подавление инфекции в кишечнике, быстрая остановка диареи

Схема дозирования таблеток для рассасывания Имодиум®



	Острая диарея	Хроническая диарея	Максимальная суточная доза
Взрослые	Начальная доза — 2 таб.	Начальная доза — 2 таб. в сутки	8 таб.
Дети старше 6 лет	Начальная доза — 1 таб.	Начальная доза — 1 таб. в сутки	3 таб. на 20 кг веса, но не более 8 таб.
Общие рекомендации	1 таб. после каждого жидкого стула	Для частоты стула 1–2 раза в сутки поддерживающая доза от 1 до 6 таб. в сутки	При нормализации стула или при его отсутствии более 12 часов препарат отменяют

Противопоказания



- Острая дизентерия и другие инфекции ЖКТ (вызванные, в том числе *Salmonella*, *Shigella* and *Campylobacter*)
- Кишечная непроходимость, дивертикулез, острый язвенный колит, псевдомембранозный колит, вызванный антибиотиками широкого спектра действия
- Первый триместр беременности
- Период лактации
- Детский возраст (до 6 лет) - Имодиум[®] (таблетки для рассасывания)
- Детский возраст (до 12 лет) - только Имодиум[®] Плюс (таблетки жевательные)
- Повышенная чувствительность к лоперамиду и/или другим компонентам препарата



С осторожностью

- При печеночной недостаточности

Во время беременности применение возможно только, если оно оправдано ожидаемой терапевтической пользой (только 2 и 3 триместр)

Побочные эффекты

- Аллергические реакции
- Утомляемость, головная боль, сонливость или бессонница, головокружение
- Сухость во рту, снижение содержания электролитов
- Тошнота, рвота, дискомфорт или боль в нижней части живота
- Метеоризм, запор, мегаколон
- Крайне редко – кишечная непроходимость, задержка мочи