

Инфицированные  
аборты. Клиника,  
диагностика,  
лечебная тактика

# Причины ГСИ после аборта

1. Самопроизвольный аборт, вызванный общими и гинекологическими инфекциями
2. Длительное пребывание больной вне лечебного учреждения
3. Выполнение аборта при наличии противопоказаний
4. Задержка частей плодного яйца в полости матки
5. Криминальное вмешательство

# Факторы, способствующие распространению ГСИ

- Раневая поверхность матки, травмы шейки, тела матки
- Кровопотеря при аборте и анемия
- Применение токсических веществ
- Физиологический иммунодефицит

# Признаки инфицированного аборта

- Повышение  $t > 37,5$  в сочетании с тахикардией
- Озноб
- Кровянисто-гнойные или зловонные выделения из матки
- Отхождение частей плодного яйца в состоянии гнойного распада
- Свежие разрывы на шейке матки
- Болезненность матки и придатков
- Инфильтраты в малом тазу
- Указание на криминальное вмешательство

# Классификация инфицированных абортов

- Неосложненный инфицированный аборт
- Осложненный инфицированный аборт
- Септический аборт

# Этапы распространения ГСИ

I этап – инфекция ограничена областью раны ( плодное яйцо, эндометрит )

II этап – инфекция распространилась за пределы раны, но локализована в малом тазу ( сальпингоофорит, пельвиоперитонит, параметрит, тромбофлебиты матки, тазовых, н/конечностей )

III этап – разлитой перитонит, прогрессирующий тромбофлебит, септический шок

IV этап - сепсис

# Диагностика инфицированного аборта

1. Мониторное наблюдение за больной ( ЧСС, АД, t, ЧД, почасовой диурез)
2. Общеклиническое обследование
3. Биохимическое обследование
4. Бактериологическое и бактериоскопическое исследование мазков из цервикального канала и т.д.
5. УЗИ гениталий
6. Р- графия легких, ЭКГ, консультации специалистов — по показаниям