



### Сахарный диабет 2 типа у детей и подростков




руководитель СНК: к.м.н. Старостина Л.С. выполнила: студентка 5 курса 93 группы ЦИОП «Медицина будущего» Анпилогова Е.М.

Москва 2015

### Сахарный диабет 2 типа

- тип диабета, при котором инсулинрезистентность (ИР) сочетается с относительной недостаточностью инсулина разной степени выраженности
- развивается у лиц с генетической предрасположенностью под влиянием социальных, поведенческих и экологических факторов




### Факторы риска

- Ожирение (особенно абдоминальное)
- Случаи СД2 в семейном анамнезе
- Отсутствие панкреатических антител
- N или высокий уровень С-пептида
- Инсулинорезистентность
- Синдром поликистозных яичников
- Пубертатный возраст



### Эпидемиология СД 2 типа



### Распространенность СД 2

РФ:

- 0-14 лет 1.5:100000
- 15-17 лет 5.3:100000

США:

12:100000

Европа:

• 2.5:100000



# Особенности манифестации

Бессимптомное или малосимптомное начало

5-25% подростков в начале имеют выраденный дефицит инсулина из-за глюкои липотоксичности

У части больных выявляются аутоантитела, характерные для СД1

У 30-40% - кетоз; в отдельных случаях – гиперосмолярное гипергликемическое состояние



# Критерии гипергликемического гиперосмолярного состояния

- Глюкоза плазмы > 33 ммоль/л
- Осмолярность сыворотки > 330мосм/л
- Умеренный ацидоз бикарбонаты > 15 ммоль/л
- Умеренная кетонурия < 15 мг/дл

### Клиническая картина

- Волнообразное течение
- Снижение интеллекта
- Чаще бессимптомная гипергликемия
- Абдоминальная, головная боли, ноктурия, полиурия, полифагия, полидипсия, двоение в глазах и др.
- Потеря массы тела
- У 20% гипергликемия сопровождается кетоацидозом

## Особенности течения СД2 у детей и подростков

- Может возникать временная потребность в инсулине на фоне стрессов и интеркуррентных заболеваний
- Рано возникает инсулинозависимость
- Характерны ранние микро- и макрососудистые осложнения, в том числе уже при манифестации заболевания


### Диагностика СД2

- Критерии СД, установленные ВОЗ
- Проявления синдрома ИР: ожирение, нефропатия, артериальная гипертензия, дислипидемия, синдром поликистозных яичников/преждевременное адренархе, неалкогольная жировая болезнь печени
- Начало в 10 лет и старше
- Отягощенная наследственность
- Принадлежность к нацменьшинствам с высокой частотой СД2



## Диагностические критерии СД по ВОЗ

- Симптомы диабета + повышение концентрации глюкозы в плазме венозной крови > 11,1 ммоль/л при случайном измерении. Случайным считают измерение в любое время дня без учета срока с момента последнего приема пищи. Классическими симптомами диабета считают полиурию, полидипсию, потерю массы тела в отсутствие явных причин.
- Концентрация глюкозы натощак в плазме крови > 7,0 ммоль/л или в цельной крови > 6,1 ммоль/л. Измерение концентрации глюкозы считают проводимым натощак, если после приема пищи прошло не менее 8 часов.
- Концентрация глюкозы в плазме крови > 11,1 ммоль/л через 2 часа после приема 75 г глюкозы (проба на толерантность к глюкозе).




# Осложнения СД 2 типа у детей и подростков

- Диабетическая ретинопатия
- Диабетическая нефропатия
- Диабетическая нейропатия
- Осложнения, ассоциированные с ожирением


# Диабетическая ретинопатия

- поражение сосудов сетчатой оболочки глазного яблока
- Классификация:
- начальная непролиферативная стадия;
- препролиферативная;
- пролиферативная;
- стадия конечных изменений в сетчатке (терминальная).



# Диабетическая нефропатия


- специфические патологические изменения почечных сосудов, приводящие к гломерулосклерозу, снижению фильтрационной функции почек и ХПН.
- микроальбуминурия и протеинурия, АГ, нефротический синдром, признаки уремии и ХПН.
- диагноз на основании уровня альбумина в моче, клиренса эндогенного креатинина, белкового и липидного спектра крови, данных УЗИ почек, УЗДГ почечных сосудов.
- лечение: диета, коррекция углеводного, белкового, жирового обмена, прием ингибиторов АПФ и АРА, дезинтоксикационная терапия, при необходимости гемодиализ, трансплантация почек.



## Диабетическая

нейропатия

- специфическое поражение периферического отдела нервной системы, обусловленное дисметаболическими процессами при СД.
- нарушение чувствительности (парестезии, онемение конечностей)
- вегетативная дисфункция (тахикардия, гипотензия, дисфагия, диарея, ангидроз), мочеполовые расстройства и т. д.
- Лечение: инсулинотерапия, применение нейротропных препаратов, антиоксидантов, назначение симптоматической терапии, акупунктуры, ФТЛ, ЛФК.



### Осложнения у детей и подростков,

#### ассоциированные с ожирением

- Артериальная гипертензия эндотелиальная дисфункция, повышенный риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и хронических заболеваний почек
- Дислипидемия значительно повышает риск раннего развития атеросклероза
- Жировой гепатоз мощный маркер ИР и нарушений углеводного обмена
- Кардиоваскулярная форма автономной нейропатии результат повреждения вегетативных нервных волокон, иннервирующих сердце и сосуды -> нарушение сердечного ритма

#### Лечение



ГК > 13.9 ммоль/л

HbA1c > 9%, или кетоз, или кетоацидоз

Инсулин; диета и физ.активость; метформин

ГК <7.2/10.0 ммоль/л Спептид > 171 нг/мл; АТ «-», «+/-»

Попытка обойтись без инсулина

СД2

Без симптомов

Диета и физ.активность

Ежемесячное обследование HbA1c 1 раз в 3 месяца

Метформин; физическая активность

Ежемесячное обследование HbA1c 1 раз в 3 месяца Легкая симптоматика без кетоза

ΓK < .72/10.0 HbA1c <7%

ГК > 7.2/10.0; HbA1c >7%; Спептид>1.1 нг/мл; Ат «-» или «+/-»

ΓK <7.2/10.0; HbA1c <7%

ГК>7.2/10.0; HbA1c>7%; Спептид>1.1 нг/мл; Ат «-» или «+/-»

- Проверка приверженности терапии
- Рассмотрение вопроса о допназначении: пр-в сульфонилмочевины/ инсулинотерапии

# Лечение СД2 у детей и подростков

- При острой манифестации инсулин
- После первичной компенсации соблюдение диеты и назначение таблетированных СПП
- У пациентов с ожирением эффективен метформин
- При N массе тела производные сульфонилмочевины
- Гепатотоксичные тиазолидиндионы и ингибиторы глюкозидазы почти не применяются

### Метформин

- Отсутствие риска гипогликемий
- Стабилизация/уменьшение массы тела
- Снижение уровней ЛПНП и триглицеридов
- Нормализует репродуктивную функцию у девушек с синдромом поликистоза яичников
- В острых случаях, протекающих с дегидратацией и гипоксией, лечение метформином временно прекращается

#### СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

