SUDDEN CARDIAC DEATHS IN YOUNG ATHLETES



Anjan Gupta M.D.
Department of
Cardiology
Sinai Samaritan Med
Center
Milwaukee, Wisconsin.

anjangupta@pol.net

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ У МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ



Конкурирующий спорстсмен участвует в коммандных и индивидуальных спортивных состязаниях, что требует регулярных тренировок и соревнований с другими атлетами


ДЕМОГРАФИЯ

- Внезапная сердечная смерть возникает наиболее часто во время баскетбольного или футбольного матча
- Большинство смертных случаев характерно для мужчин
- Большинство спортсменов к моменту смерти имеет средний школьный возраст
- У большинства этих спортсменов отсутствовали какие-либо сердечнососудистые симптомы


ДЕМОГРАФИЯ

- Коллапс обычно связан с интенсивной физической нагрузкой и обычно возникает днём или ранним вечером
- Сердечно-сосудистая патология обычно не подозревается у этих людей на протяжении всей жизни и редко выявляется скрининговыми методами

Кардиоваскулярные причины ВСС у молодых спортсменов




Внесердечные причины ВСС




Maron BJ et al, JAMA 1996 ; 276 : 199 - 203

Ежегодная динамика ВСС призывников в первый год службы




Kark et al, NEJM 1987 ; 317 : 781 - 786

Риск внезапной сердечной смерти у "марафонцев"




Maron et al , JACC 1996 ; 28 : 428 - 431

Сравнение спортивных и неспортивных событий во время ВСС



Burke et al, Am Hrt Jnl 1991; 121: 568-575


Спортивные состязания во время ВСС




■ Не спортсмены

Maron BJ et al, JAMA 1996 ; 276 : 199 - 203

Почасовое распределение внезапной смерти




Расовое влияние на причинность ВСС



Maron BJ et al, JAMA 1996 ; 276 : 199 - 203

Участие в зональных и региональных спортивных состязаниях во время ВСС



Maron et al, NEJM , 1995 ; 333 : 337 - 381

Cardiovascular abnormalities detected

Primary Cardiovascular lesion	No of athletes	Median age
HCM	48 (36%)	17 (13 - 28)
Possible HCM	14 (10%)	17 (14 - 24)
Aberrant coronary arteries	17 (13%)	15 (12 - 23)
Other coronary anomalies	8 (6%)	17.5 (14 - 40)
Ruptured aortic aneursyms	6 (5%)	17 (16 - 31) [^]
Tunneled LAD	6 (5%)	17.5 (14 - 20)
Aortic stenosis	5 (4%)	14 (14 - 17)
Myocarditis	4 (3%)	15.5 (13 - 16)
Idiopathic dilated cardiomyopathy	4 (3%)	18 (18 - 21)
ARVD	4 (3%)	16 (15 - 17)
Idiopathic myocardial scarring	4 (3%)	20 (14 - 27)
MVP	3 (2%)	16 (15 - 23)
Atherosclerotic CAD	3 (2%)	19 (14 - 28)

Maron BJ et al, JAMA 1996 ; 276 : 199 - 203

Сердечно-сосудистая патология

Основная патология	%	Средний возраст
Other cong heart disease Long QT syndrome Sarcoidosis Sickle cell trait Normal Heart	2 (1.5%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 3 (2%)	13.5 (12 - 15) 18 (16 - 21)

Maron BJ et al, JAMA 1996 ; 276 : 199 - 203

Гипертрофическая КМП

- Молодые спортсмены, умирающие внезапно от ГКМП обычно имеют возраст 13 - 30 лет
- Стенка ЛЖ обычно асимметрична с искаженной клеточной архитектоникой и атипичным положением интрамуральных коронарных артерий
- Смерть обычно происходит без каких-либо предвестников


Гипертрофическая КМП

Механизмы внезапной смерти

Malignant ventricular arrhythmia


 Внезапная гемодинамическая нестабильность с увеличением обструкции в ВОЛЖ

Распространенность серьезной и умеренной ГТ ЛЖ у пациентов с ВСС и в контрольной группе выживших




Spirito et al, JACC 1990 ; 15 : 1521 - 1526

Симптомный статус до ВСС у госпитальной популяции больных ГКМП



Степень активности госпитальной популяции пациентов ГКМП во время ВСС



Maron BJ et al, Circulation 1982; 65:1118

ВРОЖДЁННЫЕ АНОМАЛИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

- Наиболее часто LMCA отходит от правого синуса Вальсальвы
- 75 % пациентов с этой мальформацией умирает внезапно до 20 лет и смерть происходит в течение или вскоре после энергичной физической нагрузки
- Большая часть этих пациентов может испытывать синкопэ или стенокардию

ВРОЖДЁННЫЕ АНОМАЛИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Механизм внезапной смерти

- Острый угол отхождения LMCA создает мембрано-подобное сужение коронарного устья
- С увеличением УО во время физической нагрузки восходящая аорта расширяется и изменение угла отхождения ещё более сужает устье КА
- LMCA также может быть сдавлена во время физической нагрузки корнем лёгочного ствола

ВРОЖДЁННЫЕ АНОМАЛИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

ДРУГИЕ ВРОЖДЁННЫЕ АНОМАЛИИ

- Гипоплазия участков коронарного дерева
- Отхождение ПНА от лёгочного ствола
- Расщепление ствола коронарной артерии

ТУННЕЛЬНЫЕ КОРОНАРНЫЕ АРТЕРИИ

- Миокардиальные мостики или "туннельные " коронарные артерии могут вызывать ВСС
- Они вероятно подвергаются критической степени систолического пережатия, заканчивающегося миокардиальной ишемией
- Приблизительно у 5 % жертв спортивно полевых смертей были найдены "туннельные" коронарные артерии

Неатеросклеротическое сужение артерии атриовентрикулярного узла и внезапная смерть Гистологические находки

	Контроль (n = 17)	BCC (n = 27
Fibrointimal proliferation Absent Present Present with destruction of Internal Elastic lamina (IEL) Present with destruction of IEL and acid mucopoly- saccharide deposition) 6 7 3	6 3 6 * 12 **

^{*} p = 0.02, ** p = 0.006

Burke et al , JACC 1993 ; 21 : 117 - 122

НАДРЫВ AOPTЫ (Marfan Syndrome)

- Диссекция и надрыв аорты с или без тампонады сердца
- Некоторые из индивидуумов могут иметь классические стигмы синдрома Marfan
- При некропсии обычно обнаруживают разрушение аортальной медии с вакуольным медионекрозом

МИОКАРДИТ

- Традиционно считается причиной необъянимых внезапных смертельных случаев у молодых людей
- Точный диагноз может быть затруднён даже при некропсии
- Обычно вызывается вирусами или может быть результатом хронического злоупотребления кокаина

ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

- Не частая причина ВСС
- До настоящего времени менее чем у 100 пациентов с ВСС (средний возраст 35 лет) установлена связь с ПМК
- Такие смертельные случаи обычно не имеют связи с физической нагрузкой и очень редко возникают у спортсменов

СТЕНОЗ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

- Рассматривается как частая причина внезапной смерти у асимптомных детей и молодых людей
- Однако эта патология, вероятно, идентифицируется рано вследствие клинического прогрессирования, которое ведёт к спортивной дисквалификации

АРИТМОГЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА

- Морфологически характеризуется сегментарной или распространённой фиброзно-жировой заменой кардиомиоцитов в свободной стенке правого желудочка
- Связана с опасными рецидивирующими желудочковыми или суправентрикулярными аритмиями
- Семейная патология

АРИТМОГЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА

- ЯМР-томография более надежна чем ЭХОКГ в качестве неинвазивной диагностики
- Инверсия Т-волны в V1 и V2 и изолированные ЖЭС с морфологией блокады ЛНПГ
- Наиболее частая причина смерти молодых спортсменов в Италии прежде всего в футбольных матчах

АНОМАЛИИ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

- Дополнительные пути проведения
- Структурная патология маленькой интрамуральной артерии САУ
- Патология AV узла

АТЕРОСКЛЕРОЗ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

- Иногда ответственен за внезапную смерть у молодых спортсменов
- Пациенты обычно имеют стенокардию напряжения до эпизода внезапной сердечной смерти
- Пациенты могут иметь другие факторы риска или семейный анамнез

НОРМАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

- Передозировка препарата
- Синдром WPW
- Синдром удлинённого QT
- Коронароспазм
- Необнаруженная АДПЖ

COMMOTIO CORDIS

- Прямой тупой удар в грудную клетку
- Вероятно вызывает смертельную сердечную аритмию и мгновенный коллапс
- Индукция ЖЭС следует из прямолинейного воздействия, которое может закончиться фатальной аритмией