Відкритий урок
на тему:

Дотична до графіка функції

Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
Києво-Святошинського р-ну
Київської обл.
Вч. Овчинникова (Яськова) О.Й.
м.Боярка

Дотична до графіка функції

Мета: Дати поняття про геометричний зміст похідної та вивести рівняння дотичної

І. Перевірка домашнього завдання

1. Розв’язати нерівності методом інтервалів:

1. $(x-5)(\tilde{o}+1)(\tilde{o}-3) < 0$
2. $\dfrac{x^2(x-3)}{x-1} \le 0$

1. $(\tilde{o}-5)(\tilde{o}+1)(\tilde{o}-3) < 0$
2. $\dfrac{(x+2)^2(x-4)}{(x-3)} > 0$

2. Знайти похідні функцій:

1. $f(x) = 2x^5 + 3\sqrt{x} - 10$
2. $g(x) = (3 - 7 \cdot x)^{10}$

1. $g(x) = x^2 + \dfrac{3}{x} - 5$
2. $f(x) = \cos(3 - 2 \cdot x);$

І. Перевірка домашнього завдання

відповіді

1. Розв’язати нерівності методом інтервалів:

1.

–1 3 5

(–∞;–1)U(3;5)

2.

1 3

(1;3] і x=0

1.

–6 –2 4

[-6;-2]U[4;+∞)

2.

–2 3 4

(–∞;-2)U(-2;-3)U(4;+∞)

2. Знайти похідні функцій:

1. $f'(x) = 10 \cdot x^4 + \dfrac{3}{2\sqrt{x}}$

2. $g'(x) = -70 \cdot (3 - 7 \cdot x)^9.$

1. $g'(x) = 2 \cdot x - \dfrac{3}{x^2}$

2. $f'(x) = 2 \cdot \sin(3 - 2 \cdot x)$

II. Вивчення нового матеріалу

А) Актуалізація опорних знань.

- Що називається похідною функції?
- Який геометричний і механічний зміст похідної?
- Що таке січна? Який кутовий коефіцієнт січної?
- Дати поняття дотичної до графіка функції.

Б) Мотивація навчання.

Коротка історична довідка.

В) Поняття дотичної до лінії.

Нехай графіком деякої функції $y = f(x)$ є крива. AB – січна. Кутовий коефіцієнт січної: $k = tg\varphi = \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$



$$k = tg\alpha = \lim \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

Якщо $\Delta x \to 0$, то кутовий коефіцієнт січної → до числа $f'(x_0)$, де $f'(x_0)$ є кутовим коефіцієнтом прямої AT – дотична.

Якщо $\Delta x \to 0$, то т. B → до т. A по графіку функції. При суміщенні т. B з т. A пряма AB, обертаючись навколо т. A займе граничне положення AT, яке й будемо називати дотичною до графіка функції в т. $A(x_0, f(x_0))$. Дотична – граничне положення січної.

Отже, дотична до графіка диференційованої в т. x_0 функції – це пряма, що проходить через т. $A(x_0, f(x_0))$ і має кутовий коефіцієнт $f'(x_0)$.

Г) Виведення рівняння дотичної до графіка функції в даній точці

Виведемо рівняння дотичної до графіка диференційованої функції

$y = f(x)$ в т. $A(x_0, f(x_0))$.

Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом k має вигляд:

.

$$ó = kx + b$$

Дотична – це пряма з кутовим коефіцієнтом $k = f'(x_0)$, отже її рівняння:

$$ó = f'(x_0)\tilde{o} + b \qquad (1)$$

Для обчислення ***b*** скористаємося тим, що дотична проходить через т. $A(x_0, f(x_0))$, отже координати т. A задовольняють рівняння (1):

$f(x_0) = f'(x_0)\, x_0 + b$, звідки $b = f(x_0) - f'(x_0)\, x_0$.

Підставимо в рівняння (1), отримаємо:

$y = f'(x_0)\, x + f(x_0) - f'(x_0)\, x_0 = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Отже, рівняння дотичної: $ó = f'(x_0)(x - \tilde{o}_0) + f(\tilde{o}_0).$

III. Набуття навичок складання рівняння дотичної до графіка даної функції в даній точці

1. **Написати рівняння дотичної до графіка функції**

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$$

в т. $x_0 = 2$

Розв'язування

Рівняння дотичної обчислюємо за формулою:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Складаємо алгоритм знаходження рівняння дотичної:

1). Знаходимо значення функції в т. $x_0 = 2$:

$f(x_0) = f(2) = 2^3 - 2 \cdot 2^2 + 1 = 8 - 8 + 1 = 1$; $f(x_0) = 1$.

2). Знаходимо похідну функції:

$$f'(x) = (x^3 - 2x^2 + 1)' = 3x^2 - 4x$$

3). Знаходимо значення функції похідної в т. $x_0 = 2$:

$f'(x_0) = f'(2) = 3 \cdot 2^2 - 4 \cdot 2 = 12 - 8 = 4$; $f'(x_0) = 4$.

4). Отже, рівняння дотичної:

$y = 4(x - 2) + 1 = 4x - 8 + 1 = 4x - 7$.

Відповідь: $y = 4x - 7$.

2. Написати рівняння дотичної до графіка функції $g(x) = \sqrt{2 \cdot x - 1}$ в т. $x_0 = 5$.

Розв'язування

1) $g(x_0) = g(5) = \sqrt{2 \cdot 5 - 1} = \sqrt{9} = 3$.

2) $g'(x) = \left(\sqrt{2 \cdot x - 1}\right)' = \dfrac{1}{\sqrt{2 \cdot x - 1}}$

3) $g'(x_0) = g'(5) = \dfrac{1}{\sqrt{2 \cdot 5 - 1}} = \dfrac{1}{3}$.

4) $y = \dfrac{1}{3}(x - 5) + 3 = \dfrac{1}{3}x - \dfrac{5}{3} + 3 = \dfrac{1}{3}x + 1\dfrac{1}{3}$

Відповідь: $y = \dfrac{1}{3}x + 1\dfrac{1}{3}$.

IV. Самостійна робота.

Написати рівняння дотичної до графіка функції в точці з абсцисою x_0

1. $f(x) = x^3 + 3x$ в т. $x_0 = -1$.

2. $g(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2$ в т. $x_0 = 3$.

3*. $f(x) = \sqrt{2x+1}(x-1)$ в т. $x_0 = 4$.

1. $g(x) = 2x^3 - 3x$ в т. $x_0 = 1$.

2. $f(x) = \sqrt{2x+5}$ в т. $x_0 = 2$.

3*. $h(x) = \frac{(2x-3)^2}{\sqrt{4x-7}}$ в т. $x_0 = 2$.

Додатково: С – 30, В – 6 і В – 7.

Написати рівняння дотичної до графіка функції в точці з абсцисою x_0:

1. $y = \sin 2x$ в т. $x_0 = \frac{\pi}{6}$.

2. $y = \frac{2}{x}$ в т. $x_0 = -2$.

1. $y = \sin\frac{x}{2}$ в т. $x = \frac{\pi}{2}$.

2. $y = x^2 - 2x$ в т. $x_0 = 2$.

(Виконати мал.)

Додатково: С – 30, В – 1 і В –2.

Відповіді

Написати рівняння дотичної до графіка функції в точці з абсцисою x_0

1. $y = x - 1$.
2. $y = 2x - 4$.

3*. $y = 4x - 7$

1. $y = 3x - 4$.
2. $y = \frac{1}{3}x - \frac{7}{3}$

3*. $h = 4x - 7$

Написати рівняння дотичної до графіка функції в точці з абсцисою x_0:

1. $y = x + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6}$
2. $y = -0{,}5x - 2$

1. $y = 2x - 4$
2. $y = 2x - 4$

Знайдіть тангенс кута нахилу дотичної до графіка функції в точці перетину цього графіка з віссю абсцис:

$f(x) = x^3 + 27.$

Відповідь: $\operatorname{tg} \alpha = 27.$

$f(x) = x^3 - 27.$

Відповідь: $\operatorname{tg} \alpha = 27.$

Розв'язування

$x^3 + 27 = 0$, $x_0 = -3$

точка перетину $(-3,0)$

$\operatorname{tg} \alpha = k = f'(x_0)$, $f'(x) = 3x^2$

$\operatorname{tg} \alpha = 3(-3)^2 = 27.$

$x^3 - 27 = 0$, $x_0 = 3$

точка перетину $(3,0)$

$f'(x) = (x^3 - 27)' = 3x^2$

$\operatorname{tg} \alpha = f'(x_0) = 3 \cdot 3^2 = 27.$

Написати рівняння дотичної до графіка функції:

$f(x) = \frac{1}{2}x^2$ в т. $x = -3$

Відповідь: $y = -3x + 9{,}5.$

$f(x) = 2 - x^2$ в т. $x = 3$

Відповідь: $y = 6x + 11$

V. Підсумок уроку.

VI. Д/з: п. 19; №№ 255, 256; повт. № 140 (ст. 302).