

Воспаление параанальных желез.

Воспаление параанальных желез.

- Анальные мешки, называемые так же параанальными железами, это две маленькие желёзки, находящиеся сразу у выхода ануса. Вещество, выделяемое параанальными железами, густое и с очень неприятным запахом.
- Большинство животных может освободить эти железы целенаправленно для маркировки запахом или при самообороне (подобно скунсу). Собаки, а так же некоторые кошки, в значительной степени потеряли способность управлять опорожнением этих мешков самостоятельно.
- В норме это происходит, например, при нормальной дефекации. Если железы переполняются, они увеличиваются, воспаляются, мешают дефекации и даже ходьбе. Собаки с закупоренными параанальными железами обычно трутся задом по земле или полу в попытке выдавить скопившийся секрет. Некоторые собаки облизывают анальную область другие пытаются придавить железы хвостом. Кошки часто сильно разлизывают мех под хвостом

Что делать, если собака "ездит" задом по полу?

- Сразу же проверить параанальные железы, особенно если раньше с ними у этого животного уже были проблемы. В случае их переполнения можно попробовать один из двух способов их опорожнения:

- Наружный" метод
- Салфетка прижимается к заднему проходу, и обе стороны анальной области сдавливаются. Если секрет очень вязкий (тестообразный), этот метод может быть недостаточен для полного освобождения мешков.

- Внутренний" метод
- Одеваем резиновую перчатку, указательный палец смазывается вазелином и вводится в анус. Теперь есть возможность зажать железу между большим пальцем снаружи и указательным изнутри, что позволяет полностью избавиться и от вязкого секрета.

- Если параанальные железы хорошо очищены, зуд под хвостом проходит, и через день - два собака уже не пытается ездить на заду.

А что делать, если зуд под хвостом продолжается, ?

- Если однократная очистка желез не помогла, через несколько дней процедуру повторяют. У некоторых животных приходится возвращаться к очистке желез несколько раз подряд, пока удастся достигнуть стойкого чистого их состояния.
- Если процедуры регулярны, параанальные железы стабильно чисты, но неприятности продолжаются, стоит обратиться к врачу. Скорее всего, собака беспокоится из-за аллергической реакции, плоских глистов, а возможно и из-за низких поясничных болей.

Что может произойти, если железы не очищаются?

- Может сформироваться абсцесс, который прорвется наружу через кожу. Это болезненно, а все окружающее обязательно будет испачкано зловонным секретом воспаленной параанальной железы.
- Стоит заметить, что подобное встречается довольно часто, но ошибочно диагностируется как ректальное кровотечение. Если у вашего животного сформировался абсцесс параанальных желез, поможет только врач.
- В дальнейшем может развиваться опухолевый процесс

- Опухоли перианальных желез считаются гормонально обусловленными, поскольку рост их прекращается после кастрации, и эти опухоли редко встречаются у сук. Этиология аденокарцином перианальных мешков не известна.
- Из тех опухолей, которые нам приходилось оперировать, злокачественных не было, все пациенты хорошо себя чувствуют



(с) 2005 Портал Ветфото (www.VetPhoto.ru) || Ветеринарная клиника "Асует" (г. Одинцово)



Как часто нужно очищать параанальные железы?

- Это очень индивидуальный вопрос. Следите за собакой, ее поведение подскажет, что железы полны. Может появиться неприятный запах, начнутся проблемы с дефекацией. Обычно, когда мы проводим такие гигиенические процедуры как стрижка, мытье, мы всегда проверяем состояние желез.

Что делать, если параанальные железы моей собаки требуются очищать часто и постоянно?

- Чтобы избежать необходимость все время обращаться к специалистам, научитесь освобождать параанальные железы своей собаки самостоятельно, как делают это большинство владельцев.
- Если вы не способны овладеть этой простой процедурой, или по какой-либо иной причине не хотите проводить ее самостоятельно, вам придется часто посещать ветврача. . Обсудите с вашим ветврачом возможность удаления параанальных желез хирургическим путем.