



Углеводы (сахара) имеют общую формулу



- ◆ **Моносахариды** – простые углеводы с множеством ОН-групп. В зависимости от числа атомов углерода (3, 4, 5, 6), моносахариды делятся на **триозы**, **тетрозы**, **пентозы** или **гексозы**.
- ◆ **Дисахариды** – два ковалентно связанных моносахарида.
- ◆ **Олигосахариды** – несколько (3-50) ковалентно связанных моносахаридов.
- ◆ **Полисахариды** – полимеры, состоят из большого числа связанных моносахаридов или дисахаридов (> 50) .


Моносахариды

Альдозы (глюкоза) имеют альдегидную концевую группу.




D-glucose

Кетозы (фруктоза) имеют кето-группу, обычно C2.




D-fructose

АЛЬДОЗЫ





Кетозы




D-L формы сахаров. Оптическая изомерия.


D или L форма определяется исходя из расположения **ОН-** группы относительно хирального атома C*.




D-Глицеральдегид



L-Глицеральдегид



D-Глицеральдегид




L-Глицеральдегид

Номенклатура моносахаридов

Для сахаров с несколькими хиральными атомами С, **D** или **L** форма определяется по наиболее дальнему атому С от альдо- или кето-группы.


Большинство природных моносахаридов являются **D**-изомерами.



Образование полуацеталей и полукеталей

Альдегид в реакции со спиртом образует полуацеталь.

Кетон реагирует со спиртом с образованием полукетала.





Пентозы и гексозы
могут
циклизоваться,
формируя внутри-
молекулярные
полуацетали и
полукетали.

6-членное кольцо
– пираноза.

5-членное кольцо
– фураноза.


.






D-Глюкоза

D-глюкоза может циклизироваться двумя способами, давая фуранозную и пиранозную структуры




Глюкопираноза



Глюкофураноза

Аномерами называют моносахариды,
находящиеся в
циклической пиранозной циклической пиранозно
й или фуранозной циклической пиранозной или ф
уранозной форме и отличающиеся
конфигурацией ацетального циклической пираноз
ной или фуранозной форме и отличающиеся
конфигурацией ацетального атома углерода
(аномерного центра). Для обозначения аномеров
используют альфа-\бета- номенклатуру


Аномерия



В циклической молекуле моносахарида появляется **центр асимметрии** атом **C1**. Два стереоизомера называются **аномерами**, α или β .

- ◆ α (ОН **под** плоскостью кольца)
- ◆ β (ОН **над** плоскостью кольца).

Пространственная конформация




Представленные выше структурные формулы являются лишь проекциями на плоскость.

В пространстве пиранозное кольцо представлено в конформациях типа «кресло» и «ванна»


(a)

Ось вращения (Axis)



Кресло

Ось вращения (Axis)




Ванна

a = axial bond

e = equatorial bond

(b)

Пиранозное кольцо в конформации «кресло» и «ванна»



Возможные состояния
 β -D-глюкозы в конформации
«кресло»