Кризовое течение АГ, возможности фармакологической корекции

Проф. С.Н. Терещенко

Гипертонический криз

- 1. Самое частая ситуация в неотложной кардиологии, с которой сталкиваются врачи
- 2. Наименее обсуждаемая тема в литературе и на конференциях
- 3. Самый «трудноподдающийся» раздел в кардиологии с позиций изменения схем



Ежегодно в мире умирает 10.7 миллионов человек


50% из-за повышенного АД

= 5.35 миллионов смертей

Гипертонический криз

это состояние вызванное выраженным повышением АД, сопровождающееся появлением или усугублением клинических симптомов и требующее быстрого контролируемого снижения АД для предупреждения повреждения органовмишеней

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ИСХОДЫ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ




- Инсульт
- CH

- Отек легких
- Инфаркт миокарди
- Энцефалопатия




РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В РОССИИ

АД >=140/90 мм рт.ст.



КОЛИЧЕСТВО ВЫЗОВОВ И ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПО СМП г. МОСКВЫ В СВЯЗИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ



ПРИЧИНЫ ГК

- Основная причина ГК артериальная гипертония.
- Внезапное прекращение приема антигипертензивных препаратов
- Применение симпатомиметических средств.
- Эклампсия беременных.
- Острый гломерулонефрит.
- Феохромоцитома.
- Предоперационный период.
- Травма ЦНС.

ПРИЧИНЫ ГК

- Ситуационные ГК (стресс-индуцированные), развивающиеся при чрезмерном умственном и физическом физическом перенапряжении, сильный болевой раздражитель
- Ятрогенные ГК, спровоцированные неправильным применением лекарственных препаратов (передозировка, нерациональная комбинация, внезапная отмена или неадекватной скоростью применения в/в вводимых средств).
- Эндокринные заболевания (с-м Кушинга, гипертиреоз)
- Ренин-продуцирующие опухоли
- Неврологические заболевания, сопровождающиеся повышением тонуса автономной нервной системы
- Коартация аорты.

Распределение больных по причинам возникновения гипертонических кризов



Причины несоблюдения предписанного режима терапии АГ



Cheng J.W. et al. Pharmacotherapy 2001;21:828-841.

Всего выбыло	106	10,1	114	12,1**
	N	%	N	%
	Активная терапия Контро			троль
позволила уменьшить число				
гациональная герапия Ат в	ИССЛЕДС	жани	ИГО	LA

В т.ч. отказ от лечения

точки, в том числе

MNO

ОНМК

ОНМК и ОИМ

госпитализацией

Достижение вторичной конечной

Тяжелый гипертонический криз с

Сердечно-сосудистая смертность

47

5

3

1

56

21

6

5

1

4,5

0,5

0,3

0,1

6,0

2,2 **

0,6 *

0,5 *

0,1

0,8 **

0,1

Dutch TIA Trial

1473 больных с ПНМК или инсультом, который не приводил к инвалидности

Атенолол 50 мг/сут

Плацебо

Средняя продолжительность наблюдения 2,6 года

Смертность от сосудистых заболеваний, частота развития несмертельного инсульта, или несмертельного ИМ, а также смертельного и несмертельного инсульта; достигнутый уровень АД

Результаты исследования Dutch TIA Trial

Снижение уровня АД через 4 мес терапии



Результаты исследования Dutch TIA Trial

Частота развития осложнений ССЗ



Stroke 1993;24:543-548.

Диагностика ГК основывается на следующих основных критериях:

- Относительно внезапное начало заболевания от минут до нескольких часов.
- Индивидуально высокий подъем артериального давления с учетом обычных (рабочих) цифр.
- Появление или усугубление субъективных и объективных признаков поражения органов-мишеней, степень выраженности которых определяется тяжестью криза.

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА

Наиболее частые жалобы:

- головная боль (22%)
- боль в груди (27%)
- одышка (22%)
- неврологический дефицит (21%)
- психомоторное возбуждение (10%)
- носовые кровотечения (5%)

При осмотре важно выявить:

- Очаговые неврологические симптомы, проявления нарушения сознания (ступор, кома).
- Острые изменения со стороны глазного дна (отек, геморрагии, экссудация, симптомы закрытоугольной глаукомы),
- Кардиоваскулярные синдромы (признаки отека легких, ХСН, набухание шейных вен, периферические отеки).
- Проверить симметричность АД и пульса на обеих руках.
- Провести пальпацию и аускультацию живота



ОСЛОЖНЕННЫЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ

Осложненный ГК (критический, экстренный, жизнеугрожающий, emergency) сопровождается развитием острого клинически значимого и потенциально фатального повреждения органовмишеней, что требует экстренной госпитализации (обычно в блок интенсивной терапии) и немедленного снижения АД с применением парентеральных антигипертензивных средств.



К осложненных гипертоническим кризам относятся:

- 1. острая гипертоническая энцефалопатия
- 2. острое нарушение мозгового кровообращения
- 3. внутримозговое кровоизлияние
- 4. острая сердечная недостаточность
- 5. острый коронарный синдром
- 6. острая почечная недостаточность
- 7. расслаивающая аневризма аорты
- 8. тяжелое артериальное кровотечение
- 9. эклампсия
- 10. феохромоцитома
- 11. послеоперационное кровотечение

Неосложненный гипертонический криз

Неосложнённый гипертонический криз (hypertensive urgencies) – повышение АД более 180/100 мм рт. ст. (или на 30% от обычных для больного цифр АД), при этом отсутствует необходимость в неотложной терапии, а также нет признаков поражения органов мишеней (острая ЛЖ недостаточность, инсульт/ТИА, стенокардия, ИМ, расслаивающая аневризма аорты и др.). Экстренной госпитализации не требует.

Проект Национальные рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии, ВНОК

При всей неоднородности клинических проявлений и наличие различных патогенетических проявлений и вариантов, гипертонический криз требует дифференцированного подхода к тактическим приемам по выведению пациентов из этого состояния.

«Цель терапии - не просто снизить повышенное артериальное давление, асделать это с определенным темпом, не допуская избыточного снижения АД, избегая, по возможности, развития побочных эффектов, не превышая разумного числа назначений»



European Society of Hypertension Scientific Newsletter: Update on Hypertension Management

8-12 h

Sedation

2006: 7: No. 28

Table 3. Drugs for hypertensive emergencies					
Drug	Dose	Onset	Duration	Adverse effects	
Sodium nitroprussiate	0.25–10 e μg/kg/min	Immediate	1–2 min	Hypotension, vomiting, cyanate toxicity	
Labetalol	20–80 mg bolus 1–2 mg/min infusion	5–10 min	2–6 h	Nausea, vomiting, heart block, bronchospasm	
Glyceryl trinitrate	5–100 μg/min	1–3 min	5–15 min	Headache, vomiting	
Enalaprilat	1.25–5.00 mg bolus	15 min	4–6 h	Hypotension, renal failure, angioedema	
Furosemide	40–60 mg	5 min	2 h	Hypotension	
Fenoldopam	0.1–0.6 μg/kg/min	5–10 min	10–15 min	Hypotension, headache	
Nicardipine	2–10 mg/h	5–10 min	2–4 h	Reflex tachycardia, flushing	
Hydralazine	10–20 mg bolus	10 min	2–6 h	Reflex tachycardia	
Phentolamine	5–10 mg/min	1–2 min	3–5 min	Reflex tachycardia	

3-4 min

25-50 mg bolus

Urapidil

Гипертонический криз

	Экстренная ситуация	Срочная ситуация
Поражение органов- мишеней	Присутствует	Мало выражено или отсутствует
Угроза жизни	Чаще есть	Нет
Снижение АД	Немедленно(до 1 часа)	Плавно (до суток)
Терапия	Парентеральная	Пероральная



СКОРОСТЬ СНИЖЕНИЯ АД ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ

В течение 30 – 120 минут

В течение 2 – 6 часов

Далее

_____ снижение АД на 15 – 25%

_____ уровень АД 160/100 мм Hg


пероральные препараты

Резкое снижение АД до нормальных значений противопоказано, т.к. может привести к гипоперфузии, ишемии вплоть до некроза!!!

Динамика САД на фоне введения эналаприлата



Динамика САД на фоне введения адалата



"Почти каждый из используемых препаратов может снизить или снижает высокое давление при повторном применении"

Norman M. Kaplan, 1996



European Society of Hypertension Scientific Newsletter: Update on Hypertension Management

2006: 7: No. 28

Drug	Dose	Time to peak	Half life	Side effects
Captopril	12.5–25 mg p.o.	15–60 min	1.9 h	Renal failure in patients with renal artery stenosis
Labetalol	200–400 mg p.o.	20–120 min	2.5–8 h	Bronchospasm, depression of myo- cardial contractility, A-V block, nausea, elevation of liver enzymes
Furosemide	25–50 mg p.o.	1–2 h	0.5–1.1 h	Volume depletion
Amlodipine	5–10 mg p.o.	1–6 h	30–50 h	Headache, tachycardia, flushing, peripheral edema
Felodipine	5–10 mg p.o.	2–5 h	11–16 h	Headache, tachycardia, flushing, peripheral edema
Isradipine	5–10 mg p.o.	1–1.5 h	8–16 h	Headache, tachycardia, flushing, peripheral edema
Prazosin	1–2 mg p.o	. 1–2 h	2–4 h	Syncope (first dose), palpitations, tachycardi orthostatic hypotension


Скорость снижения ад при неосложненном гипертоническом кризе

Лечение необходимо начинать немедленно, скорость снижения АД не должна превышать 25% за первые 2 часа, с последующим достижением целевого АД в течение нескольких часов (не более 24 – 48 часов) от начала терапии.

При неосложненном ГК возможно как внутривенное, так и пероральное применение антигипертензивных лекарственных средств (в зависимости от выраженности повышения АД и клинической симптоматики).

Проект Национальные рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии, ВНОК





Оптимальное Снижение Артериального Давления при неосложненных гипертонических кризах у больных с Артериальной гипертензией (ОСАДА)

Координатор: академик Е.И. Чазов

Главные исследователи: профессор И.Е. Чазова

профессор С.Н. Терещенко

Ответственные исполнители: к.м.н. И.П. Колос

Статистическая обработка к.м.н. А.Г Кочетов

При поддержке ВНОК и фонда «Артериальная гипертония»

Центры-участники

Чазова И.Е. (Москва) Терещенко С.Н. (Москва) Белялов Ф.И. (Иркутск) Арутюнов Г.П. (Москва) Волкова Э.Г. (Челябинск) Архипов М.В. (Екатеринбург) Галявич А.С. (Казань) Недогода С.В. (Волгоград) Кательницкая Л.И. (Ростов-на-Дону) Бабкин А.П. (Воронеж) Назарова О.А. (Иваново) Сусликов А.В. (Пущино, МО) Лазебник Л.Б. (Москва) Медведева И.В. (Тюмень) Карпов Р.С. (Томск)

Задачи исследования ОСАДА І


- 1. Определить наиболее часто используемые препараты для купирования НГК
- 2. Определить риск развития ИМ, ОНМК, ХСН, гипертрофии миокарда ЛЖ (ГЛЖ) и ишемии миокарда у пациентов с АГ и частыми НГК
- 3. Оценить эффективность применения короткодействующих антигипертензивных препаратов для купирования НГК
- 4. Оценить безопасность купирования НГК

Промежуточные результаты исследования ОСАДА I


Обработано 860 карт больных с неосложненным гипертоническим кризом

Показатель	Редкие НГК (n -429)	Частые НГК (n -431)	р
Возраст, лет	62.04±11.9	63.8±11.3	<0.05
Пол, % (м/ж)	40/60	36/64	>0.05
Длительность АГ, лет	9.54±8.0	11.37±8.88	0.002
Курение, % (да/нет)	20/80	20/80	>0.05
Диуретики, % (да/нет)	56/44	50/50	>0.05
Сахарный диабет, % (да/нет)	18/82	24/76	>0.05
ХПН, % (да/нет)	11/89	12/88	>0.05
OX >6.5 ммоль/л, % (да/нет)	30/70	32/68	>0.05
Мочевая кислота >133 мкмоль/л (мужчины) и >14 мкмоль/л (женщины), % (да/нет)	5/95	3/97	>0.05

Определение относительного риска (OR) развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с AГ и HГК




Лечение гипертонического криза



Динамика АД на фоне терапии




Достижение целевого уровня АД (160/90 мм рт. ст.)



Эффективность терапии

- через 30 минут у 10,5% САД и у 13,5% ДАД достигли 160/90 мм Hg;
- у 14.2% САД и у 7.3% ДАД снизились более чем на 25% через 30 минут лечения;
- через 60 минут у 31.8% САД и у 29.9% ДАД достигли 160/90 мм Нg;
- у 31.89% САД и у 22.97% ДАД снизились более чем на 25% через 60 минут лечения.

Частота развития побочных эффектов при лечении НГК




Наиболее часто встречались: гиперемия кожных покровов, жар, кожный зуд, сердцебиение, головокружение, слабость.

Каптоприл ■ Нифедипин ■ Клонидин ■ MgSO4 ■ Другие


ТЕРАПИЯ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ

Препараты	Дозы	Начало действия
Клонидин	0,075 — 0,15 мг	30 — 60 мин
Каптоприл	12,5 –25 мг	15 — 60 мин (per os) 15 — 30 мин (п/я)
Карведилол	12,5 — 25 мг	30 — 60 мин
Фуросемид	40 — 80 мг	30 — 60 мин

Влияние антигипертензивных препаратов при неосложнённом гипертоничеком кризе на САД



Влияние антигипертензивных препаратов при неосложнённом гипертоническом кризе на ДАД





АЛЬБАТРОС

ОТКРЫТОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ МНОГОЦЕНТРОВОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА АЛЬБЕТОР (Проксололол) И ПРЕПАТА ЭНАЛАПРИЛАТ У БОЛЬНЫХ **НЕОСЛОЖНЕННЫМ** ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ



Список участников исследование АЛЬБАТРОС

- 1. Галявич А.С. (Казань)
- 2. Гринштейн Ю.И. (Красноярск)
- 3. Карпов Р.С. (Томск)
- 4. Киселев А. Р. (Саратов)
- 5. Кобалава Ж.Д. (Москва)
- 6. Конради А.О. (С. Петербург)
- 7. Лопатин Ю.М. (Волгоград)
- 8. Поздняков Ю.М. (Московская обл)
- 9. Скибитцкий В.В. (Краснодар)
- 10. Терещенко С.Н. (Москва)
- 11. Шутемова Е.А. (Иваново)




Цели исследования *А*ЛЬБ*А*ТРОС

Оценка эффективности и безопасности применения препарата проксодолола по сравнению с препаратом Эналаприлат у больных с неосложненным гипертоническим кризом.


Динамика систолического АД на фоне применения проксадолол и Эналаприлата



Динамика диастолического АД на фоне применения проксадолол и Эналаприлата



Динамика ЧСС на фоне применения проксадолол и Эналаприлата



Без поражения органов-мишеней, но с выраженной клинической симптоматикой

↑САД ЧСС>70 уд/мин



Бета-блокаторы Начало действия 30- 60 мин

↑ДАД ЧСС<70 уд/мин



Капотен 12,5 – 25 мг Начало действия 15- 60мин

С типичным приступом стенокардии, ЧСС норма или тахикардия



Бета-блокаторы Начало действия 30-60 мин

Больные СН с ↑САД и ДАД




Капотен 12,5 – 25 мг Начало действия 15- 60мин Фуросемид 40 – 80 мг Начало действия 30- 60 мин

ПОКАЗАНИЯ К ЭКСТРЕННОЙ ГОПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ

- ГК, не купирующийся на догоспитальном этапе;
- ГК с выраженными проявлениями гипертонической энцефалопатии;
- Осложнения ГБ, требующие интенсивной терапии и постоянного врачебного наблюдения: МИ, субарахноидальное кровоизлияние, остро возникшие нарушения зрения, отек легких и др.;
- -Злокачественная АГ.

Проект Национальные рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии, ВНОК

Приведенные выше рекомендации основаны на мнении экспертов, а не на сведениях, удовлетворяющих требованиям доказательной медицины.



«У некоторых больных с неосложнённым гипертоническим кризом эффективны такие короткодействующие препараты для приёма внутрь как каптоприл, лабеталол или клонидин. Тем не менее, не доказано, что агрессивное снижение АД в БИТ приводит к улучшению краткосрочного прогноза у больных с тяжёлой АГ»