




Гусейнов Т.Ю., Чайко Н.В.

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНОЙ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ**

Санаторий-профилакторий ФГОУ ВПО МГАУ им. В.П.Горячкина

Москва




Эпидемиологические исследования хронических болевых синдромов выявляют, что первые два места среди них стабильно занимают:

-болевые синдромы, связанные с патологией позвоночника -головная боль.

Периодические головные боли, вносящие дискомфорт в повседневную жизнь испытывают от 30 до 78% населения.

У 10-20% населения головная боль является прямой причиной снижения качества жизни и работоспособности.


Исследования этой проблемы применительно к



Студенты (213 человек), проходившие лечение в санатории-профилактории МГАУ им. В. П. Горячкина в течение одного учебного года, опрошены на наличие головной боли. Для анализа и последующей диагностики отобраны случаи соответствующие следующим критериям:

- частота ГБ более 1 раза в месяц
- длительность не менее 6 месяцев
- студент считает, что головная боль снижает качество жизни и, в частности, мешает учебе.


Результаты




- Головная боль выявлена у 61 человека (28,6%).
- Среднее число дней головной боли в месяц составило $9,5 \pm 7,47$.
- У 18% студентов с головной болью, отмечена ее хроническая форма с частотой 15 и более в месяц.

Таким образом, у 5% студентов выявлена хроническая форма головной боли

Диагностическое распределение головной боли



- (1.1) мигрень без ауры (код по ICHD).
- (2.2.2) частая эпизодическая головная боль напряжения не ассоциированная с болезненностью перикраниальных мышц.
- (2.2.1 и 2.3.2) - частая эпизодическая или хроническая головная боль напряжения ассоциированная с болезненностью перикраниальных мышц.
- цервикогенная ГБ по критериям Sjaastad.




Методом пальпации, микроволновой термометрии и гониометрии С1-2 позвонков у **90% студентов с головной болью выявлены мышечно-фасциальные расстройства перикраниальной и шейной областей.**

Микроволновая радиотермометрия - неинвазивный метод измерения температуры на глубине до 5 см.


Способ диагностики шейных мышечных расстройств при головной боли с помощью радиотермометрии рекомендован МЗ РФ к применению.

Контрольные точки измерения микроволнового излучения.



Радиотермограмма в норме

Шаг изотерм- 0.120°C





34.61 34.85 35.09 35.33 35.57 35.81 36.05 36.29 36.53 36.77 37.01

Температура(°C): минимальная- 35.4, средняя- 35.8, максимальная- 36.2

Радиотермограмма при ГБ с синдромом мышечно-суставной дисфункции



Шаг изотерм- 0.120°C



Температура[°C]: минимальная- 35.1, средняя- 36.9, максимальная- 37.9

Радиотермограмма с ГБ до лечения



Шаг изотерм- 0.120°C




Температура(°C): минимальная- 34.2, средняя- 35.3, максимальная- 36.3

Радиотермограмма С ГБ после лечения

Шаг изотерм- 0.120°C



Температура[°C]: минимальная- 32.9, средняя- 34.5, максимальная- 35.4



Наличие диагностированных мышечно-фасциальных расстройств являлось показанием к применению метода лечения

Метод лечения рекомендован МЗ РФ к применению и включает:

- низкоинтенсивную лазерную терапию
- адаптированную мануальную терапию
- обучение технике изометрической мышечной ауторелаксации шейно-затылочной области.


Низкоинтенсивную лазерную терапию проводили аппаратом «Мустанг». Облучали область коротких затылочных мышц, суставов С0-С3, позвоночной артерии и затылочных нервов. В случаях выраженной или распространенной мышечной болезненности дополнительно назначали сеансы внутривенного лазерного облучения крови (аппарат «Мулат», 2 мВт, 10 мин, 5 сеансов).

Результаты лечения оценивали через 3 месяца после курса на основании:


1. общей оценки результата лечения категоричной словесной шкалой
2. динамики числа дней головной боли в месяц
3. изменении интенсивности боли

Через 3 месяца после лечения:

1. хорошие и отличные результаты отмечены в 78.2% случаев
средние в 12,7% случаев
отсутствие результатов в 9,1 % случаев.
2. число дней головной боли в сравнении с исходом уменьшилось на 74,7 % ($p < 0.001$)
3. интенсивность боли в сравнении с исходом уменьшилось на 45,5% ($p < 0.001$)



- У студентов ВУЗа отмечена высокая частота головной боли. Частота такого порядка описана в эпидемиологических исследованиях популяции от 18 до 65 лет. Возраст студентов колебался от 18 до 22 лет.
- Значительная часть случаев ГБ (90%) сопровождается мышечно-фасциальными и суставными нарушениями области шеи. Это может быть частным следствием известной проблемы состояния опорно-двигательного аппарата учащейся молодежи.
- Метод лечения головной боли направленный на нормализацию состояния мышц и позвоночника шейной области показал высокую эффективность.



Полноценной профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата может быть только комплексная система социальных и организационных мероприятий, большинство из которых не решаются в рамках отдельного вуза, а требуют государственной поддержки и финансирования. В основе этих мероприятий должна лежать пропаганда и стимуляция здорового активного образа жизни молодежи и создание условий для этого. Это оснащение учебных учреждений тренажерами медицинского назначения (лечебно-диагностическими комплексами реабилитации и профилактики заболеваний позвоночника), эргономическими местами для обучения и сна.