

# Медицинская помощь больным с острым коронарным синдромом на догоспитальном этапе

Проф. С.Н. Терещенко  
16.09.08

# Определение острого коронарного синдрома

Любая группа клинических признаков, свидетельствующих о *недавнем* обострении заболевания, позволяющих заподозрить инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию

# ОСТРЫЕ КОРОНАРНЫЕ СИНДРОМЫ


БЕЗ ПОДЪЕМА ST

ПОДЪЕМ ST

ИМ без ST  
подъема

НЕСТАБИЛЬНАЯ  
СТЕНОКАРДИЯ

ИМ без Q Q ИМ



Термин «ОКС» не является диагнозом,  
это скорее «ярлык», ориентирующий  
врача в стратегии раннего лечения  
больного

# Патогенез острого коронарного синдром

Разрыв ранимой атеросклеротической бляшки

- внутрикоронарный тромбоз
- изменение геометрии бляшки
- дистальная эмболизация
- локальный спазм

Спазм коронарной артерии

- в месте стеноза
- без видимого стеноза

↑ потребности миокарда в кислороде при значимых стенозах

↓ доставки кислорода к миокарду при значимых стенозах

Появление/усугубление ишемии миокарда

Симптомы обострения КБС (острый коронарный синдром)

# Цели лечение острого коронарного синдрома

Улучшить прогноз

Устранить симптомы  
и синдромов

↓ смертности  
↓ частоты ИМ  
↓ осложнений

- боль
- СН
- аритмии
- ...

# Основные задачи, стоящие при первом осмотре

- Оказание неотложной помощи
- Оценка предположительной причины развития боли в грудной клетке (ишемическая или неишемическая)
- Оценка ближайшего риска развития жизнеугрожающих состояний
- Определение показания и места госпитализации.

## Тактика врача при ОКС на догоспитальном этапе

- Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз.



# Диагностика ОКС


1. Клиника

2. ЭКГ

3. Биомаркер повреждения :  
тропонины

# МНОГОЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЕЙ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ

ОСТРАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА БЫЛА ОБНАРУЖЕНА ПРИ ....



*Lee T., Cook E., et al. 1985*

Дифференциальный диагноз  
болей в груди – не только  
клиническая, но и  
**организационная**  
проблема, решаемая в  
диагностических отделениях для  
пациентов с болью в груди

# ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОКС НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз.
- Показание к госпитализации и транспортировка.

Малейшее подозрение (вероятный ОКС) в отношении ишемического генеза болей в грудной клетке, даже при отсутствии характерных электрокардиографических изменений, должны являться поводом для незамедлительной транспортировки больного в стационар.

# ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОКС НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз.
- Показание к госпитализации и транспортировка.
- Догоспитальная оценка уровня риска смерти и развития ОИМ у больных ОКС без подъема сегмента ST.

# Стратификация риска при ОКС без $\uparrow$ ST

Острый риск неблагоприятных исходов при ОКС без  $\uparrow$ ST  
(оценивается при наблюдении)

## Высокий

- возобновляющаяся стенокардия
- динамические смещения сегмента ST (чем распространеннее, тем хуже прогноз)
- ранняя постинфарктная стенокардия
- $\uparrow$  сердечные тропонины (чем выше, тем хуже прогноз)
- сахарный диабет
- гемодинамическая нестабильность
- серьезные аритмии

## Низкий

- за время наблюдения ишемия не возобновляется
- нет депрессий сегмента ST
- не  $\uparrow$  маркеры некроза миокарда
- нормальный уровень сердечного тропонина при двукратном определении с интервалом минимум в 6 часов

# ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ ОКС НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

- Первоначальная оценка больных с болью в грудной клетке. Дифференциальный диагноз.
- Показание к госпитализации и транспортировка.
- Догоспитальная оценка уровня риска смерти и ИМ у больных ОКС.
- **Лечение ОКС на догоспитальном этапе.**



Больной с подозрениe на ОКС  
должен лечиться так же, как  
больной с ОКС

# Основные принципы лечения больных ОКС без подъема сегмента ST на догоспитальном этапе

- Адекватное обезболивание.

# Оказание неотложной помощи

## Обезболивание

---

Нитроглицерин 0,4 мг п/я или спрей при сАД >90



При неэффективности, через 5 мин



Нитроглицерин 0,4 мг п/я или спрей при сАД >90

При неэффективности → «03»

Морфин (особенно при возбуждении, остром сердечной недостаточности) В/в  
2-4 мг + 2-8 мг каждые 5-15 мин *или* 4-8 мг + 2 мг каждые 5 мин *или* по  
3-5 мг до купирования боли




В\в нитроглицерин при АД >90 mm Hg, если есть боль,  
острый застой в легких, высокое АД

# Основные принципы лечения больных ОКС без подъема сегмента ST на догоспитальном этапе

- Адекватное обезболивание
- Антитромботическая терапия.

# Влияние аспирина и гепарина на сумму случаев смерти и ИМ при ОКС без $\uparrow$ ST Мета-анализ проведенных исследований



# Факторы, влияющие на выбор антитромботического лечения ОКС без стойких

↑ ST

Характер ишемии миокарда и время после последнего эпизода

Риск неблагоприятного исхода (ИМ, смерть) в ближайшее время

Подход к ведению больного

- инвазивный
- консервативный

Риск кровотечений

Функция почек

Клиническое суждение о наличии продолжающегося внутрикоронарного тромбоза

# Аспирин при ОКС без ↑ ST. Современные рекомендации

	Начальная доза	Длительное применение	Класс
Европейское кардиологическое общество, ОКС без ↑ ST (2002 г.)	75-150 ≤100 с клопидогрелом		I (A)
Американские коллегия кардиологов и ассоциация сердца, ОКС без ↑ ST (2002 г.)	162-325	75-160	I (A)
Российские рекомендации, ОКС без ↑ ST (2004 г.)	250-500	75-325, затем 75-160 (150)	-
Европейское кардиологическое общество, антиагреганты (2004 г.)	160-300	75-100	I (A)
Американская коллегия торакальных врачей (2004 г.)	160-325	75-162	I (A)

# Гепарин при ОКС без стойких $\uparrow$ ST на ЭКГ

48-72 ч от боли

- В/в инфузия НФГ
- П/к инъекции НМГ

Наблюдение 6-12 часов

Высокий риск  
тромботических осложнений

- $\downarrow$  ST
- $\uparrow$  тропонин
- ...

Введение от 2 до 8 суток  
(по решению врача)

Нет признаков высокого риска  
тромботических осложнений

- нет  $\downarrow$  ST
- нормальный тропонин  
(двукратно с интервалом  $>6$  часов)



Отмена гепарина



# Добавление клопидогрела при ОКС без $\uparrow$ ST

## Исследование CURE (n=12 562)

С-с смерть, ИМ, инсульт, тяжелая ишемия



Месяц  
ы

# Клопидогрел в добавление к аспирину при ОКС без $\uparrow$ ST

## Современные рекомендации

Клопидогрел (нагрузочная доза 300 мг, затем 75 мг/сут)  
как можно раньше


	Длительность	Класс
Европейское кардиологическое общество (2002 г.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• минимум 9 мес</li><li>• возможно 12 мес</li></ul>	I (B)
Американские коллегия кардиологов и ассоциация сердца (2002 г.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• минимум 1 мес</li><li>• до 9 мес</li></ul>	I (A) I (B)
Российские рекомендации (2004 г.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• примерно 1 год</li></ul>	-
Американская коллегия торакальных врачей (2004 г.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9-12 мес</li></ul>	I (A)
Европейское кардиологическое общество, ЧКВ (2005 г.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9-12 мес</li></ul>	I (B)

# Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST



# Распространенность инфаркта миокарда

рост заболеваемости в 14 странах




\*Projected populations of people aged over 50 years, and estimated prevalence of myocardial infarction and ischemic stroke cumulated in 14 countries: Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA

Guillot F, Moulard O. *Circulation* 1998; 98(abstr suppl 1): 1421




# Динамика смертности от инфаркта миокарда

Прирост смертности за 5 лет - 2,8%





# Смертность от инфаркта миокарда в 2006 году





# Российские рекомендации

## «Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ»

Приняты на конгрессе ВНОК

11.10.2007

## Список членов комитета экспертов

**Члены комитета экспертов:** д.м.н. Аверков О.В. (Москва), чл.-корр. РАМН, профессор Алекян Б.Г. (Москва), академик РАМН, профессор Акчурина Р.С. (Москва), профессор Аронов Д.М. (Москва), профессор Архипов М.В. (Екатеринбург), профессор Барбараш О.Л. (Кемерово), чл.-корр. РАМН, профессор Белоусов Ю.Б. (Москва), профессор Белялов Ф.И. (Иркутск), чл.-корр. РАН, академик РАМН, профессор Беленков Ю.Н. (Москва), профессор Бойцов С.А. (Москва), профессор Васильева Е.Ю. (Москва), профессор Волкова Э.Г. (Челябинск), профессор Габинский Я.Л. (Екатеринбург), профессор Галявич А.С. (Казань), академик РАМН, профессор Голиков А.П. (Москва), профессор Гринштейн Ю.И. (Красноярск), профессор Груздев А.К. (Москва), профессор Довгалецкий П.Я. (Саратов), д.м.н. Затейчиков Д.А. (Москва), профессор Иоселиани Д.Г. (Москва), академик РАМН, профессор Карпов Р.С. (Томск), профессор Кательницкая Л.И. (Ростов-на-Дону), д.м.н. Космачева Е.Д. (Краснодар), профессор Коц Я.И. (Оренбург), профессор Куимов А.Д. (Новосибирск), профессор Лопатин Ю.М. (Волгоград), профессор Люсов В.А. (Москва), профессор Марков В.А. (Томск), академик РАМН, профессор Мартынов А.И. (Москва), академик РАМН, профессор Моисеев В.С. (Москва), академик РАМН, профессор Оганов Р.Г. (Москва), профессор Перепеч Н.Б. (Санкт-Петербург), профессор Самко А.Н. (Москва), профессор Сулимов В.А. (Москва), профессор Сыркин А.Л. (Москва), профессор Туев А.В. (Пермь), профессор Хрусталев О.П. (Ярославль), академик РАН, академик РАМН, профессор Чазов Е.И. (Москва), профессор Шалаев С.В. (Тюмень), профессор Шальнова С.А. (Москва), чл.-корр. РАМН, профессор Шляхто Е.В. (Санкт-Петербург), профессор Шпектор А.В. (Москва), профессор Якушин С.С. (Рязань).

**Рабочая группа по подготовке текста рекомендаций:** профессор Руда М.Я. (председатель), профессор Голицын С.П., профессор Грацианский Н.А., к.м.н. Комаров А.Л., профессор Панченко Е.П., д.м.н. Староверов И.И., профессор Терещенко С.Н., д.м.н. Явелов И.С.





# Проявления ишемии миокарда



- Сильная боль за грудиной сжимающая, давящая
- Испарина, липкий холодный пот
- Тошнота, рвота
- Одышка
- Слабость, коллапс

# Клинические варианты ИМ

		%	
<i>status anginosus</i>	89		65,6
<i>status asthmaticus</i>	7		10,5
<i>status gastralgicus</i>	1		6,7
аритмический	2		14,3
церебральный	1		-
бессимптомный	-		2,9
	<hr/>		<hr/>
	616 чел		105 чел

# Критерии инфаркта миокарда

Термин “ИМ” используется при наличии признаков некроза миокарда у больного с клинической картиной ишемии миокарда.

- Характерные жалобы, обусловленные ишемией
- Появление патологического Q-зубца на ЭКГ
- Изменения ЭКГ, связанные с ишемией (элевация/депрессия ST-сегмента, блокада ЛНПГ)
- появление признаков потери жизнеспособного миокарда или нарушений локальной сократимости при использовании методик, позволяющих визуализировать сердце
- Инвазивные манипуляции на коронарных сосудах (такие как коронарная ангиопластика)



# Прогноз при инфаркте миокарда определяется

- ✓ применением ТЛТ
- ✓ размерами очага некроза
- ✓ степенью выраженности дисфункции левого желудочка
- ✓ артериальная гипотония САД менее 100 мм рт ст
- ✓ наличием и степенью выраженности остаточной ишемии миокарда
- ✓ наличием серьезных нарушений ритма
- ✓ возраст



# InTIME II: Оценка риска у больных ОИМ в ближайшие 30 суток \*



\* при условии проведения тромболитической терапии



# Догоспитальное лечение острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST



# Организация работы СМП при ОИМ

Лечение больного ИМпСТ представляет собой единый процесс, начинающийся на догоспитальном этапе и продолжающийся в стационаре. Для этого бригады СМП и стационары, куда поступают больные с ОКС, должны работать по единому алгоритму, основанному на единых принципах диагностики, лечения и единому пониманию тактических вопросов

- Двухступенная система, когда при подозрении на ИМ линейная бригада СМП вызывает на себя «специализированную», которая собственно начинает лечение и транспортирует больного в стационар, ведет к неоправданной потере времени
- Каждая бригада СМП (в том числе и фельдшерская) должна быть готова к проведению активного лечения больного ИМпСТ



# Организация работы СМП при ОИМ

- Любая бригада СМП, поставив диагноз ОКС, определив показания и противопоказания к соответствующему лечению, должна купировать болевой приступ, начать антитромботическое лечение, включая введение тромболитиков (если не планируется инвазивное восстановление проходимости коронарной артерии), а при развитии осложнений – нарушений ритма сердца или острой сердечной недостаточности – необходимую терапию, включая мероприятия по сердечно-легочной реанимации
- Бригады СМП в каждом населенном пункте должны иметь четкие инструкции, в какие стационары необходимо транспортировать больных ИМпST или с подозрением на ИМпST
- Врачи этих стационаров при необходимости оказывают СМП





## Линейная бригада СМП должна быть оснащена необходимым оборудованием

1. Портативный ЭКГ с автономным питанием;
2. Портативный аппарат для ЭИТ с автономным питанием с контролем за ритмом сердца;
3. Набор для проведения сердечно-легочной реанимации, включая аппарат для проведения ручной ИВЛ;
4. Оборудование для инфузионной терапии, включая инфузоматы и перфузоры;
5. Набор для установки в/в катетера;
6. Кардиоскоп;
7. Кардиостимулятор;
8. Система для дистанционной передачи ЭКГ;
9. Система мобильной связи;
10. Отсос;
11. Лекарства, необходимые для базовой терапии ОИМ



# Лечение неосложненного ИМпСТ на догоспитальном этапе

Каждая бригада СМП (в том числе и фельдшерская) должна быть готова к проведению активного лечения больного ИМпСТ

## Базовая терапия.

1. Устранить болевой синдром.
2. Разжевать таблетку, содержащую 250 мг АСК.
3. Принять внутрь 300 мг клопидогрела.
4. Начать в/в инфузию НГ, в первую очередь при сохраняющейся стенокардии, АГ, ОСН.
5. Начать лечение  $\beta$ -блокаторами. Предпочтительно первоначальное в/в введение, особенно при ишемии, которая сохраняется после в/в введения наркотических анальгетиков или рецидивирует, АГ, тахикардией или тахиаритмией, без СН.

## Предполагается выполнение первичной ТБА.

Нагрузочная доза клопидогрела - 600 мг.



# Оказание неотложной помощи

## Обезболивание

Нитроглицерин 0,4 мг п/я или спрей при сАД >90



При неэффективности, через 5 мин



Нитроглицерин 0,4 мг п/я или спрей при сАД >90

При неэффективности → «03»

Морфин (особенно при возбуждении, остром сердечной недостаточности) В/в  
2-4 мг + 2-8 мг каждые 5-15 мин *или* 4-8 мг + 2 мг каждые 5 мин *или* по  
3-5 мг до купирования боли



В\в нитроглицерин при АД >90 mm Hg, если есть боль,  
острый застой в легких, высокое АД



# Кислородотерапия

Во всех случаях

2 л/мин через носовые катетеры  
в первые 6 ч

- При насыщение артериальной крови  $O_2 < 90\%$
- сохранение ишемии миокарда

- застой в легких

2-4 (4-8) л/мин через  
носовые катетеры

При тяжелой СН  
вспомогательная и инвазивная  
ИВЛ



# Нитраты при остром инфаркте миокарда

## Показания для применения нитратов

- ишемия миокарда
- острый застой в легких
- необходимость контроля АД

Нет противопоказаний

- САД <90 или >30 мм Hg ниже исходного
- ЧСС <50 и >100
- подозрение на ИМ правого желудочка
- <24 после силденафила, варденафила, <48 ч после тадалафила
- п/я (спрей) по 0,4 мг до 3-х раз каждые 5 минут
- в/в инфузия (5-200 мкг/мин, ↓ среднего АД на 10% у нормотоников, до 30% при гипертензии)

## Дозировка

- в/в при сохранении ишемии




# Нитраты в ранние сроки ИМ Мета-анализ (n=81 908)

11 небольших, в/в  
9 небольших, внутрь

GISSI-3

ISIS-4

Все исследования




риска 5,5%  
 $p=0,03$



# Аспирин и тромболизиз при остром инфаркте миокарда

## 30 дневная летальность



ISIS-2. Lancet 1988;  
2:349-60.



# Клопидогрель в лечении ОИМ

У больных ИМ с  $\uparrow$  ST было показано, что клопидогрель снижает общую смертность и сумму случаев смерти, рецидива ИМ и инсульта.



Терапия клопидогрелем начинается с нагрузочной дозы 300 мг, у лиц старше 75 лет – 75 мг/сутки. Независимо от ТЛТ.

Поддерживающая доза 75 мг/сут в сочетании с аспирином в течение 4 недель.

При ангиопластики в течение 1 года.





# CLARITY + COMMIT: аспирин + клопидогрель при инфаркте миокарда

Добавление клопидогреля к аспирину и тромболитику приводит к:

- 36% частоты окклюзии коронарных артерий, смерти или повторного ИМ - CLARITY-TIMI 28 ( $p < 0.001$ )<sup>1</sup>
- 9% снижению смерти, повторного ИМ или инсульта - COMMIT/CCS-2 ( $2p = 0.002$ )<sup>2</sup>



# Восстановление коронарной перфузии

Основой лечения острого ИМ является восстановление коронарного кровотока – коронарная реперфузия.

Разрушение тромба и восстановление перфузии миокарда приводят к ограничению размеров его повреждения и, в конечном итоге, к улучшению ближайшего и отдаленного прогноза.

Поэтому все больные ИМпST должны быть безотлагательно обследованы для уточнения показаний и противопоказаний к восстановлению коронарного кровотока.



# ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

---

УДК 616.127-005.8-036.11-085.273.55-032:611.132.2

*Е. И. Чазов, Л. С. Матвеева, А. В. Мазаев, К. Е. Саргин, Г. В. Садовская,  
М. Я. Руда*

## **ВНУТРИКОРОНАРНОЕ ВВЕДЕНИЕ ФИБРИНОЛИЗИНА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА**


Всесоюзный кардиологический научный центр (дир.— акад. АМН СССР Е. И. Чазов)  
АМН СССР, Москва

EI Chazov

Ter Arkh vol. 48, 1976



# ТЛТ у больных с ОИМ по данным национальных регистров






# Эффективность ТЛТ при ИМ в зависимости от времени начала лечения

Смерть в первые 35 сут

стрептокиназа, APSAC, урокиназа, t-PA за 3 ч



# Догоспитальный тромболизис: выигрыш во времени = спасение миокарда



Стратегия «Раннего тромболизиса»




# Догоспитальный тромболизис при ИМ с $\uparrow$ ST < 4-6 ч

Среднее время до тромболизиса 104 мин vs 162 мин (p=0,007)

↓ риска 17%

MITI	rt-PA	1993 г.	n=360
EMIP	APSAC	1993 г.	n=5469
GREAT	APSAC	1991 г.	n=311
Roth	rt-PA	1990 г.	n=90
Schofer	урокиназа	1990 г.	n=78
Castaigne	APSAC	1989 г.	n=100
<b>Всего</b>			<b>n=6434</b>


Госпитальная летальность  
p для гетерогенности 0,90



Догосп. ТЛ лучше      Догосп. ТЛ хуже



# Регистр USIC 2000: уменьшение смертности при догоспитальном тромболитизисе




Danchin et al. *Circulation* 2004; 110: 1909–1915.





# Выбор стратегии


## Исследование WEST, n=304





# FAST-MI 2005

Летальность в первые 30 дней



N. Danchin, ESC Congress, 2007

## Контрольный лист

принятия решения врачебно-фельдшерской бригадой СМП о проведении больному с острым коронарным синдромом (ОКС) ТЛТ

Проверьте и отметьте каждый из показателей, приведенных в таблице. Если отмечены все квадратики в столбце «Да» и ни одного в столбце «Нет» то проведение тромболитической терапии больному показано.

При наличии даже одного не отмеченного квадратика в столбце «Да» ТЛТ терапию проводить не следует и заполнение контрольного листа можно прекратить.

	«Да»	«Нет»
Больной ориентирован, может общаться	<input type="checkbox"/>	
Характерный для ОКС болевой синдром и/или его эквиваленты продолжающиеся не менее 15-20 мин., но не более 12 часов	<input type="checkbox"/>	
После исчезновения характерного для ОКС болевого синдрома и/или его эквивалентов прошло не более 3 ч	<input type="checkbox"/>	
Выполнена качественная регистрация ЭКГ в 12 отведениях	<input type="checkbox"/>	
У врача/фельдшера СМП есть опыт оценки изменений сегмента ST и блокады ножек пучка Гиса на ЭКГ (тест только при отсутствии дистанционной оценки ЭКГ специалистом)	<input type="checkbox"/>	
Есть подъем сегмента ST на 1 мм и более в двух и более смежных отведениях ЭКГ или зарегистрирована блокада левой ножки пучка Гиса, которой раньше у больного не было	<input type="checkbox"/>	
У врача/фельдшера СМП есть опыт проведения ТЛТ	<input type="checkbox"/>	
Транспортировка больного в стационар займет более 30 мин	<input type="checkbox"/>	
Имеется возможность получать медицинские рекомендации врача кардиореаниматолога стационара в режиме реального времени	<input type="checkbox"/>	

Возраст более 35 лет для мужчин и более 40 лет для женщин		
Систолическое давление крови не превышает 180 мм рт. ст. Диастолическое давление крови не превышает 110 мм рт. ст.	<input type="checkbox"/>	
Разница уровней систолического давления крови, измеренного на правой и левой руке не превышает 15 мм рт. ст.	<input type="checkbox"/>	
В анамнезе отсутствуют указания на перенесенный инсульт или наличие другой органической (структурной) патологии мозга	<input type="checkbox"/>	
Отсутствуют клинические признаки кровотечения любой локализации (в том числе желудочно-кишечные и урогенитальные) или проявления геморрагического синдрома	<input type="checkbox"/>	
В представленных медицинских документах отсутствуют данные о проведении больному длительной (более 10 мин) сердечно-легочной реанимации или о наличии у него за последние 2 недели внутреннего кровотечения; больной и его близкие это подтверждают	<input type="checkbox"/>	
В представленных медицинских документах отсутствуют данные о перенесенной за последние 3 мес. хирургической операции (в т.ч. на глазах с использованием лазера) или серьезной травме с гематомами и/или кровотечением, больной подтверждает это	<input type="checkbox"/>	
В представленных медицинских документах отсутствуют данные о наличии беременности или терминальной стадии какого-либо заболевания и данные опроса и осмотра подтверждают это	<input type="checkbox"/>	
В представленных медицинских документах отсутствуют данные о наличии у больного желтухи, гепатита, почечной недостаточности и данные опроса и осмотра больного подтверждают это	<input type="checkbox"/>	

ВЫВОД: ГЛР больному \_\_\_\_\_ (ФИО) ПОКАЗАНА ПРОТИВОПОКАЗАНА  
(нужное обвести, ненужное зачеркнуть)

Лист заполнил: Врач / фельдшер (нужное обвести) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Дата \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Контрольный лист передается с больным в стационар и подшивается в историю болезни



# Показания для проведения ТЛТ

Если время от начала ангинозного приступа не превышает 12 часов, а на ЭКГ отмечается подъем сегмента  $ST \geq 0,1 \text{ mV}$ , как минимум в 2-х последовательных грудных отведениях или в 2-х отведениях от конечностей, или появляется блокада ЛНПГ. Введение тромболитиков оправдано в те же сроки при ЭКГ признаках истинного заднего ИМ (высокие зубцы R в правых прекардиальных отведениях и депрессия сегмента ST в отведениях V1-V4 с направленным вверх зубцом T).



# Противопоказания для проведения ТЛТ

## Абсолютные противопоказания к ТЛТ

- ранее перенесенный геморрагический инсульт или НМК неизвестной этиологии;
- ишемический инсульт, перенесенный в течение последних 3-х месяцев;
- опухоль мозга, первичная и метастатическая;
- подозрение на расслоение аорты;
- наличие признаков кровотечения или геморрагического диатеза (за исключением менструации);
- существенные закрытые травмы головы в последние 3 месяца;



# Противопоказания для проведения ТЛТ

## Относительные противопоказания:

- устойчивая, высокая, плохо контролируемая АГ в анамнезе;
- АГ - в момент госпитализации – АД сис. >180 мм рт.ст., диаст. >110 мм рт.ст);
- ишемический инсульт давностью более 3 месяцев;
- деменция или внутричерепная патология, не указанная в «Абсолютных противопоказаниях»;
- травматичная или длительная (более 10 мин), сердечно-легочная реанимация или оперативное вмешательство, перенесенное в течение последних 3-х недель;
- недавнее (в течение предыдущих 2-4-х недель) внутреннее кровотечение;
- пункция сосуда, не поддающегося прижатию;
- для стрептокиназы – введение стрептокиназы более 5 суток назад или известная аллергия на нее;
- беременность;




# Тромболитические препараты

Альеплаза	Внутривенно 1 мг/кг массы тела (но не более 100 мг): болюс 15 мг; последующая инфузия 0,75 мг/кг массы тела за 30 мин (но не более 50 мг), затем 0,5 мг/кг (но не более 35 мг) за 60 минут (общая продолжительность инфузии 1,5 часа)
Пууролаза	Внутривенно: болюс 2000000 МЕ и последующая инфузия 4000000 МЕ в течение 30-60 мин.
Стрептокиназа	Внутривенно инфузионно 1500000 МЕ за 30-60 минут.)
Тенектеплаза	Внутривенно болюсом: 30 мг при массе <60 кг, 35 мг при 60-70 кг, 40 мг при 70-80 кг; 45 мг при 80-90 кг и 50 мг при массе тела >90 кг.





# Инвазивная реканализация коронарной артерии



Не менее 200 ангиопластик в год, из которых 35-40 первичные.  
Личный опыт оператора – не менее 75 процедур в год)



# Тромболитическая терапия предпочтительнее, если:

- Давность инфаркта миокарда не более 3 часа
- Проведение ТБА невозможно (нет ангиографии или лаборатория занята, есть проблемы с сосудистым доступом, нет возможности доставить больного в ангиографическую лабораторию или недостаточен навык исследователя);
- ТБА не может быть проведена в течение 90 мин после первого контакта с медицинским персоналом, а также когда ожидаемое время задержки между первым раздуванием баллона в КА и началом ТЛТ



# Инвазивная стратегия предпочтительнее, если:

- Имеется ангиографическая лаборатория и опытный исследователь, выполняющий не менее 75 первичных ТБА в год, а время от первого контакта с медицинским персоналом до раздувания баллона в КА не превышает 90 мин;
- У больного тяжелые осложнения ИМ: кардиогенный шок, острая СН, угрожающие жизни аритмии;
- Имеются противопоказания к ТЛТ: высокий риск кровотечений и геморрагического инсульта;
- Поздняя госпитализация больного: длительность симптомов ИМпСТ >3 часов.
- Имеются сомнения в диагнозе ИМ или предполагается



# Инфаркт миокарда и НФ гепарин

- **Сопровождение ТЛТ или высокий риск артериального тромбоза.**

В/в болюс 60 МЕ/кг (не более 4000 МЕ), далее инфузия со скоростью 12 МЕ/кг/ч (не более 1000 МЕ/ч). Подбор дозы под контролем АЧТВ (в 1,5-2 раза выше нормы). АЧТВ определять через 3, 6, 12 и 24 ч от начала терапии. Через 6 часов после каждого изменения дозы. Длительность инфузии 24-48 часов.

- **Сопровождение ТБА.**

В\в болюс 70-100 МЕ/кг (при сопутствующем применении блокаторов ГП IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов). Уточнение дозировки под контролем АВС, которое должно составлять 300-350 сек. Первое определение АВС через 2-5 минут после болюса НФГ, затем каждые 20-30 минут на протяжении всей процедуры ТБА. При необходимости дополнительные болюсные введения НФГ 20 МЕ/кг. Применение НФГ прекращается после успешного окончания процедуры.

- **Профилактика венозного тромбоза и тромбоемболии легочной артерии:**

П/к введение 7500-12500 МЕ 2 раза в сутки или 5000 МЕ 3 раза в сутки (контроля АЧТВ не требуется).



# Инфаркт миокарда и эноксипарин

## ■ Сопровождение ТЛТ или высокий риск артериального тромбоза

В/в болюс 30 мг, далее п/к в дозе 1 мг/кг 2 раза в сутки до 8-го дня болезни. Первые 2 дозы для п/к введения не должны превышать 100 мг. У лиц старше 75 лет начальная в/в доза не вводится. Поддерживающая уменьшается до 0,75 мг/кг (первые 2 дозы не должны превышать 75 мг).

При клиренс креатинина менее 30 мл/мин препарат вводится п/к в дозе 1 мг/кг один раз в сутки.

## ■ Сопровождение ТБА


Если после п/к инъекции 1 мг/кг прошло не более 8 ч, дополнительного введения не требуется. Если этот срок составляет 8-12 часов, то непосредственно перед ТБА следует ввести эноксапарин в/в в дозе 0,3 мг/кг.

## ■ Профилактика венозного тромбоза и тромбозэмболии легочной артерии

Рекомендации. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. АКТ. 2007 г. ВНОК  
Подкожно 40 мг 1 раз в сутки.



# Мета-анализ исследований с ранним в/в введением бета-адреноблокаторов при ИМ (n=52 411)







# БЕТА-БЛОКАТОРЫ: ПРИМЕНЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ОКС В 59 РОССИЙСКИХ ЦЕНТРАХ

## Данные регистра GRACE (2000-1 гг.)

N=2806  
 С ↑ST – 50.3%  
 Без ↑ST – 49.7%

- 1 Предш. 7 дней
- 2 Первые 24 час.
- 3 В период госпитализации
- 4 Рекоменд. при выписке





# В\в введение бета-адреноблокаторов при остром инфаркте миокарда

С первых часов/суток

Для устранения  
симптомов

Всем без  
противопоказаний

- сохранение ишемии
- тахикардия без СН
- тахиаритмия

- целесообразность в/в дискутируется
- если нет противопоказаний





# Бета-адреноблокаторы при ИМпСТ

Препарат	Доза
Лечение в 1-е сутки заболевания	
Метопролол	В/в по 5 мг 2-3 раза с интервалом как минимум 2 мин; Первый прием внутрь через 15 минут после внутривенного введения.
Пропронолол	В/в 0,1 мг/кг за 2-3 приема с интервалами как минимум 2-3 мин; Первый прием внутрь через 4 часа после внутривенного введения.
Эсмолол	В/в инфузия в начальной дозе 0,05-0,1 мг/кг/мин с последующим постепенным увеличением дозы на 0,05 мг/кг/мин каждые 10–15 мин до достижения эффекта или дозы 0,3 мг/кг/мин; для более быстрого появления эффекта возможно первоначальное введение 0,5 мг/кг в течение 2–5 мин. Эсмолол обычно отменяют после второй дозы перорального $\beta$ -адреноблокатора, если за время их совместного использования поддерживались надлежащие ЧСС и АД.



# Практические подходы при лечении ОИМ

## В ближайшие 10 мин

- ЧДД, ЧСС, АД, насыщение  $O_2$
- Мониторирование ЭКГ
- Готовность к дефибрилляции и СЛР
- Обеспечение в/в доступа
- ЭКГ в 12-ти отведениях
- Короткий прицельный анамнез, физикальное обследование

## Неотложное лечение

- $O_2$  4-8 л/мин для насыщения  $O_2 >90\%$
- аспирин (если не дали ранее):  
разжевать 160-325 мг, в свечах 300 мг или в/в 500 мг
- клопидогрел 300 мг, возраст <75 лет 75 мг
- нитроглицерин при АД >90, если есть боль, острый застой в легких, высокое АД
- морфин по 2-4 мг в/в до эффекта,