Диффузия в пленке

- Диффузия через мембрану

$$c(0,t) = c_1 \qquad c(l,t) = c_2 = 0$$

$$c(x,t) = c_1\left(1 - \frac{x}{l}\right) - 2\sum_{m=1}^{\infty} \exp\left[-\frac{m^2\pi^2 Dt}{l^2}\right] \sin\left(\frac{m\pi x}{l}\right) \times$$
$$\times \left\{ \frac{c_1}{\pi m} - \frac{1}{l}\int_0^l c(\xi,0)\sin\left(\frac{m\pi\xi}{l}\right) d\xi \right\}$$

Диффузия в пленке

- Диффузия через мембрану

$$c(0,t)=c_1 \qquad c(l,t)=c_2=0 \qquad c(x,0)=0$$

$$c(x,t)=c_1\left\{\left(1-\frac{x}{l}\right)-\frac{2}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\exp\left[-\frac{m^2\pi^2 Dt}{l^2}\right]\sin\left(\frac{m\pi x}{l}\right)\right\}$$

$$j=-D\frac{\partial c}{\partial x}=c_1\frac{D}{l}\left\{1+2\sum_{m=1}^{\infty}\exp\left[-\frac{m^2\pi^2 Dt}{l^2}\right]\cos\left(\frac{m\pi x}{l}\right)\right\}$$

Диффузия в пленке

- Диффузия через мембрану



Диффузия в пленке

- Диффузия через мембрану

$$j = -D\left.\frac{\partial c}{\partial x}\right|_{x=l} = c_1 \frac{D}{l}\left\{1 + 2\sum_{m=1}^{\infty}(-1)^m \exp\left[-\frac{m^2\pi^2 Dt}{l^2}\right]\right\}$$

$$M_{pass} = \int_0^t j(x,\tau)\big|_{x=l} d\tau = \int_0^t -D\left.\frac{\partial c(x,\tau)}{\partial x}\right|_{x=l} d\tau =$$

$$= c_1 \frac{D}{l}\left\{t - \frac{l^2}{6D} - \frac{2l^2}{\pi^2 D}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m^2}\exp\left[-\frac{m^2\pi^2 Dt}{l^2}\right]\right\}$$

Диффузия в пленке

- Диффузия через мембрану

$$D := 1 \qquad l := 1$$

$$j100(t) := \frac{D}{l} \cdot \left[1 + 2 \cdot \sum_{m=1}^{100} (-1)^m \cdot \exp\left(\frac{-m^2 \cdot \pi^2 \cdot D \cdot t}{l^2} \right) \right]$$

$$M100(t) := \frac{D}{l} \cdot \left[t - \frac{l^2}{6 \cdot D} - \frac{2 \cdot l^2}{\pi^2 \cdot D} \cdot \sum_{m=1}^{100} \frac{(-1)^m}{m^2} \cdot \exp\left(\frac{-m^2 \cdot \pi^2 \cdot D \cdot t}{l^2} \right) \right]$$







Диффузия в пленке

- Диффузия через мембрану



Диффузия в пленке

- постоянные концентрации на границах

$$c(0,t)=c_1 \qquad c(l,t)=c_2$$

$$\tilde{c}(x,t)=c(x,t)+(c_1-c_2)\frac{x}{l}-c_1$$

$$\tilde{c}(0,t)=0 \qquad \tilde{c}(l,t)=0$$

$$\tilde{c}(\xi,0)=c(\xi,0)+(c_1-c_2)\frac{\xi}{l}-c_1$$

$$\tilde{c}(x,t)=\frac{2}{l}\sum_{m=1}^{\infty}\exp\left[-\frac{m^2\pi^2Dt}{l^2}\right]\sin\left(\frac{m\pi x}{l}\right)\int_0^l\tilde{c}(\xi,0)\sin\left(\frac{m\pi\xi}{l}\right)d\xi$$

$$c(x,t)=c_1+(c_2-c_1)\frac{x}{l}+\frac{2}{l}\sum_{m=1}^{\infty}\exp\left[-\frac{m^2\pi^2Dt}{l^2}\right]\sin\left(\frac{m\pi x}{l}\right)\times$$
$$\times\left\{\frac{l}{\pi}\frac{(-1)^m c_2-c_1}{m}+\int_0^l c(\xi,0)\sin\left(\frac{m\pi\xi}{l}\right)d\xi\right\}$$

Диффузия в пленке

- Теорема Дюамеля

$$c(0,t) = f_1(t) \qquad c(l,t) = f_2(t) \qquad c(x,0) = 0$$

$$F_1(x,t-\tau) = 1 - \frac{x}{l} - \frac{2}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\exp\left[-\frac{m^2\pi^2 D(t-\tau)}{l^2}\right]\sin\left(\frac{m\pi x}{l}\right)$$

$$F_2(x,t-\tau) = \frac{x}{l} + \frac{2}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m}\exp\left[-\frac{m^2\pi^2 D(t-\tau)}{l^2}\right]\sin\left(\frac{m\pi x}{l}\right)$$

$$c(x,t) = \int_0^t \left[f_1(\tau)\frac{\partial}{\partial t}F_1(x,t-\tau) + f_2(\tau)\frac{\partial}{\partial t}F_2(x,t-\tau)\right]d\tau =$$

Диффузия в пленке

- Теорема Дюамеля

$$c(x,t)=\frac{2\pi D}{l^2}\sum_{m=1}^{\infty} m\exp\left[-\frac{m^2\pi^2 Dt}{l^2}\right]\sin\left(\frac{m\pi x}{l}\right)\times$$
$$\times\int_0^t\left[f_1(\tau)-(-1)^m f_2(\tau)\right]\exp\left[\frac{m^2\pi^2 D\tau}{l^2}\right]d\tau$$

$$M(x,t)=\frac{4D}{l}\sum_{k=0}^{\infty}\exp\left[-\frac{(2k+1)^2\pi^2 Dt}{l^2}\right]\times\int_0^t\left[f_1(\tau)+f_2(\tau)\right]\exp\left[\frac{(2k+1)^2\pi^2 D\tau}{l^2}\right]d\tau$$

Диффузия в пленке

- Теорема Дюамеля

$$D := 1 \quad l := 1 \qquad f1(\tau,\alpha) := 1 - \exp\left(\frac{-\tau}{\alpha}\right) \qquad f2(\tau,\alpha) := 1 - \exp\left(\frac{-\tau}{\alpha}\right)$$

$$M10(t) := 1 - \frac{8}{\pi^2} \cdot \sum_{k=0}^{10} \frac{1}{(2\cdot k+1)^2} \cdot \exp\left[\frac{-(2\cdot k+1)^2 \cdot \pi^2 \cdot D \cdot t}{l^2}\right]$$

$$M10D(t,\alpha) := \frac{4\cdot D}{l} \cdot \sum_{k=0}^{10} \exp\left[\frac{-(2\cdot k+1)^2 \cdot \pi^2 \cdot D \cdot t}{l^2}\right] \cdot \int_0^t \left(f1(\tau,\alpha) + f2(\tau,\alpha)\right) \cdot \exp\left[\frac{(2\cdot k+1)^2 \cdot \pi^2 \cdot D \cdot \tau}{l^2}\right] d\tau$$







Диффузия в пленке

- Обобщенные граничные условия:

$$\boxed{\begin{aligned} -D\frac{\partial c}{\partial x}+kc&=q_1 \qquad x=0\\ D\frac{\partial c}{\partial x}+kc&=q_2 \qquad x=l\end{aligned}}$$

$$\boxed{c(x,t)=u(x)+w(x,t)}$$

$$\boxed{u(x)=\frac{1}{lk+2D}\left[(q_2-q_1)x+q_1\left(\frac{D}{k}+l\right)+q_2\frac{D}{k}\right]}$$

$$w(x,t)=2\sum_{m=0}^{\infty}\exp(-\lambda_m^2 Dt)\frac{\lambda_m D^2\cos\lambda_m x+kD\sin\lambda_m x}{(\lambda_m^2 D^2+k^2)l+2kD}\times$$

$$\times\int_0^l\big(c(x,0)-u(x)\big)(\lambda_m\cos\lambda_m x+\frac{k}{D}\sin\lambda_m x)dx$$

$$\tan\lambda_m l=\frac{2kD\lambda_m}{\lambda_m^2 D^2-k^2}$$

Диффузия в пленке

- Обобщенные граничные условия, численные методы:

$$-D\frac{c_1^j - c_{-1}^j}{2h} + kc_0^j = kc_{eq}$$
$$\frac{c_0^{j+1} - c_0^j}{\tau} = D\frac{(c_1^j - 2c_0^j + c_{-1}^j)}{h^2}$$

$$D\frac{c_{N+1}^j - c_{N-1}^j}{2h} + kc_N^j = kc_{eq}$$
$$\frac{c_N^{j+1} - c_N^j}{\tau} = D\frac{(c_{N+1}^j - 2c_N^j + c_{N-1}^j)}{h^2}$$

$$c_0^{j+1} = c_0^j + \frac{2D\tau}{h^2}\left(c_1^j - c_0^j\right) + \frac{2\tau k}{h}(c_{eq} - c_0^j)$$

$$c_N^{j+1} = c_N^j + \frac{2D\tau}{h^2}\left(c_{N-1}^j - c_N^j\right) + \frac{2\tau k}{h}(c_{eq} - c_N^j)$$

Диффузия в пленке

- Обобщенные граничные условия, ЧМ, десорбция



Диффузия в пленке

- Обобщенные граничные условия, ЧМ, десорбция



Диффузия в пленке

- Обобщенные граничные условия, ЧМ, десорбция



Диффузия в пленке

- Обобщенные граничные условия, ЧМ, сорбция



Диффузия в пленке

- Обобщенные граничные условия, ЧМ, сорбция



Диффузия в пленке

- Обобщенные граничные условия, ЧМ, сорбция



Диффузия в пленке

- Ограничение потока

$$j(x,t) = -D\frac{\partial c}{\partial x} = \frac{-4c_0 D}{l}\sum_{k=0}^{\infty}\exp\left[-\frac{(2k+1)^2\pi^2 Dt}{l^2}\right]\cos\left[\frac{(2k+1)\pi x}{l}\right]$$

$$j(x,t) = -D\frac{\partial c}{\partial x} = c_0\sqrt{\frac{D}{\pi t}}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\left[\text{-}\exp\left(-\frac{\left((2k+1)l-x\right)^2}{4Dt}\right)+\exp\left(-\frac{\left((2k+1)l+x\right)^2}{4Dt}\right)\right]$$

$$j(x,t)\Big|_{x=l} = -D\frac{\partial c}{\partial x} = c_0\sqrt{\frac{D}{\pi t}}\left\{1+2\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k\exp\left(-\frac{k^2 l^2}{Dt}\right)\right\}$$

Диффузия в пленке

- Ограничение потока

$D := 1 \qquad l := 1$

$$j10s(x,t) := \frac{-4D}{l} \cdot \sum_{k=0}^{100} \exp\left[\frac{-(2\cdot k+1)^2 \cdot \pi^2 \cdot D \cdot t}{l^2}\right] \cdot \cos\left[\frac{(2\cdot k+1)\cdot \pi \cdot x}{l}\right]$$

$$j10e(x,t) := -\sqrt{\frac{D}{\pi \cdot t}} \cdot \sum_{k=0}^{100} (-1)^k \cdot \left[-\exp\left[-\frac{\left[(2\cdot k+1)\cdot \frac{1}{2} - x\right]^2}{4\cdot D\cdot t}\right] + \exp\left[-\frac{\left[(2\cdot k+1)\cdot \frac{1}{2} + x\right]^2}{4\cdot D\cdot t}\right]\right]$$







Диффузия в пленке

- Граничные условия: ограничение потока

$$\boxed{\left| D \frac{\partial c}{\partial x} \right| \le \alpha}$$

- Численные методы, десорбция:

$$\boxed{c_0 = \begin{cases} 0 & c_1 - 0 < \alpha h / D \\ c_1 - \alpha h / D & c_1 - 0 > \alpha h / D \end{cases}}$$

$$\boxed{c_N = \begin{cases} 0 & c_{N-1} - 0 < \alpha h / D \\ c_{N-1} - \alpha h / D & c_{N-1} - 0 > \alpha h / D \end{cases}}$$

Диффузия в пленке

- Ограничение потока, ЧМ, десорбция



Диффузия в пленке

- Ограничение потока, ЧМ, десорбция



Диффузия в пленке

- Ограничение потока, ЧМ, десорбция



Диффузия в пленке

- Ограничение потока, ЧМ, сорбция



Диффузия в пленке

- Ограничение потока, ЧМ, сорбция



Диффузия в пленке

- Ограничение потока, ЧМ, сорбция