

Внезапная смерть

СЛР: искусственное дыхание методом рот в рот

- Спонтанное дыхание отсутствует
- Положить руку на лоб и указательным и большим пальцами этой руки зажать нос
- Губами плотно обхватить рот и произвести два медленных полных вдоха (по 1-1,5 сек, пауза 2 сек)
- Частота вдохов – 12 в минуту



СЛР: непрямой массаж сердца

- Пульс на сонных артериях отсутствует
- Больной должен лежать на твердой поверхности
- Сложенные руки вместе накладывают на 2,5 см выше мечевидного отростка грудины
- Массаж выполняют двумя руками: выступ одной ладони должен упираться в тыльную поверхность кисти другой
- При массаже руки в локтях не сгибать
- Надавливания на грудину производится строго по направлению к позвоночнику на глубину 3 -5 см
- Частота надавливаний 80 – 100 в минуту
- Соотношение непрямой массаж/ИВЛ (15 : 2 или 5 : 1)



СЛР: электроимпульсная терапия

- Для уменьшения сопротивления электроды смазывают гелем
- Электроды должны располагаться по длинной оси сердца: верхний правый край грудины и латеральнее левого соска по 1 .axillaries media
- Во время ЭИТ нельзя касаться кровати и больного

