

Лечение неосложненного хронического гнойного среднего отита

О.Н.Борисенко



Определение НО ХГСО

- Стойкая центральная перфорация барабанной перепонки (мезотимпанит)
- Воспаление слизистой оболочки полостей среднего уха
- Периодическая оторрея
- Цепь слуховых косточек сохранена / разрушен длинный отросток наковальни
- Может быть тимпаносклероз
- Кондуктивная или смешанная тугоухость

Диагностика

- Опрос
- Осмотр ЛОР органов
- Отомикроскопия
- Аудиометрия
- Тубоманометрия
- Бак.исследование экссудата
- Рентгенография ВК
- КТ височных костей

Лечение

- Консервативное
- Хирургическое

Цель консервативного лечения

- Купирование воспалительного процесса в среднем ухе
- Предупреждение возможных лабиринтных и внутричерепных осложнений
- Подготовка больного к хирургическому лечению

Консервативное лечение

- Антибактериальная терапия
- Противовоспалительная терапия
- Ушные капли (Отофа, Нормакс, Ципрофарм)
- Пальцевой массаж глоточного устья слуховой трубы
- Физиотерапия

Консервативное лечение

- При НО ХГСО никогда не применяются ушные капли с ототоксическими антибиотиками и спиртовые растворы!!!

ЭРЕСПАЛ

В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ

- При обострении НО ХГСО
- При подготовке больных к операции
- В послеоперационном периоде
- Не применяется в период ремиссии
- В некоторых случаях может заменить антибиотики



Хирургическое лечение

- Санация полостей среднего уха
- Восстановление барьера (барабанной перепонки) между наружным и средним ухом
- Реконструкция трансмиссионного механизма среднего уха
- Санация+Реконструкция=Закрытый вариант тимпанопластики

Хирургическое лечение

- При НО ХГСО никогда не производится радикальная мастоидэктомия!!!