

Неоднозначные ситуации, с
которыми сталкиваются
семейные врачи при лечении
больных туберкулезом:
этические соображения

Joanna Maria Thomas, MB, ChB, FRCGP

Университет медицинских наук Арканзаса

Региональный центр медицинского
образования - Северо-западный колледж
общественного здравоохранения

- Целью данной лекции является обсуждение некоторых неоднозначных ситуаций, связанных с туберкулезом в практике семейного врача в Северо-западном Арканзасе.

Задачи

- По завершении лекции учащийся сможет обсудить этические проблемы, связанные с лечением туберкулеза в практике семейного врача в Северо-западном Арканзасе.

- Этика - от греческого “ethos”
- Мораль - от латинского “mores”
 - Оба слова являются производными понятия, обозначающего обычай, манеры или нравы, характерные для определенных людей
- В немецком языке - “sittlich”

История

- Гиппократ
- Иммануил Кант
- Нюренбергский процесс
(Nuremberg Trials)
- Проект Tuskegee

История (продолжение)

- 1960-е
 - Хронический гемодиализ
- 1970-е
 - Пересадка сердца
 - Биоэтика
- 1978
 - Отчет Belmont

Триада принципов

- Уважительные отношения к автономности
- Творение добра / не нанесение вреда
- Социальная справедливость

- Как действуют принципы при разрешении этических проблем в клинической практике.

Случай 1

- 22-летний вьетнамец мужского пола обратился в студенческую поликлинику при местном университете; в течение нескольких недель в связи с лихорадкой и ознобом его лечили от пневмонии.

Случай 1 (продолжение)

- Он пришел на повторный прием в поликлинику через 2 недели без признаков улучшения, на рентгене выявлен выпот в правой плевральной полости.

Случай 1 (продолжение)

- Он был госпитализирован для выполнения плевральной пункции, а из мокроты была высеяна АFB*.

- *кислотоустойчивая бактерия

Случай 1 (продолжение)

- Он провел в США около 6 недель. Кожная туберкулиновая проба не ставилась.

Случай 2

- 40-летний мужчина с Маршалльских островов был направлен в нашу клинику на консультацию одним из местных офтальмологов. Офтальмологу казалось, что необходимо исключить туберкулез и сифилис.

Случай 2 (продолжение)

- В течение нескольких месяцев у больного отмечалось ухудшение зрения, в связи с чем ему поставили диагноз хронического ирита. Других симптомов замечено не было.
- Провел В США шесть месяцев.

Случай 2 (продолжение)

- Больной пришел в нашу клинику после обследования, был сделан анализ крови на сифилис, а также поставлена кожная туберкулиновая проба. Реакция на сифилис оказалась положительной, а размер туберкулиновой пробы был 25 мм через 48 часов.

Случай 2 (продолжение)

- Он пропустил прием в клинике 3 раза подряд.
- Его осмотрели в Департаменте здравоохранения и назначили лечение, но далее на диспансерные осмотры он не являлся.

Иммигранты

- Плохие жилищные условия
- Скученность
- Низкий доход
- Безработица
- Дискриминация

Случай 3

- 36-летняя женщина обратилась в приемный покой с жалобами на кашель, лихорадку и озноб в течение нескольких недель. Она недавно переехала в Арканзас из Южной Каролины и ночевала в своем грузовике.

Случай 3 (продолжение)

- Поставленная туберкулиновая проба – 15 мм. Рентгеновское исследование грудной клетки выявило инфильтрат в правой верхней доле. Был поставлен диагноз туберкулеза и назначено лечение.

Случай 3 (продолжение)

- Была выписана из стационара спустя пять дней, причем после выписки больная собиралась жить в трейлере своего друга в отдаленном горном районе Ozark.

Случай 4

- 37-летняя женщина поступила с жалобами на тошноту и рвоту в течение нескольких дней. В анамнезе СПИД, гепатит С, злоупотребление алкоголем; ранее она уже получала лечение по поводу туберкулеза.

Случай 4 (продолжение)

- Больная не замужем, имеет 4 детей (из которых ни один не с ней не живет). Из-за тошноты прекратила прием лекарств за две недели до госпитализации. У нее отмечалась ранняя СПИД-деменция.

Случай 4 (продолжение)

- Был поставлен диагноз гастрита, связанного с употреблением алкоголя; полученное лечение включало внутривенные жидкости для компенсации обезвоживания, а также ингибиторы протонного насоса и противорвотные средства.

Случай 4 (продолжение)

- Пациентка отреагировала на терапию, было возобновлено ранее назначенное лечение. Выписана через 3 дня под наблюдение местной клиники для ВИЧ-инфицированных.