

**Северо-Западная оперативная таможня
Отдел по борьбе с контрабандой наркотиков**

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:
«БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ»**



Промедол



Синонимы: Promedol(um), Trimeperidinhydrochlorid.
Синтетическое средство — гигроскопичная жидкость светло-желтого цвета, выпускается в виде 5%-ного раствора в ампулах по 10 мл.

Наркотический эффект после внутривенного введения развивается через 20—40 с.

Способ употребления: инъекция.

Морфин



Синонимы: Duromorph, Meconium, Ospalivina, Morfocloru, Theba-Intran, Thebametten, Gargamorphia, Tardomorfina, Gitomorfina, Morfin, Morphium.

Жаргонные названия: морфий, морфи, марфута, мария, марьянка.

Основной алкалоид опия. Форма выпуска: морфина гидрохлорид в виде таблеток, 1%-ного и 5%-ного растворов в ампулах и 1%-ного раствора в шприц-тюбике, может встречаться в виде порошка. Таблетки (порошок) — белого цвета, растворы в ампулах и шприц-тюбике — бесцветные либо слегка желтоватые.

Способ употребления: инъекция, перорально, курение.

Марихуана



Синоним: каннабис.

Жаргонные названия: травка, дурь, план, клевер, божья травка, сено, Мери Джейн, нот, грас, хей, виид.

Смесь высушенных или невысушенных верхушек с листьями и остатками стебля любых сортов конопли без центрального стебля, иногда с некоторым количеством семян, содержащая тетрагидроканнабиноды. Цвет растительной массы - от светло-зеленого до коричневого. Основное условие отнесения исследуемого вещества к данному наркотическому средству — наличие тетрагидроканнабинола.

Способ употребления — курение, перорально.

Гашиш



Синонимы: анаша, смола каннабиса.

Жаргонные названия: опилки, план, дурь, чернушка.

Специально приготовленная смесь отделенной смолы и пыльцы конопли или смесь, приготовленная путем обработки (измельчением, прессованием и т. д.) верхушек конопли с разными наполнителями независимо от того, какая форма придана смеси — таблетки, пилюли, спрессованные плитки, пасты и др., содержащая тетрагидроканнабинолы. Цвет гашиша — от светло-зеленого до коричневого. Имеет характерный запах. Основное условие отнесения исследуемого вещества к данному наркотическому средству — наличие тетрагидроканнабинола.

Способ употребления — курение, перорально.

Маковая солома



Синоним: кокнар.

Жаргонное название: кукнар.

Все части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и невысушенные), за исключением спелых семян любого сорта мака, собранного любым способом, содержащие наркотически активные алкалоиды опия. Цвет маковой соломы от светло- до темно-зеленого и от светло-желтого до коричневого. Необходимое условие отнесения исследуемого вещества к данному наркотическому средству — наличие наркотически активных алкалоидов опия (морфин, кодеин, тебаин).

Героин



Синонимы: Acetomorphin, Aspron, Diacephin, Diacetylmorphin, Diamorphin, Diaphorm, Eclorion, Eroin, Heroin, Herolan, Ieroin, Iroini, Morphacetin, Morphin-diacetat, Preza, диацетилморфин.

Жаргонное название: гера.

Синтетическое средство, производное морфина, по наркотической активности превосходящее его в несколько раз; порошок различных цветов — от белого до коричневого (в зависимости от степени очистки); часто содержит в своем составе наполнители — муку, крахмал, окись кремния, а также некоторые лекарственные средства — барбитураты, метаквалон, новокаин и др.

Способ употребления: инъекция, вдыхание носом, курение.

ЛСД



Синонимы: диэтиламид лизергиновой кислоты, LSD.

Жаргонные названия: неизвестны.

Синтетическое средство, одно из самых сильнодействующих наркотических средств, оказывающее наркотический эффект в ничтожно малых дозах (0,001 мг/кг),— кристаллическое вещество в виде капсул, таблеток белого цвета или порошка кремового цвета. Для удобства сбыта и потребления ЛСД им нередко пропитывают листы перфорированной бумаги.

Способ употребления: перорально.

Фенамин (амфетамин)



Синонимы: Amfetamine, Amphetamin, Bensedrin, Desoxynorephedrin, Fenamin, Fenopromin, Isomyn, Leodrin, Phenamin, Phenedrine, Psychedrin, Stimulan, Sympatedrin, Phenopromin, Amphaetamin, Amfetamina.

Жаргонные названия: неизвестны.

Синтетическое средство, применяется в форме сульфата в виде таблеток белого цвета; может встречаться в виде порошка белого или светло-коричневого цвета; входит в состав афина (антидота).

Способ употребления: инъекция, перорально.





1
biohazard/biohazard

2
biohazard/biohazard

3
biohazard/biohazard

4
biohazard/biohazard

5
biohazard/biohazard

biohazard/biohazard
PBS
SILICA GEL

biohazard/biohazard
PBS



пертно - криминалистический

Крим. техника



Фенциклидин



Синонимы: CL-395, CN-25253-2, GP-121, NSC-40902, Sernyl, Sernylan, Phencyclidinhydrochlorid, РСР.

Жаргонные названия: неизвестны.

Синтетическое средство, выпускается в виде таблеток, может встречаться в виде порошка. Таблетки и порошок — белого цвета.

В форме основания или соли может наноситься на растительный материал для курения.

Способ употребления: перорально, инъекция, курение.

Гашишное масло



Синонимы: неизвестны.

Жаргонные названия: химка.

Раствор или вязкая масса, полученные из частей растений любых видов и сортов конопли путем извлечения (экстракции) различными растворителями или жирами. Цвет раствора – зеленый, вязкой массы – темно-зеленый; имеет характерный запах. Основное условие отнесения исследуемого вещества к данному наркотическому средству — наличие тетрагидроканнабинола.

Способ употребления: курение пропитанных гашишным маслом табачных изделий.

Ацетилированный опий



Синонимы: неизвестны.

Жаргонное название: султыга.

Полусинтетическое средство, получаемое путем ацетилирования опия или экстракта маковой соломы и содержащее в своем составе моноацетилморфин, диацетилморфин, ацетилкодеин либо их смесь. Внешний вид: жидкость темно-коричневого, коричневого или желтого цвета, имеющая характерный запах. Основное условие отнесения исследуемого вещества к данному наркотическому средству — наличие ацетилкодеина, диацетилморфина (героина) или моноацетилморфина либо их смесей. Может содержать в своем составе в большом количестве непроацетили-рованные морфин и кодеин

. **Способ употребления:** инъекция, перорально (через рот).

Эфедрон



Синонимы: Astmedrin, Biophedrin, Brevedrin, Cophedrine, Efedril, Efetonina, Ephedral, Ephedrenan, Ephedron, Ephetonin, Methylmydriatin, Racedrin, Racephedrin, Zephrol.

Жаргонные названия: Джеф, эфенди, мулька, космос.

Прозрачная либо слегка мутная жидкость. В зависимости от способа изготовления и применяемого сырья эфедрон может быть бесцветным или светло-желтого, желтого, коричневого, иногда красного цвета. Трава эфедры — неодеревенелые верхушечные части безлистных кустарников — хвойника (эфедры) хвощевого и хвойника (эфедры) среднего, произрастающих в горных районах Средней Азии на высоте 1000—1800 м. Может встречаться в виде сырой либо высушенной растительной массы, состоящей из хвоеподобных веточек или из измельченных растительных частиц; цвет — от светло-зеленого до темно-зеленого.

Способ употребления: инъекция.

Кокаин




Синонимы: Benzoylmethylecgonin, Cocain, Erythroxylin, Kokain, Kokayeen, Neurocaine.

Жаргонные названия: кока, кокс, крек, марафет.

Порошок или паста, получаемые из листьев растения кока, произрастающего в Южной Америке, Африке, на островах Цейлон и Ява. Порошок — белого цвета, паста — белого, кремового или бежевого цвета. Кокаин в форме основания называется крек. Он часто встречается в виде растворов в органических растворителях либо в твердом виде. Крек обычно желтоватый либо бесцветный. Его нередко запаивают в стеклянные ампулы.

Способ употребления: вдыхание носом, курение, инъекция.





1

2


3

4

5

1

Тебаин



Синонимы: Thebain, Tebaina.

Жаргонные названия: неизвестны.

Алкалоид опия — побочный продукт, образующийся при производстве морфина. Внешний вид: кристаллический порошок белого цвета. В медицинской практике тебаин- не используется, может являться сырьем для производства других наркотических средств. Способ употребления: применение в качестве наркотического средства маловероятно из-за сильного стрихниноподобного действия.