

# Типичные ошибки

при заполнении форм государственной  
и отраслевой статистической  
отчётности по туберкулёзу

# Форма № 8

- Не заполнена т. 1002 (жители других территорий) – не подана ф.089/у-туб.
- Двойной учёт в т. 1000 с. 32 (лица БОМЖ) и в т. 1002 (жители других территорий)
- Недоучёт посмертного выявления больных туберкулёзом у умерших от ВИЧ-инфекции из-за того, что не была подана ф. 089/у-туб

# Форма № 33

- Т. 2100: неправильно сосчитан баланс по туберкулёзу органов дыхания и другим формам туберкулёза (строки 1 и 6)

| (2100)   |          |   | Код по ОКЕИ: человек - 792  |               |                |   |               |                |
|--|----------|---|---|---------------|----------------|---|---------------|----------------|
| Формы туберкулеза  | № строки | Код По МКБ-X пересмотра   | Взято на учет в отчетном году больных с впервые в жизни установленным диагнозом |               |                | Контингенты больных на конец отчетного года |               |                |
|  |          |   | Всего   | в том числе   |                | Всего                                       | в том числе   |                |
|  |          |   |   | дети 0-14 лет | дети 15-17 лет |   | дети 0-14 лет | дети 15-17 лет |
| 1  | 2        | 3   | 4   | 5             | 6              | 7   | 8             | 9              |
| Туберкулез органов дыхания - всего   | 01       | A15; A16; A19 часть   | 1874  | 29            | 32             | 5543  | 31            | 37             |
| в том числе туберкулез легких  |          | A15.0-A15.3; A15.7 часть;<br>A16.0-A16.2; A16.7 часть;<br>A19 часть | 1814  | 9             | 31             | 5517  | 7             | 36             |
| из него: фибринозно-кавернозный  | 02       | A15.0-A15.3; A16.0-A16.2  | 39  |               |                | 980   |               |                |
| Из общего числа больных туберкулезом легких выявлено в фазе распада                      | 04       |   | 971   | 2             | 14             | 2870  |               | 11             |
| Из общего числа больных туберкулезом легких выявлено без распада и без бактериовыделения | 05       |   | 734   | 4             | 12             | 1774  | 7             | 15             |
| Другие локализации туберкулеза   | 06       | A17; A18; A19 часть   | 49  | 5             |                | 415   | 7             | 2              |
| Итого (сумма строк 01, 06)   | 07       | A15-A19   | 1923  | 34            | 32             | 6005  | 38            | 39             |
| Имеют инвалидность в связи с туберкулезом  | 08       |   | 191   | 15            | 8              | 2308  | 27            | 15             |
| в том числе:   |          |   |   |               |                |   |               |                |
| первой группы  | 09       |   | 4   |               |                | 39  |               |                |
| второй группы  | 10       |   | 144   |               |                | 1776  | 3             | 1              |
| Обследовано на АТ к ВИЧ  | 11       |   | 1906  | 26            | 27             | 5323  | 24            | 31             |
| из них с положительным результатом методом иммунного блоттинга                           | 12       |   | 56  |               |                | 153   |               |                |
| Туберкулез в сочетании с ВИЧ   | 13       | A15-A19 и B20.0 - 23.0; Z.21  | 76  |               |                | 258   |               |                |

# Форма № 33

- Несоответствие сведений в т. 2200 и 2400 (по III-А ГДН).

| (2200)  | Наименование показателей | № строки. | Всего            | из них:          |                 |
|---|--------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|
|   |                          |           |                  | детей 0-14 лет   | детей 15-17 лет |
|   | I                        | 2         | 3                | 4                | 5               |
| Впервые выявлено больных туберкулезом из числа осмотренных на туберкулез      |                          | 01        | 113              | 18               | 9               |
| из них с применением:   |                          | 02        | 17 <del>15</del> | 14 <del>16</del> | 3               |
| туберкулинодиагностики  |                          | 03        | 6                | 5                | 1               |
| в том числе аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении |                          | 04        | 93               | 2                | 6               |
| флюорографии  |                          | 05        | 3                |                  |                 |
| бактериологических методов  |                          | 06        | 3                |                  |                 |
| в том числе методом бактериоскопии  |                          | 07        | 272              | 249              | 23              |
| Взято на учет в III А группу диспансерного учета                              |                          |           |                  |                  |                 |

| (2400)  | Состоит по группам учета |                      |                                   |                                  |                               |               |        |                       |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------------------|
|   | №                        | Взято в текущем году | Подлежало ХП или пробному лечению | Прошли курс ХП, пробного лечения | Впервые выявлено больных с ТБ | Снято с учета | Выбыло | Состоит на конец года |
| I   | 2                        | 3                    | 4                                 | 5                                | 6                             | 7             | 8      | 9                     |
| <b>Взрослые, из них нуждающиеся:</b>  |                          |                      |                                   |                                  |                               |               |        |                       |
| в определении активности туберкулезного процесса (гр. 0А)   | 01                       | 57                   | 70                                | 45                               | 10                            | 26            | 18     | 16                    |
| в проведении дифференциально-диагностических мероприятий (гр. 0Б)   | 02                       | 11                   | 11                                | 11                               | 1                             | 9             |        | 1                     |
| Взрослые с неактивным туберкулезным процессом после клинического излечения (гр. III)                                      | 03                       | 860                  | 860                               | 521                              |                               |               |        | 860                   |
| Взрослые состоящие:   |                          |                      |                                   |                                  |                               |               |        |                       |
| в бытовом и производственном контакте с бактериовыделителем (гр. IVА)   | 04                       | 780                  | 3501                              | 1855                             | 25                            | 413           | 58     | <del>3005</del>       |
| в бытовом и производственном контакте с больным туберкулезом без бактериовыделения (гр. IVА)                              | 05                       | 2079                 | 3057                              | 1852                             | 8                             | 400           | 65     | 2584                  |
| в профессиональном контакте с источником инфекции (гр. IVБ)   | 06                       | 26                   | 422                               | 97                               |                               | 52            | 1      | 369                   |
| <b>Дети от 0 до 17 лет, из них:</b>   |                          |                      |                                   |                                  |                               |               |        |                       |
| нуждающиеся в уточнении характера туберкулиновой чувствительности, уточнении активности туберкулеза и диагностике (гр. 0) | 07                       | 41                   | 189                               | 61                               | 2                             | 41            |        | 146                   |
| с остаточными посттуберкулезными изменениями (гр. IIIА)   | 08                       | 273                  | 273                               | 265                              |                               | 6             |        | 267                   |
| переведенные из I, II, III А групп (III Б)  | 09                       | 30                   | 33                                | 35                               |                               |               |        |                       |

# Форма № 33

- Т. 2300: при подсчёте баланса по детям и подросткам не учтен переход по возрасту.

3. Движение контингентов больных туберкулезом

| (2300)                   |     |                            |    |    |                          |   |    |    |   |                          |    |    |
|--------------------------|-----|----------------------------|----|----|--------------------------|---|----|----|---|--------------------------|----|----|
| 1                        | 2   | Туберкулез органов дыхания |    |    |                          |   |    |    |   | Другие формы туберкулеза |    |    |
|                          |     | Всего                      |    |    | из них туберкулез легких |   |    |    |   | 9                        | 10 | 11 |
|                          |     | 3                          | 4  | 5  | 6                        | 7 | 8  |    |   |                          |    |    |
| Взято на учет рецидивов  | 001 | 128                        | 0  | 1  | 125                      | 0 | 1  | 10 | 0 | 0                        |    |    |
| из них из III группы     | 002 | 54                         | 0  | 1  | 53                       | 0 | 1  | 3  | 0 | 0                        |    |    |
| Прибыло                  | 003 | 128                        | 4  | 5  | 123                      | 1 | 0  | 1  | 0 | 0                        |    |    |
| Переведено в III группу  | 004 | 1146                       | 27 | 13 | 1069                     | 0 | 10 | 65 | 1 | 0                        |    |    |
| Диагноз туберкулеза снят | 005 | 4                          | 0  | 0  | 4                        | 0 | 0  | 0  | 0 | 0                        |    |    |
| Выбыло                   | 006 | 93                         | 2  | 8  | 90                       | 0 | 0  | 0  | 0 | 0                        |    |    |
| Умерло от туберкулеза    | 007 | 190                        | 0  | 0  | 190                      | 0 | 0  | 0  | 0 | 0                        |    |    |
| Умерло от других причин  | 008 | 125                        | 0  | 0  | 123                      | 0 | 0  | 3  | 0 | 0                        |    |    |

# Форма № 33

- Неправильно подсчитан баланс по т. 2400 или не учтены исправления предыдущего года

## 4. Диспансерная работа с 0, III, IV, VI группами учета

(2400)

| Состоит по группам учета   | №  | Взято в текущем году | Подлежит до ХП или пробном у лечению | Прошли курс ХП, пробного лечения | Впервые выявлено больных с ТБ | Снято с учета | Выбыло | Состоит на конец года |
|--|----|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                                    | 5                                | 6                             | 7             | 8      | 9                     |
| <b>Взрослые, из них нуждающиеся:</b>   |    |                      |                                      |                                  |                               |               |        |                       |
| в определении активности туберкулезного процесса (гр. 0А)  | 01 | 67                   | 66                                   | 64                               | 16                            | 38            | 42     | 26                    |
| в проведении дифференциально-диагностических мероприятий (гр. 0 Б)   | 02 | 39                   | 38                                   | 35                               | 5                             | 31            | 16     | 3                     |
| Взрослые с неактивным туберкулезным процессом после клинического излечения (гр. III)   | 03 | 642                  | 621                                  | 621                              | 8                             | 4             |        | 1501                  |
| <b>Взрослые состоящие:</b>   |    |                      |                                      |                                  |                               |               |        |                       |
| в бытовом и производственном контакте с бактериовыделителем (гр. IVA)  | 04 | 457                  | 808                                  | 791                              | 12                            | 543           | 42     | 909                   |
| в бытовом и производственном контакте с больным туберкулезом без бактериовыделения (гр. IVA)   | 05 | 452                  | 770                                  | 745                              | 1                             | 558           | 84     | 615                   |
| в профессиональном контакте с источником инфекции (гр. IVБ)  | 06 |                      | 106                                  | 106                              |                               | 00            | 7      | 310                   |
| <b>Дети от 0 до 17 лет, из них :</b>   |    |                      |                                      |                                  |                               |               |        |                       |
| нуждающиеся в уточнении характера туберкулиновой чувствительности, уточнении активности туберкулеза и диагностики (гр. 0)            | 07 | 887                  | 37                                   | 25                               |                               | 680           | 676    | 776                   |
| с остаточными посттуберкулезными изменениями (гр. IIIА)  | 08 | 1                    |                                      |                                  |                               |               |        | 2                     |
| переведенные из I, II, III А групп (III Б)   | 09 | 11                   | 10                                   | 10                               |                               |               |        | 11                    |
| состоящие в контакте с бактериовыделителями (гр. IVA)  | 10 | 261                  | 374                                  | 374                              | 3                             | 144           | 11     | 444                   |
| из контакта с больными туберкулезом без бактериовыделения, из семей животноводов или имеющих больных туберкулезом животных (гр. IVБ) | 11 | 152                  | 160                                  | 156                              |                               | 194           | 2      | 208                   |
| в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции (группа VIA)   | 12 | 669                  | 1126                                 | 1122                             | 1                             | 1110          | 24     | 1039                  |
| ранее инфицированные, с гиперергической реакцией на туберкулин, из соц. групп риска с выраженными реакциями на туберкулин (гр. VIБ)  | 13 | 135                  | 131                                  | 127                              |                               | 143           | 2      | 170                   |
| с усиливающейся туберкулиновой чувствительностью (гр. VIВ)   | 14 | 726                  | 1261                                 | 1161                             | 1                             | 996           | 1006   | 2443                  |

# Форма № 33

- В т. 2500 не учтены МЛУ МБТ+ из прошлого года, не учтены исправления предыдущего года или неправильно подсчитан баланс

(2500)

5. Бактериовыделители, состоящие на учете

| Группы больных                                 | №  | Обнаружено из числа больных                  |                       |                            |                    |                    |              |              |                      | Переведено из других учреждений больных, выделяющих МБТ | Умерло         |                  | Перестали выделять МБТ | Выбыло из района обслуживания | Состоит на конец отчетного года |
|--|----|--|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---|----------------|------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  |    | с интервалом в жизни установленным диагнозом | из них методом посева | из них методом микроскопии | состоящих на учете |                    |              |              | снятых ранее с учета |   | от туберкулеза | от других причин |                        |                               |                                 |
|  |    |  |                       |                            | в I группе         | из них в IB группе | во II группе | в III группе |                      |   |                |                  |                        |                               |                                 |
| 1  | 2  | 3  | 4                     | 5                          | 6                  | 7                  | 8            | 9            | 10                   | 11  | 12             | 13               | 14                     | 15                            | 16                              |
| Туберкулез органов дыхания                     | 01 | 122  | 3                     | 119                        | 9                  | 2                  | 21           | 1            | 14                   | 108   | 62             | 14               | 168                    | 47                            | 433                             |
| Обследовано на МЛУ (из стр. 01)                | 02 | 117  |                       |                            |                    |                    |              |              |                      |   |                |                  |                        |                               |                                 |
| из них выявлена МЛУ                            | 03 | 0  |                       |                            |                    |                    |              |              |                      | 3   | 3              |                  |                        | 1                             | 69                              |
| Туберкулез внелеточных локализаций             | 04 | 5  | 4                     | 1                          |                    |                    |              |              |                      |   |                |                  | 2                      |                               | 5                               |
| из них сельских жителей (из суммы строк 01+04) | 05 | 80   |                       | 80                         | 2                  |                    | 5            | 1            | 8                    | 48  | 37             | 5                | 97                     | 32                            | 237                             |

# Форма № 33

- В т.2610 не отмечены умершие в стационаре

(2610) Кроме того, умерло от туберкулеза в туберкулезном стационаре больных, не состоявших на учете: взрослых 1 \_\_\_\_\_, детей 15-17 лет 2 \_\_\_\_\_, детей 0-14 лет 3 \_\_\_\_\_.





# Форма № 33

- Не заполнена т. 2800

8. Оказание помощи больными туберкулезом, временно проживающими на территории обслуживания  
(кроме состоящих на учете)

(2800)

| Наименование                | № строки | Всего | из них:           |                         |
|-----------------------------|----------|-------|-------------------|-------------------------|
|                             |          |       | детей<br>0-14 лет | подростков 15-17<br>лет |
| 1                           | 2        | 3     | 4                 | 5                       |
| Выявлено в текущем году     | 01       | 31    |                   |                         |
| из них с МБТ+               | 02       |       |                   |                         |
| Наблюдалось в отчетном году | 03       |       |                   |                         |
| Лечились в стационаре       | 04       |       |                   |                         |
| Лечились амбулаторно        | 05       |       |                   |                         |
| Умерло от туберкулеза всего | 06       |       |                   |                         |
| из них в стационаре         | 07       |       |                   |                         |

# Форма № 33

- Добавлена таблица 2130, отражающая сведения о больных, направленных на санаторно-курортное лечение

(2130) Из числа состоящих на учете больных туберкулезом (стр.1 гр. 7) направлено на санаторно-курортное лечение 1 \_\_\_\_\_ ,  
прошли санаторно-курортное лечение в отчетном году 2 \_\_\_\_\_.


# Ф. № 30 т. 2512

- ошибочно дважды включают подростков, осмотренных методами флюорографии и туберкулинодиагностики
- в графу 8 (положительный результат бактериоскопии) включают, не лица а результаты\*.


Рекомендуется сверять сведения из районных ЛПУ с районной ф. 7-ТБ т.1003.

Число в ф. № 30 т.2500 гр.8 < ф. 7-ТБ т.1003

ф. 2-ТБ — недостаточная регистрация для  
лечения больных с курсами повторного лечения



ф. 2-ТБ — недостаточная регистрация для  
лечения лиц, переведенных для продолжения лечения



**7-ТБ** – недостаточная работа по сверке впервые выявленных больных туберкулёзом с УИН

- В 6 регионах (Республики: Коми, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Алтай, Челябинской, Ленинградской областях и г. Санкт-Петербурге) расхождение числа впервые выявленных больных между ф. № 8 ФСН и ф. 7-ТБ превысило 40%.

# Ф. 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ

## Как предотвратить остальные ошибки в этих формах?

С 10 января (срок подачи годовых отчётов по ф. 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ) до 10 февраля проводится предварительный приём и корректировка годовых отчётов по указанным формам. Вы можете узнать о состоянии отчётов, написав письмо по адресу: [sterlikov@list.ru](mailto:sterlikov@list.ru). В случае, если отчёт не был подан для предварительной проверки, просьба оказать содействие в этом.



**Спасибо за внимание!**

Надеемся на дальнейшее  
конструктивное сотрудничество