Типичные ошибки при заполнении форм государственной и отраслевой статистической отчётности по туберкулёзу

- Не заполнена т. 1002 (жители других территорий) не подана ф.089/у-туб.
- Двойной учёт в т. 1000 с. 32 (лица БОМЖ) и в т. 1002 (жители других территорий)
- Недоучёт посмертного выявления больных туберкулёзом у умерших от ВИЧ-инфекции из-за того, что не была подана ф. 089/у-туб

• Т. 2100: неправильно сосчитан баланс по туберкулёзу органов дыхания и другим формам туберкулёза (строки 1 и 6)

(2100)						Кол по ОК	ЕИ: человек -	792	
	No	Кол		в отчетном год ни установления		Kon	пингенты больн	ых	
Формы туберкулеза	строки	По МКБ-Х		в том числе				в том числе	
		пересмотра	Beero	дети 0-14 лет	дети 15-17 лет	Beero	дети 0-14 лет	лети 15-17 лет	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Туберкулез органов дыхания - всего	01	А15; А16; А19 часть	1874	29	32	55	31	37	
в том числе туберкулез легких	02	А15.0-А15.3; А15.7 часть; А16.0-А16.2; А16.7 часть; А19 часть	1814	9	31	5517	7	36	
из него: фиброзно-кавернозный	03	A15.0-A15.3; A16.0-A16.2	39			980			
Из общего числа больных туберкулезом легких выявлено в фазе распада	04		971	2	14	2870		11	
Из общего числа больных туберкулезом легких выявлено без распада и без бактерновыделения	05		734	4	12	1774	7	15	
Другие локализации туберкулеза	06	А17; А18; А19 часть	49	5		416	7	7	
Итого (сумма строк 01, 06)	07	A15-A19	1923	34	32	6005	38	39	
Имсют инвалидиость в связи с туберкулезом	08		191	15	8	2308	27	15	
в том числе: первой группы	09		4			39	41	15	
второй группы	10		144			1776	3	1	
Обследовано на АТ к ВИЧ	11		1906	26	27	5323	24	31	
из них с положительным результатом методом иммунного блотинга	12		56	20	21	153	24	31	
Туберкулез в сочетании с ВИЧ	13	А15-А19 и В20.0 - 23.0; Z 21	76			258			

Форма № 33 • Несоответствие сведений в т. 2200 и 2400 (по III-А ГДН).

(2200)			H2 HHX:			
Наименование показателей	№ строки.	Beero	детей 0-14 лет	детей 15-17 лет		
	2	3	4	5		
Впервые выявлено больных туберкулезом из числа осмотренных на туберкулез	01	113	18	9		
из них с применением: туберкулинодиагностики	02	17 15	14 15	3		
в том числе аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении	03	6	5	1		
флюрографии	- 04	93	2	6		
бактериологических методов	05	3				
в том числе методом бактериоскопии	- 06	1		- 12		
Взято на учет в IIIA группу диспансерного учета	07	272	249	23		

(2400)		.,	ymanı	yacı				
Состоит по группам учета	No.	Взято в текущем году	Подлежа ло XП или пробном у лечению	Продави куде XII, пуобног о лечения	Впервые выявлен о больных с ТБ	Снято с учета	Выбыло	Состоит на конец года
I.	2	3	4	5.	6	7	8	9
Взрослые, из них пуждающиеся: в определении активности туберкулезного процесса (гр. 0A)	0.1	57	1	45	10	**		
в проведения дифференциально-диагностических мероприятий (гр. 0 Б)	02	11	/"	45	10	26	18	16
Вэрослые с неактивным туберкулезным процессом после клинического издечения (гр. III)	03	860	960	-	1	9		1
Върослые состоящие:	17,7	300	860	521				860
в бытовом и производственном контакте с бактерионыделителем (гр. IVA)	0.4	780	3501	1855	25	413	58	100
в бытовом и производственном контакте с больным туберкулезом без бактериовыделения (гр. IVA)	05	2079	3057	1852	8	400	65	3005 2584
в профессиональном контакте с источником инфекции (гр. IVБ)	06	26	422	97		52	0.5	
Дети от 0 до 17 дет, из них ; нуждающиеся в уточнении характера туберкуляновой чувствительности, уточнении активности туберкулеза и диагностике (гр. 0)	07		189	61	2	41		369
с остаточными посттуберкулелными изменениями (гр. IIIA) переведенные из I, II, III A групп. (III Б)	08	273	273	265		6		267
The state of the s	0.9	70	33	25				401

 Т. 2300: при подсчёте баланса по детям и подросткам не учтен переход по возрасту.

			Ty	Revenue	dann me					
	Nº		N3 HNX	туберкулез л	егких	Другие формы туберкулеза				
	Ma	Boero	дети 0-14 лет	дети 15-17 лет	Boero	дети 0-14 лет	дети 15-17 лет	Bcero	дети 0-14 лет	дети 15-17 лет
1	2	3	4	5	6:	7	8	9	10	11
Взято на учет рецидивов	001	128	0	1	125	0	1	10	0	
из них из III группы	002	54	0	1	- 53	0	1	3	0	
Прибыло	003	(1) 128	4	.0	6)/123	1	0	1	0	
Переведено в III группу	004	1146	27	13	1069	0	10	65	1	
Диагноз туберкулеза снят	005	4	.0	0	- 4	0	0	0	0	
Выбыло	006	6/ 93	2	8	28 90	0	0	0	0	
Умерло от туберкулеза	007	190	10	0	190	0	0	0	0	
Умерло от других причин	008	125	0	0	123	0	0	3	0	

• Неправильно подсчитан баланс по т. 2400 или не учтены исправления предыдущего года

Состоит по группам учета	No.	Взято в текущем году	Подлежа ло XII или пробном у лечению	Прошли курс XII, пробног о лечения	Впервые выявлен о больных с ТБ	Снято с учета	Выбыло	Состоит на конец года
Взрослые, из них нуждающиеся:	2	3	4	5	6	7	8	9
в определении активности туберкулезного процесса (гр. 0А)	01	67	66	64	16	38 12		26
в проведении дифференциально-диагностических мероприятий (гр. 0 Б)	02	39	38	35	5	31	16	3
Взрослые с неактивным туберкулезным процессом после клинического излечения (гр.III)	03	642	621	621	8	4		1501
Варослые состоящие: в бытовом и производственном контакте с бактериовыделителем (гр. IVA)	04	457	808	791	12	543	42	909
в бытовом и производственном контакте с больным туберкулезом без бактериовыделения (гр. IVA)	05	452	770	745	1	558	84	The second second
в профессиональном контакте с источником инфекции (гр. IVБ)	06	-	106	106	-	60	7	810
Дети от 0 до 17 лет, из них: нуждающиеся в уточнении характера туберкулиновой чувствительности, уточнении активности туберкулеза и диагиостике (гр. 0)	07	887	37	25		680676	11	776
с остаточными посттуберкулезными изменениями (гр. ША)	0.8	1					- 11	2
переведенные из I, II, III А групп (III Б)	09	11	10	10				11
состоящие в контакте с бактериовыделителями (гр. IVA)	10	261	374	374	3	144	11	444
из контакта с больными туберкулезом без бактериовыделения, из семей животноводов или имеющих больных туберкулезом животных (гр. IVБ)	11	152	160	156		194		
в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции (группа VIA)	12	669	1126	1122	1	1110	24	208
ранее инфицированные, с гиперергической реакцией на туберкулин, из соц. групп риска с выраженными реакциями на туберкулин (гр. VIБ)	13	135	131	127		75.00		1039
с усиливающейся туберкулиновой чувствительностью (гр. VIB)	14	726	1261	1161		99/1000	18	170

• В т. 2500 не учтены МЛУ МБТ+ из прошлого года, не учтены исправления предыдущего года или неправильно подсчитан баланс

				-0	биаружено:	из числа боль	anax.				Ум	ерло	4		
		E B M	MODA	MOTO		состоящих	на учете		201	Переведено из других	8		CHECKE	района	Состоит на
Группы больных	Ne	с ипервые в жизни установления диагнодом	из них мето, посеяв	из них методом Микроскопии	в I rpynne	из них в 16 группе	во II группе	n III rpynne	с учета	учреждений больных, выделяющих МБТ	от туберкуля	от других причин	Перестали выделить МБТ	Выбыло из р	конец отчетного года
	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12	- 12	707.5		
Туберкулез органов дыхания	01	122	3	119	9	2	21	1	14	108	100000	13	14	15	16
Обследовано на МЛУ, из. стр. 01)	02	117							14	105	62	14	168	47	43
из них выявлена МЛУ	03	0								3	3			-	
Губеркулез внелегочных юкализаций	04	5	4	1						2	2			1	65
из них сельских жителей (из суммы строк 01+04)	05	80		80	2		5		8	48	37		97		237

• В т.2610 не отмечены умершие в стационаре

• В т. 2700 не учтены исправления предыдущего года

7. Эффективность лечения и наблюдения больных туберкулезом органов дыхания, выявленных в предыдущем году (2700)

		Bne	ервые выяв	пенные боль	Больные с рецидивом туберкулеза				
Наименование	Ns c⊤p.	BCBTO	в том числе бактерио- выделители	о деструкцие й легочной ткани	без бактерио- выделения и деструкции	ecero	в том числе бактерно- выделители	с деструкцие й легочной ткани	без бакторио- въделения и деструкции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Взято на учёт в предыдущем году	1	984	465	485	300	161	86	26 9	6830
Выбыло в другие территории	2	48	30	21	11	8	5	4	3
Умерло от туберкулеза	3	78	46	51	16	18	12	14	1
Умерло от других причин	4	66	36	31	19	14	6	10	3
Диагноз туберкулеза снят	5	23	1	7	16	1	1		
Выделение МБТ прекратилось	6	X	301	X	X	X	34	X	X
Полость распада закрыпась	7	X	X	254	X	X	X	31	X
Переведено в III группу	8	466	188	181	203	50	19	24	18
Прибыло из других территорий	9	4	3	4	-		-		
Выделение МБТ прекратилось	10	X	1	X	X	X		X	X
Полость распада закрылась	11	X	X	1	X	X	X		X
Переведено в III группу	12	*				+2			

Не заполнена т. 2800

8. Оказание помощи больными туберкулезом, временно проживающими на территории обслуживания (кроме состоящих на учете)

		(2800)		
	8		1	D 100X:
Наименование	Ле строки	Bcero	летей 0-14 лет	подрост-ков 15-17 лет
1	2	3	4	5
Выявлено в текущем году	01	3.		
из них с МБТ+	02	1		
Наблюдалось в отчетном году	0.3	1		
Лечились в стационаре	04			
Лечились амбулаторно	0.5			
Умерло от туберкулеза всего	06			
из них в стационаре	07			

• Добавлена таблица 2130, отражающая сведения о больных, направленных на санаторно-курортное лечение


```
(2130) Из числа состоящих на учете больных туберкулезом (стр.1 гр. 7) направлено на санаторно-курортное лечение 1 _____, прошли санаторно-курортное лечение в отчетном году 2 _____.
```

Ф. № 30 т. 2512


- ошибочно дважды включают подростков, осмотренных методами флюорографии и туберкулинодиагностики
- в графу 8 (положительный результат бактериоскопии) включают, не лица а результаты*.

Рекомендуется сверять сведения из районных ЛПУ с районной ф. 7-ТБ т.1003. Число в ф. № 30 т.2500 гр.8 < ф. 7-ТБ т.1003

ф. 2-ТБ — недостаточная регистрация для лечения больных с курсами повторного лечения



ф. 2-ТБ — недостаточная регистрация для лечения лиц, переведенных для продолжения лечения



- 7-TБ недостаточная работа по сверке впервые выявленных больных туберкулёзом с УИН
- В 6 регионах (Республики: Коми, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Алтай, Челябинской, Ленинградской областях и г. Санкт-Петербурге) расхождение числа впервые выявленных больных между ф. № 8 ФСН и ф. 7-ТБ превысило 40%.

Ф. 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ Как предотвратить остальные ошибки в этих формах? С 10 января (срок подачи годовых отчётов по

ф. 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ) до 10 февраля проводится предварительный приём и корректировка годовых отчётов по указанным формам. Вы можете узнать о состоянии отчётов, написав письмо по адресу: sterlikov@list.ru. В случае, если отчёт не был подан для предварительной проверки, просьба оказать содействие в этом.

Спасибо за внимание!

Надеемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество