Модуль 3

Различные заместительные препараты



Общее представление

- Метадон
- Бупренорфин
- ЛААМ заместительные препараты
- Диаморфин
- Левометадон
- Лофексидин
- Налтрексон детоксикация
- Налоксон



Метадон

- Наиболее распространенный заместительный препарат: 70% пациентов имеют положительную реакцию
- Синтетический опиоидный агонист
- Период полувыведения 24-36 часов, суточная дозировка
- Оральная дозировка в жидкой форме (1 мг/1 мл) или в таблетках; также имеется в инъекциях
- Средняя доза: 60-120 мг
- Трудность отвыкания
- Высокий риск передозировки



	Препарат	Частота приема	Оптимальная рекомендуемая доза	Способ назначения	Фирменное название	Риск передози- ровки	Отвыка- ние
	Метадон	Каждые 24 ч	50 -120 мг/сутки	Орально (сироп, таблетки) В инъекциях	Metasedin®	+++	+++
	Бупренорфин	Каждые 24 или 48 или 72 ч	8 – 16 мг/сутки	Под язык	Subutex®	+ (с другими препаратами)	+
	Диаморфин	2-3 раза /24 ч	400-700 мг/сутки	В инъекциях Курительный	Отсутствует	+++	++++
0	ЛААМ	Каждые 48-72 ч	70-120 мг х 3/ неделю	Орально	Orlaam®	+++	+++
1 ork	Левометадон	Каждые 24 ч	40-60 мг/сутки	Орально (сироп)	Polamidon®	+++	+++

Бупренорфин

- Частичный агонист-антагонист
- После стабилизации срок полувыведения 48-56 часов; 3 4 дозы в неделю
- Сильное взаимодействие с рецепторами опиатов
- Форма таблетка под язык
- Средняя доза: 8-12 мг
- Отвыкание относительно легкое
- Назначается в виде Subutex®
- Эффект «потолка»



Диаморфин

- Опиоидный аналгетик, полусинтетический, на основе морфина
- Запрещен во многих странах
- Время полувыведения 4 часа; 3 4 дозы в сутки
- Дорогостоящая форма лечения
- Отвыкание трудное
- Высокий риск передозировки



ЛААМ

- Лево-альфа-ацетилметадол
- Синтетический агонист и опиатный аналгетик
- Время полувыведения 48–72 часов; 3-4 раза в неделю
- Оральные дозы, 12-24 мг
- Проблемы, связанные с накоплением и остановкой сердца
- В Европе более не используется
- Высокий риск передозировки; трудное отвыкание



Левометадон

- Содержит активную часть метадона (только лево-, но не декстра-)
- Полдозы
- Дорогой
- Назначается только в Германии: *Polamidon* ®
- РКИ проведено в Гамбурге по двойному слепому методу



Другие лекарственные препараты

- Незаместительные
- Детоксикация
 - Лофексидин
 - Налтрексон
 - Налоксон



Лофексидин

- Не является опиатным аналгетиком, подавляет высвобождение норадреналина
- Не устраняет симптомов отвыкания, но снижает влечение и чувство беспокойства
- Используется для детоксикации
- Назначается только в СК в форме *Britlofex*



Налтрексон

- Чистый опиатный антагонист или блокирующий агент
- Используется для быстрой детоксикации или сверхбыстрой детоксикации при анестезии
- 2-7 раз в неделю
- Средняя доза: 50 мг/день или 100 мг/2 дня или 150мг/3 дня
- Нет риска передозировки и несложен для отвыкания
- Nalorex®, Antaxone®, Trexan®, Celupan®, Revia®



Налоксон

- Чистый антагонист
- Очень короткий период полувыведения
- Применяется в случае передозировки или для обращения комы
- Торговое название *Narcan*®



tra	
	K
Ilro	
Noth	
Work	
Teth work	

Препарат	Частота приема	Оптимальная рекомендуемая доза	Способ назначения	Торговое название	Риск передо- зиров- ки	Отвы- кание	Примечание
Лофексидин				Brifolex®	нет	нет.	Применяется только в СК
Налтрексон	Каждые 24, или 48 или 72 ч		Орально	Antaxone® Trexan® Celupan® Revia®Nalorex®	нет	нет.	До начала лечения субъекты должны пройти детоксикацию
Налоксон	В случае передози- ровки		В инъекциях	Narcan®	нет	нет	Распространяется среди пациентов только в Италии
Кодеин			Орально (сироп, таблетки) В инъекциях	DHC® Remedacen®	++	+++	Применяется только в Германии в качестве поддерживающей терапии

Выводы

- Важно: имеется широкий ассортимент лекарственных препаратов
- Большинство исследований проведены на метадоне
- Имеются другие препараты, которые доказали свою эффективность
- Важнейшее значение имеет проведение соответствующей оценки и информация о различных препаратах

