



Атаракс



||

||

||



Атаракс®



1954

2004



Атаракс®


небензодиазепиновый анксиолитик

Форма выпуска и состав.

- **25 таблеток, покрытых оболочкой, содержат по 25 мг гидроксизина гидрохлорида**
- **6 ампул по 2 мл 5% раствора, содержащего по 100 мг гидроксизина гидрохлорида.**




Тревога, беспокойство,
тревожные расстройства



Симптом/проявление



- Неврологические заболевания (хроническая недостаточность мозгового кровообращения, травмы ГМ, мигрень, деменция...)
- Соматические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, бронхиальная астма, желудочно-кишечные заболевания, рак...)

Невротическое расстройство



Тревожные состояния

- Генерализованное тревожное расстройство (невроз тревоги)
- Паническое расстройство



Обсессивно-компульсивные
расстройства (навязчивости)

Фобии
(агорафобия, социал.
Фобия)

 **Атаракс**®

Состояния, при которых встречается выраженная тревога:





Психические нарушения, сопровожающие тревогу



Нарушение когнитивной функции

□ Нарушение познавательных процессов :

- Ухудшение памяти
- Трудности концентрации внимания
- Снижение продуктивности психических процессов

□ Снижение адаптивных возможностей, связанных с эмоциональными нарушениями:

- Отсутствие новых (творческих) решений
- Невозможность решения проблем
- Невозможность (блокада) принятия решений



Бензодиазепины

Неблагоприятные эффекты

- **Нарушения сна**
- **Быстрое нарастание толерантности**
- **Лекарственная зависимость**
- **Наличие синдрома отмены**
- **Угнетение когнитивных функций**



По рекомендации ВОЗ

(Всемирной организации здравоохранения)

курс терапии

бензодиазепинами не должен превышать

ДВУХ НЕДЕЛЬ



Проблема зависимости при применении

БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ

**⇒ необходимость других
препаратов**



Атаракс

Химическая характеристика

- **Hydroxyzine = piperazinederivate**
- **Химически не связания ни с бензодиазепинами, ни с фенотиазинами**

Атаракс® (гидроксизин) Небензодиазепиновый анксиолитик



- Антагонист H1, мускариновых, 5HT2 рецепторов

Щадящее действие на когнитивные функции

Отсутствие синдрома отмены

- Отсутствие зависимости

Уникальность и неповторимость!!

Спектр применения Атаракса®:

Соматические заболевания (ИБС, зудящие дерматозы и др.)

Соматоформные расстройства
(органические неврозы, вегетативная дисфункция)

Тревожные расстройства



Тревожные реакции на соматическое заболевание - нозогении

Психические расстройства, коморбидные соматическим заболеваниям

Расстройства адаптации



Атаракс®. Показания.

1. **Взрослым для купирования тревоги, психомоторного возбуждения, чувства внутреннего напряжения, повышенной раздражительности при:**
 - неврологических заболеваниях;
 - психических заболеваниях (генерализованная тревога и расстройства адаптации);
 - соматических заболеваниях;
 - хроническом алкоголизме, абстинентном синдроме, сопровождаемом симптомами психомоторного возбуждения.
2. **В качестве седативного средства в период премедикации**
3. **Симптоматическая терапия зуда.**



Атаракс®.

Фармакологические свойства.


- Гидроксизин быстро всасывается из ЖКТ,
- Пик концентрации в плазме достигается через 2 часа после перорального приема.
- Оказывает: анксиолитическое, седативное действие, противорвотное, антигистаминное, м-холиноблокирующее и центральное миорелаксирующее действия.
- Гидроксизин проходит через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры.
- Метаболизм препарата происходит в печени с образованием активного метаболита – **цетиризина.**



Атаракс®.

Фармакологические свойства

- **Период полувыведения зависит от возраста:**
 - 7 часов у детей,
 - 20 часов у взрослых и
 - 29 часов у пожилых.
- **Быстрое наступление седативного эффекта:**
 - через 5-10 мин после приема жидких форм
 - через 30-45 мин после приема внутрь.





Атаракс

дополнительные положительные эффекты

- **Антигистаминный эффект –**
 - улучшение носового дыхания,
 - бронхолитическое эффект
 - антиаллергическое действие
 - противозудное действие
- **Холинолитический эффект**
 - противорвотное действие
- **Симпатолитический эффект**
 - вегетостабилизирующее действие
- **Спазмолитический эффект**



Атаракс – области применения:

- Неврология
- Терапия
- Психиатрия
- Кардиология
- Гастроэнтерология
- Гинекология
- Педиатрия
- Хирургия, реаниматология
- Онкология....






Атаракс®:


Высокая безопасность и переносимость

- Минимальное лекарственное взаимодействие
- Выраженный анксиолитический эффект без резкой седации
- Отсутствие лекарственной зависимости и синдрома отмены
- Положительное влияние на когнитивную функцию
- Не включен в списки сильнодействующих веществ
- Не требует специального рецепта



Атаракс® - безопасность

Не взаимодействует с:



- Пролонгированными формами нитроглицерина
- Бета-адреноблокаторами
- Блокаторами медленных кальциевых каналов
- Диуретиками
- Антиаритмическими и гипотензивными средствами




Атаракс® потенцирует действие:

- **Наркотических анальгетиков**
- **Барбитуратов**
- **Транквилизаторов**
- **Снотворных средств**
- **Алкоголя**



Эффективность АТАРАКСА® в лечении генерализованного тревожного расстройства.



Е.Нantouche, Мауккукш «Эффективность гидроксизина при генерализованной тревоге»
Психиатрия и психофармакотерапия. Т. 2/№4 /2000





Атаракс®:

*Анксиолитик для тех,
кому нужно сохранять ясность мышления*

- **Положительно влияет на когнитивную функцию**
 - **НЕТ лекарственной зависимости**
 - **НЕТ синдрома отмены**
 - **Восстанавливает способности к действию у пациентов с тревожными состояниями**
 - **Повышает уровень бодрствования (А.Бобров с соавт)**
- **Улучшает функцию сна**



Атаракс® схема применения.

		Тревожные расстройства	
Таблетки 25 мг	1-я неделя	50 мг/сут	утро, день, вечер 
	Последующие недели		утро, вечер 

В серьезных случаях доза может быть увеличена до 300 мг в сутки

Однократная максимальная доза не должна превышать 200 мг, максимальная суточная доза составляет не более 300 мг.



Атаракс[®] схема применения у детей.

Для симптоматического лечения зуда

- В возрасте от 12 мес. до 6 лет: 1 мг/кг до 2,5 мг/кг в день в отдельной дозировке.
- В возрасте от 6 лет и старше: 1 мг/кг до 2,0 мг/кг в день в отдельной дозировке.

Для премедикации

- 1 мг/кг за 1 ч до операции, а также дополнительно в ночь перед анестезией лекарственное взаимодействие.

Для премедикации в хирургической практике:

- 50-200 мг (1,5-2,5 мг/кг внутримышечно) за 1 ч до операции.



Атаракс®.

Противопоказания.

- **Препарат противопоказан больным с повышенной чувствительностью к любому из компонентов препарата, цетиризину, аминофиллину или этилендиамину.**
- **Противопоказан больным порфирией.**
- **Не рекомендуется применение Атаракса при беременности, в период родовой деятельности и грудного вскармливания.**



Атаракс – доступный анксиолитик

- Не обладает отрицательными свойствами бензодиазепинов (формирование зависимости, привыкания, риск злоупотребления)
- Не включен в списки сильнодействующих веществ
- Не требует специального рецепта
- Может назначаться врачами общей практики

Атаракс ЮСБ – финалист международного фестиваля рекламы



8
ВОСЬМОЙ
МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
РЕКЛАМЫ



Moscow International Advertising Festival

Финалисты

Красота и здоровье



Атаракс

Участник: Издательско-полиграфическая компания "Растерс",

Москва, Россия

Рекламодатель: УСВ

Продукт, услуга: транквилизатор