

Презентация на тему: «Курение - вред»

**Внеклассное мероприятие по теме:
«Курение. Взгляд со всех сторон»**

8 класс.

Учитель Шестакова Н.Н.



Смерти от курения

КУРЕНИЕ — ОПАСНО!



В мире от курения ежегодно умирают **5 миллионов** человек, в России - от **300 до 500 тысяч** человек.

Источник: «РИА Новости», ria.ru

IMPROVE
ALLIANCE

Почему курят подростки



Почему курят взрослые люди



К ЧЕМУ ПРИВОДИТ КУРЕНИЕ



Рак легкого является одной из самых распространенных злокачественных опухолей. Факторы, влияющие на заболевание раком легкого: усиление загрязнения атмосферного воздуха и табакокурение.

Курение и беременность



Курение во время беременности может крайне негативно отразиться на здоровье будущей мамы и ее малыша. У будущего ребенка проблемы со здоровьем могут возникнуть еще в утробе матери и проявляться вплоть до совершеннолетия.

Как влияет курение на женщин

**Женщины
курят,
потому что..**

**Боятся
располнеть**

**Хотят быть
красивыми и
стройными**

**Только в развитых
странах от болезней,
вызванных курением,
умирает более
полумиллиона женщин. В
этот мрачный список
болезней входят
болезни сердца**



Как влияет курение на женщин

Женщины
курят,
потому что..

Боятся
располнеть

Хотят быть
красивыми и
стройными

Только в развитых
странах от болезней,
вызванных курением,
умирает более
полумиллиона женщин. В
этот мрачный список
болезней входят
болезни сердца



Болезни сердца



Рак мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря встречается в основном у курильщиков старше 40 лет. У мужчин риск в 4 раза выше, чем у женщин. Самый частый ранний симптом - появление крови в моче без боли.

Рак пищевода

Симптомы:

Затрудненное глотание, боль или дискомфорт в груди, похудание.


Курение может вызывать рак пищевода за счет повреждения клеток, расположенных внутри органа. Чем дольше курит человек, тем выше риск.

Симптомы:

Ноющая или жгучая боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита и похудание.

Язва желудка

Эффект длительного курения заключается в соляной кислоте в желудке, разъедающей защитный слой в его полости. Ноющая или жгучая боль между грудиной и пупком - самый частый симптом, возникающий после еды и рано утром. Боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов; бывает, что боль облегчает еда. Курение замедляет заживление язв и способствует их повторному возникновению.



Заключение и вывод



1. Курение табака - основной фактор риска заболеваний органов дыхания: хронического бронхита, хронической болезни легких, пневмонии.
2. Курение табака - фактор риска атеросклероза, инфаркта миокарда, болезней сосудов.
3. Курение табака в период беременности приводит к недоразвитию плода и ранним выкидышам.
4. Курение табака – основной фактор риска сердечных заболеваний.