






МНОГООБРАЗИЕ ЗЕМНОВОДНЫХ

ЗЕМНОВОДНЫЕ РСО-АЛАНИЯ

Презентация
учителя биологии
МОУ СОШ ст. Николаевской

В настоящее время на Земле обитает менее 4 000 видов амфибий.

Класс Земноводные		
Отряд Хвостатые	Отряд Бесхвостые	Отряд Безногие
Длинный подвижный хвост, передвигаются за счёт ног и волнообразного движения туловища.	Отсутствует хвост во взрослом состоянии, прыгательные задние конечности.	Отсутствуют передние и задние конечности, передвижение червеобразное.
 <p>Огненная саламандра</p>  <p>Гребенчатый тритон</p>	 <p>Травяная лягушка</p>  <p>Серая жаба</p>	 <p>Кольчатая червяга</p>



Обыкновенный тритон

В Северной Осетии распространен в окрестностях селений Ахсарисар, Калух, Тамиск, Тарское

Самки откладывают за период размножения несколько сотен икринок (по различным данным от 60 до 700. Каждая икринка отдельно прикрепляется к листьям подводных растений. Появившиеся личинки размером всего полсантиметра. Личинки питаются комарами и мелкими ракообразными.



Обыкновенный тритон, стадия личинки, видны перистые наружные жабры

Малоазиатская лягушка чаще всего встречается
в лесной и субальпийской зонах, реже в
лесостепной, малочисленна на Терско-Кумской
низменности



Озерная лягушка широко распространена в степной, лесной и горных зонах, но особенно часто встречается на Осетинской наклонной равнине





**Квакша широко распространена от степной
зоны до высокогорья**



Зеленая жаба обычна по всей Северной Осетии, полезна в сельском хозяйстве.