

ВИЧ- вирус иммунодефицита человека, вызывающий поражение иммунной системы, которая отвечает за защиту организма от инфекций и опухолей.

СПИД- это синдром приобретенного иммунодефицита, конечная стадия ВИЧ- инфекции.

Ситуация по ВИЧ/СПИДу в мире, Казахстане



Ситуация по ВИЧ/СПИДу в мире за 2003 год

Число ЛЖВС, на конец 2003г.	Всего	40 млн.
	Взрослых	37 млн.
	Дети до 15 лет	2,5 млн.
Количество новых случаев ВИЧ инфицирования	Всего	5 млн.
	Взрослых	4,2 млн.
	Дети до 15 лет	700 000
Умерли в результате развития СПИД за год	Всего	3 млн.
	Взрослых	4,2 млн.
	Дети до 15 лет	500 000

Разрушительные последствия ВИЧ/СПИДа в некоторых странах


- Страны Африки: ВИЧ снизил среднюю продолжительность жизни с 62 лет до 47 лет
- Только в 2001 г. 2,3 млн. африканцев умерли от СПИДа
- 14 млн. детей в мире потеряли по меньшей мере одного из родителей в результате ВИЧ.
- В странах Азии и Тихоокеанского региона каждый день 1192 человека умирают от СПИДа

В РК на 1.11.2006 г. зарегистрировано 7088 ЛЖВС

- Больных - 445
- Умерло – 380

За 10 месяцев 2006 года зарегистрировано
1431 ЛЖВС из них
85 детей до 14 лет.

- По информации БОС (быстрая оценочная ситуация) в РК проживает 13500 человек с ВИЧ «+» статусом



Количество зарегистрированных случаев ВИЧ/СПИД по РК:

- Караганда – 1745
- Павлодар - 1061
- ЮКО – 872
- Костанай – 448
- ВКО – 334
- Алматы – 178
- Астана - 96

72 % людей, живущих с
ВИЧ/СПИД- мужчины.

28% - женщины.

78% ЛЖВС – молодежь в
возрасте 20-29 лет.

Основные факторы роста эпидемии ВИЧ

- Открытие границ
- Экономическая нестабильность
- Ухудшение здравоохранения
- Рост потребления инъекционных наркотиков и высокий уровень ВИЧ инфицирования среди ПИН.
- Низкий уровень осведомленности в вопросах ВИЧ/СПИДа и безопасного поведения среди молодежи.

В Казахстане около

200 000 потребителей инъекционных
наркотиков

20 000 работников секса из которых 11,6%
употребляют наркотики.