

Ситуация по полио в мире и регионе Центральной Азии.

Глобальная инициатива

Что такое ПОЛИОМИЕЛИТ


Опасное для жизни инфекционное заболевание, вызванное диким полиовирусом

- Полио вирус передается орально-фекальным путем.
- Первичное размножение и накопление вируса происходит в глотке и кишечнике. В последующем вирус попадает в лимфатическую систему, затем в кровь.
- В основном полиомиелитом болеют дети до 5 лет.



Опасное для жизни инфекционное заболевание, вызванное диким полиовирусом

- Первые симптомы полио – высокая температура и утомляемость, головная боль, тошнота, сковывающая боль в шее и боли в конечностях.
- У большинства инфицированных людей симптомов нет, но они выделяют вирус с калом, и способствуют распространению инфекции
- Только у одного из 100 инфицированных вирус приводит к необратимому параличу (обычно в ногах).
- Из числа парализованных от 5 до 10 процентов умирают из-за паралича дыхательных путей.



Антисанитария способствует распространению вируса



Полио – заболевание на всю ЖИЗНЬ



Оральная полио вакцина – единственная защита от полио

- Специфического лечения полиомиелита для блокирования вируса не существует
- От полиомиелита можно защититься только путем вакцинации.
- Существует безопасная и эффективная вакцина – оральная полио вакцина (ОПВ).
- В случае многократного применения ОПВ защищает ребенка от полио.
- ОПВ производится на заводах, имеющих сертификаты ВОЗ, подтверждающие соблюдение международных стандартов качества вакцин.
- Эта вакцина используется по всему миру и уже способствовала сокращению случаев полиовируса на 99%.



**ЮНИСЕФ помогает Минздраву КР в
подготовке к иммунизации**

**ЮНИСЕФ закупил 1 миллион 610 тысяч
доз вакцины мОПВ1, а также оказывал
техническую поддержку по социальной
мобилизации и коммуникации**

Доступ к вакцине для изолированных сообществ

- Обеспечение доступа к вакцине детям из групп высокого риска в отдаленных местах с помощью мобильных бригад является залогом успеха деятельности по иммунизации.
- Требуются также усилия учреждений общественного здравоохранения для обеспечения всеобщего охвата вакцинацией и предотвращения завоза дикого полио вируса на территорию Кыргызстана.


Все общество должно быть мобилизовано на противодействие вирусу

- ЛПО
- СМИ (национальный и местные каналы телевидения, радио и газеты)
- Партнеры: ВОЗ, ЮНИСЕФ, НОКП


Ситуация в Таджикистане, 2010

ГОД

- 643 зарегистрированных случаев острого вялого паралича
- 334 лабораторно подтвержденных случаев дикого полио вируса типа 1. 36 смертей от 0 до 35 лет
- Подавляющее большинство случаев зарегистрировано на юго-западе страны



В 1988 полио распространялся по всему миру



Крупнейшая инициатива в истории человечества

